





3 2044 107 269 128




Geht in den I. Band von Gmelin's Thesaurus.

*Dieses gemischtes peltus, von A. J. F.,
an. Gesner (fünf' Nov. 1778
XII) wofür der Stroh aufsteht
in Linne'scher Nomenclatur,
sur gr. Weinmann's gro-
ßen Bildwörter: Phytantho-
graphia.*

Graz 4/12 1858 J. B. Holzinger

= C. L. Scheler.



IOA. GVIL. WEINMANNI
THESAVRVS
REI HERBARIAE
LOCVPLETISSIMVS
INDICE SYSTEMATICO
ILLVSTRATVS ET EMENDATVS
IN QVO
ALIQVOT PLANTARVM MILLIA SECVNDVM
CLASSES, ORDINES, GENERA, SPECIES ET
VARIETATES METHODO
LINNEANA
RECENSENTVR ET PASSIM ADNOTATIONIBVS
ILLVSTRANTVR.




AVGVSTAE VINDELICORVM.

APVD IOA. ELIAS HAID. 1787.

ALBID
22066100
KARLSTADT
1787

Jan. 1912
28096.



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
BHL-SIL-FEDLINK

THESAVRVS VNIVERSALIS
REI HERBARIAE.

OV

RECVEIL


DE FIGVRES ENLVMINÉES
DE QVELQVES MILLIERS DE PLANTES
LES PLVS VTILES DANS LA MEDECINE
DANS L'OECONOMIE ET POVR L'ORNE-
MENT DES CONTENVES IARDINS
DANS L'HERBIER.

DE MONSIEVR

W E I N M A N N.


ECLAIRCI PAR LES DENOMINATIONS
DE LINNÉ

ET ACCOMPAGNÉ D'VN INDEX D'APRÉS LE
SYSTEME SEXVEL.



À AVGSBOVRG. CHÉS IEAN ELIE HAID.

1 7 8 7.



Die Ueberzeugung von der Annehmlichkeit und dem Nutzen der Pflanzenkenntnis ist heut zu Tage so allgemein, daß die Empfehlung derselben sehr überlästig seyn würde. Wir leben in einer Zeit, wo man das Schöne gern aufsucht, und das Nützliche begierig annimmt, und beides findet man in dem weitläufigen Pflanzenreich. Es siehet aber ein jeder, nach dem Endzwecke, welchen er zu erreichen verhofft, die Pflanzen in seinem eignen Gesichtspunkt an. Der Philosoph beobachtet ihre ganze Bildung, sucht ihre wesentlichen Unterscheidungszeichen auf, rangiert sie in ihre Ordnungen, trachtet so viele Pflanzen des Erdbodens habhaft zu werden, als er nur immer kann, um sich einen Begriff von der ganzen Stufenleiter zu machen, und um die Stelle jeder Pflanze, auf dieser Leiter, oder in den von der Natur selbst angenommenen Ordnungen zu finden. Der Arzt, der Künstler, der Handwerker, der Haus- und Landwirth bemühen sich die Pflanzen zu praktischem Nutzen anzuwenden, und sie zur Arznei, zur Nahrung, zur Kleidung und zur Verschönerung zu gebrauchen. Der Blumenliebhaber und Gärtner wendet alle Kunst und Handgriffe an, um Spielarten der Pflanzen in der Farbe, Gestalt und dem Wuchs hervorzubringen, und Früchte von vorzüglicher Beschaffenheit zu verschaffen, die in der ganzen Oekonomie großen Vortheil und Nutzen bringen.

Abbildungen von Pflanzen, wenn sie der Natur getreu sind, werden also dem Kräuterkenner, dem Arzt, und dem



dem Liebhaber der Oekonomie schätzbar seyn. Wir schmeichlen uns also, daß eine neue Ausgabe des Weinmannischen Herbarii, welches nun durch die Bemühungen eines großen Kräuterkenners mit den ächten botanischen Namen des Ritter von Linne, und systematischen Verzeichniß aller darinnen abgebildeten Pflanzen versehen worden, und dadurch einen wichtigen Werth und Vorzug vor der ersten Ausgabe erhalten hat, werde von dem Publikum mit Vergnügen aufgenommen werden.

Wir finden aber schicklich, statt einer weitläufigen Vorrede, die von Herrn Chorherrn Gessner uns mitgetheilte Geschichte und Beurtheilung dieses Weinmannischen Kräuterbuchs vorgehen zu lassen. Herr Johann Wilhelm Weinmann, Besizer des löbl. Stadtgerichts in Regensburg, und ältester Apotheker daselbst, geböhren im Jahr 1683. äußerte viele Jahre eine vorzügliche Neigung zur Pflanzenkenntnis, und zu einer so viel möglich vollständigen Kräutersammlung. Sein Herbarium von getrockneten Pflanzen bestand schon 1722, nach der von ihm in den Breslauischen Sammlungen im 29sten Versuche S. 181 gegebenen Nachricht, aus mehr als 9000 Pflanzen. Er lies eine große Anzahl davon durch Herrn Georg E. Seuffert, Apotheker aus Creußen abmahlen. Hernach wurde dieser beträchtliche Anfang 1730. von dem berühmten Pflanzenmahler dem Herrn G. Dionysius Ehret beträchtlich vermehret. Der gelehrte Herr Hofrath Erw giebt uns hievon umständliche Nachricht, Praefat. ad Decad. I. Plantar. selectar.

lectar. pag. 1. D. G. Dionysius EHRET a D. WEIN-
 MANNO tunc temporis iconum pro edendo opere
 suo botanico colligendarum studiosissimo, mercede
 conducebatur, vt per integrum annum his pingen-
 dis solummodo animum adiungeret, ibidemque dein-
 de easdem occupationes per sesquiannum adhuc con-
 tinuabat D. Loeschenkohlio mercatori, et horti flo-
 rentissimi possessori, eadem officia praestans. Man
 könnte sich also von dieser zahlreichen Sammlung von
 Pflanzen den größten Nutzen versprechen, wenn dieselbige
 durch den Druck sollten bekannt gemacht werden, und die
 Pflanzensiebhaber ihre Gestalt, ihr äußeres Ansehen,
 samt den Blumen und Früchten in ihren natürlichen Far-
 ben, in diesem Werke beisammen antreffen würden. Herr
 Weinmann entschlos sich wirklich 1734. zur Ausgabe
 desselben. Er war auch als Liebhaber der Pflanzen schon
 bekannt durch seine in die Breslauische Sammlungen ein-
 gegebene Abhandlungen, 16. Versuch. S. 416. von
 Leinwand aus Aloefäden. 19. B. S. 287. von dem Was-
 ferschierling. 29. B. S. 87. von dem blühenden Caffee und
 dem Tulpenbaum. S. 180. von der Nymphaea alba mon-
 strosa, und der Caryophyllata folio variegato. In
 dem gleichen 29. Versuche kommt eine Nachricht vor von
 seiner Kräutersammlung. Man wurde noch mehr zu der
 Ausführung dieses Werkes aufgemuntert, da die in der
 Historia plantarum succulentarum von Dr. Bradley in
 London 1717 - 1727. und die in Herrn Prof. Mar-
 tyn Historia Plantar. rariorum nach einer neuen Er-
 findung herausgegebene gemahlte Pflanzen, Bewunderung

und einen allgemeinen Beyfall verursacht. Es hatte aber auch Herr Weinmann das Glück an drey berühmten Künstlern, Herrn Haid, Ridinger und Seuter, Männer zu finden, welche diese Englische Methode, Pflanzen in ihren Farben vorzustellen, nachzuahmen, und vollkommner zu machen, wußten, auch dabey den Entschluß faßten, den Verlag dieses so kostbaren Werkes selbst zu übernehmen. Die ersten Versuche wurden mit dem größten Beyfall aufgenommen, und es fand sich eine große Anzahl von Subscribenten, daß das 1734 angefangene, aus 21. Ausgaben, jede von 50. Tafeln, zusammen aus 1025. bestehende Werk, 1745. gänzlich zu Ende gebracht werden konnte. Die durch ihre Kenntnisse und Erfahrungen berühmte Regenspurigische Aerzte, Herr Doctor Dietrich und Herr Doctor Bieler verfertigten dazu auf Begehren der Liebhaber einen ausführlichen Text von 18. Alphabeten, theils in deutscher, theils in lateinischer Sprache. Herr Weinmann war fürnemlich bedacht, diese Kräutersammlung so viel möglich vollständig zu machen. Er lies zu diesem Ende eine Menge von Verschiedenheiten in Blumen und Früchten, welche im ökonomischen Gebrauche, oder in Auszierung der Gärten, so viele Liebhaber vergnügen, in diesen Tafeln vorstellen. Ausländische Pflanzen, welche in der Arzney, und in verschiedenen menschlichen Bedürfnissen gebraucht, aber bishero in europäischen Gärten nicht unterhalten worden sind, hat er aus Reisebeschreibungen und verschiedenen Schriftstellern genommen, und sich hierin meistens der in POMET Histoire des Drogues, vorkommenden

den

den Zeichnungen bedient, und meistens vergrößert vorstellen lassen. Verschiedene hat er aus MVNTINGII Phytographia entlehnt. Das Werk bekam zugleich eine nicht geringe Zierde durch die Abbildung Afrikanischer Gewächse, welche von dem um die Botanik sehr verdienten Herrn Professor Ioh. BVRMANN, und meistens aus dem Codice Hamptoniano, dessen auch öfters PLVKNET sich bediente, mitgetheilt wurden. Es veranstaltete auch Herr BVRMANN eine Uebersetzung des Weinmannischen Werks in die holländische Sprache, um es den Holländern bekannt zu machen. Zu dem Werke schrieb der in den Wissenschaften und durch sein gemeinnütziges Leben, große Herr von Haller, eine Vorrede, und lieferte in dieser eine kritische Geschichte von allen botanischen Holzschnitten und Kupferstichen, welche von Deutschen herkommen. Das Werk selbst erwarb Herrn Weinmann die Ehre, daß Dr. BROWNE (*) und Herr von Linne, (**) zum Andenken seiner Verdienste in

(*) Civil and natural history of Jamaica. Lond. 1756. fol. p. 212. Windmannia (Weinmannia) fruticosa.

(**) LINNAEI Plantar. Species. Holm. 1762. p. 515. Gener. Edit. 1763. Syst. Veget. 1767. p. 274. Die bis jetzt bekannte Species sind: 1. WEINMANNIA glabra. Syst. Veget. 1. 84. p. 375. suppl. 228. pinnata. Spec. p. 515. fruticosa BROWNE.
 2. W. tomentosa. suppl. 227. Syst. v. p. 376.
 3. W. trifoliata. ibid.
 4. W. racemosa. ibid.
 5. W. Syluicola. Nouae Zeelandiae. BANCK Tab. Amer. merid. ined. XVII.



in der Botanik eine Pflanze nach seinem Namen benannten WEINMANIA. LINN. Syst. Veget. — Es sind auch die in dem Weinmannischen Herbario abgezeichnete Officinal-Pflanzen in des gelehrten Herrn D. Schäffers erleichterten Arzneypflanzenwissenschaft, auch zum Theil in dem Blackwellschen Kräuterbuche angezeigt worden.

Wir dürfen jedoch bey allem dem, was wir zum Ruhme dieses wichtigen und kostbaren Werkes angezeigt haben, die Unvollkommenheiten desselben nicht unbemerkt vorbegehen, welche nicht gänzlich haben können vermieden werden. Es wurde von Herrn Weinmann zu einer Zeit unternommen, da die Kräuterwissenschaft meistens nach Tournefortscher Lehrart vorgetragen wurde. Dillenius, Vaillant, Boerhaave, und verschiedene andere Kräuterkenner, zeigten, wie mancher Verbesserung diese Methode in Bestimmung der Kennzeichen der Geschlechter in Anordnung natürlicher Klassen, in Benennung der Geschlechter und Arten, und in Absonderung der Spielarten oder Varietäten fähig wäre. Herr Weinmann getraute sich demnach nicht, weder die Tournefortsche, noch die verbesserte Boerhaavische, noch eine andere Methode auszuwählen, sondern entschlos sich, die Pflanzen nach alphabetischer Ordnung vorzulegen. Von seinen Freunden empfing er die Benennungen nach der von jedem derselben beliebigen Methode eines botanischen Systems, oder mit den Apothekern und Gärtnern angenommenen Namen; und dadurch wurden zuweilen Pflanzen, welche unter gleiches Geschlecht gehören, von einander gesondert, und auch
die

die Gleichförmigkeit der Namen aus der Acht gelassen. Da auch viele Zeichnungen von gedörrten Pflanzen genommen worden: so sind die kleinern Theile der Blumen, und besonders die erst hernach von Herrn v. Linne zur Bestimmung des Characters bemerkte Staubfäden und Fruchtkolben nicht aller Orten angezeigt. Auch das ist Schade, daß Herr Weinmann sich auf die Richtigkeit der bey POMET und MVNTING vorkommenden Zeichnungen allzuviel verlassen, und nicht Gelegenheit gehabt, dieselbige mit den Pflanzen selbst zu vergleichen.

Bei dieser neuen Ausgabe wird nun den angezeigten Mängeln, so viel möglich abgeholfen. Zu allen Pflanzen ist die Benennung gleichförmig, nach der fast durch ganz Europa beliebten Methode des Ritters von Linne, eingerichtet, und der Name des Geschlechts, der Art und Abart auf die Tafeln zu der Pflanze selbst gestochen worden, (wo es noch geschehen konnte) damit man sich bei Ansicht der Abbildung die richtige botanische Benennung nach dem Linneischen Trivial-Namen einprägen, auch zugleich die von Herrn Weinmann angenommene bey ältern Botanikern, in Apotheken, und bey den Gärtnern gebräuchliche lateinische, deutsche und französische Namen, die unten an der Tafel stehen, ansehen könnte. Einige unrichtige Benennungen hat man angezeigt, und aller Orten die Stelle der Botaniker beigefügt, aus denen einige Figuren ganz, oder mit Veränderung sind entlehnt worden, als Munting, Pomet, Pluknet, Commelin u. s. w. damit man beurtheilen könne, auf wessen Ansehen die Richtigkeit der Figur



beruhe. Bey unrichtigen und zweifelhaften Zeichnungen sind andere, meist neuere Werke angezeigt, von welchen man genauere Abbildungen finden kann, auch durchgehends bey den Arzneykräutern die Bladwellischen Figuren, wie dieselbige durch Herrn Hofrath Trew Bemühungen verbessert, und mit Characteren versehen worden.

Man war wirklich anfangs entschlossen, von einigen Pflanzen verbesserte Zeichnungen zu liefern, doch hat man nachgehends dieses lieber unterlassen wollen, damit diejenigen Liebhaber und Gönner, welche durch ihre Vorschussgelder die erste Ausgabe grossmüthig unterstützt haben, nicht Ursache hätten, sich zu beklagen, daß durch die Veränderung vieler Tafeln, die Ihnen angeschaffte Ausgabe allzuviel von ihrem Werthe verlieren werde.

Zu nützlicherm Gebrauche dieses Werkes haben wir von allen Abbildungen dieser Weinmannischen Pflanzen, die sich auf etliche tausend belaufen, ein genaues Verzeichniß verfertiget, worinn nach systematischer Ordnung, nach der von dem Ritter Murray besorgten vierzehnten Ausgabe des Linne'schen Kräutersystems, die Classen, Ordnungen, Unterordnungen, Geschlechter, die Arten mit ihren Trivial: Namen und Varietäten angezeigt werden, mit beigefügten teutschen, französischen und englischen Namen. Bey den aus andern botanischen Werken entlehnten Abbildungen findet sich der Autor und die Stelle daraus sie Herr Weinmann genommen. Bey zweifelhaften, oder unrichtig gezeichneten, sind diejenige

Bota.

Botaniker angezeigt, die bessere Figuren geliefert haben, auch sind bey allen officinellen Pflanzen die Tafeln aus dem, von Herrn Hofrath Trew verbesserten und vermehrten Blackwellischen Kräuterbuch angezeigt worden. Wir haben vermeint durch dieses systematische Verzeichniss könnte der weitläufige Text der vorigen Ausgabe der Weinmannischen Werke entbehrlich werden; zumahlen die darinnen vorkommende botanische Beschreibungen von der heut zu Tag verbesserten Kräuterkenntnis allzusehr abste-
 hen. Die Linneischen Namen und Schriften werden auch jedem die Anleitung geben können, wo er dasjenige, was zur Arzneykunst, zur Oekonomie, in der Gärtnerey u. s. w., aus dem Pflanzenreich dienlich, und zu wissen verlangt, finden kann. Man wird es auch lieber in den besondern Werken, welche die vortrefflichsten Männer über diese Theile geliefert haben, nachsehen, als in den zerstreuten Nachrichten, die bey einigen Pflanzen im Weinmannischen Text, vorkommen. Die Linneische Schriften sind ja dermalen bald in allen Händen. Houttyn, Smelin, Panzer, haben in dem deutschen Pflanzensystem ausführliche Erläuterungen darüber geschrieben. Dietrichs Pflanzenreich, Schinzen Anleitung zur Pflanzenkenntnis und derselben nützlichen Anwendung, ohne der vollständigen Werke der Bauhine, Rai, und des großen Hallers zu gedenken, können für die Liebhaber genugsamen Unterricht ertheilen. Ueber die Arzneykräuter findet man in Dale materia medica, Geofroy, Onomatologia medica, Blackwell, Spielmann, Neumann, Lewis, Alston, Murray und Linnaeus selbst
 die



die vollständigste Nachrichten. Den Gebrauch der Pflanzen in der Oekonomie, haben viele ökonomische Schriftsteller so willkürlich abgehandelt, daß man nicht nöthig hat selbige bey Weinmann zu suchen. Unter der großen Menge derer, die uns den ökonomischen Nutzen der Pflanzen, und die Kultur derselben beschrieben haben, zählen wir vorzüglich Herrn du Hamel in verschiedenen Schriften, Miller im Garten : Dictionary, Lüdert in besondern Werken, vornehmlich in seiner botanisch : practischen Lustgärtneren, die er meistens aus den Englischen Werken des Hanbury, Mawe und Abercrombie gezogen hat — ferner Manger in der Pomologie, und die Schriftsteller von den Waldungen.

Durch diese Vermeidung eines weitläufigen Texts suchen wir dem Verleger und dem Käufer die Unkosten dieses sonst kostbaren Werkes zu erleichtern, eben wie solches bey der neuen Ausgabe der vortrefflichen Werke des großen Botanikers Dillenii, im Herto Elthamensi, und Historia Muscorum geschehen ist, bey denen man bey einem bloßen Verzeichniss der abgebildeten Pflanzen verblieben ist.

Die viele Mühe und Zeit die zu der Berichtigung des Weinmannischen Werkes und desselben nützlichem Gebrauche ist angewendet worden, wird mir genugsam belohnt seyn, wenn dadurch viele zur Liebe der edlen Pflanzenkenntnis, und zu Verherrlichung des großen Schöpfers in seinen Werken werden aufgemuntert werden.

D. 26 December. 1786.

On'

On est tellement convaincu et des delices et des avantages que procure l'étude de la botanique, què ce serait tres superflu de les recommander. Nous vivons dans un siècle, avide de tout ce qui peut être ou agréable ou utile. Le regne des plantes est fertile de l'un et de l'autre: mais chacun n'envisage les productions de la nature que sous son propre point - de vûe. Le philosophe observe toute leur organisation, il distingue leurs caractères essentiels, il les range en classes, il embrasse tous les Végétaux répandus dans toutes les régions de l'univers, pour se créer un Système de l'échelle de ces êtres modifiés à l'infini, et pour savoir fixer à chacun la place que la nature lui assigne. Le Medecin. l'artiste, l'artisan, l'oeconome découvrent le meilleur emploi de ces plantes et de leur produits; ils' en servent comme de remèdes, comme de moyens pour se nourrir, pour s'habiller, pour se soutenir. Le fleuriste imagine des artifices toujours nouveaux, pour varier dans les végétaux et la couleur et la figure et l'accroissement. L'oeconome ne s'occupe pas moins de ces variations; il n'ignore pas, combien ces metamorphoses, opérées par la culture, augmentent l'utilité oeconomique de ces plantes. Leurs figures, en tant qu'elles sont fidèles, seront toujours précieuses, et au Botaniste, et au Medecin et à l'Oeconome. Nous osons donc nous flatter, que le public

blic verra avec plaisir une nouvelle édition de l'Herbier de Weinmann, devenu infiniment plus important et précieux, depuis qu'il a été rédigé en ordre systématique et éclairci par un aussi grand Botaniste que l'est Monsieur le Dr. et Chanoine Gessner de Zurich, qui ajoute les vraies dénominations botaniques du Chevalier de Linné. Au lieu d'une préface, nous donnerons l'histoire de l'origine de cet ouvrage, comme elle nous fût communiquée par Mr. le Chanoine Gessner.

Mr. Jean Guillaume Weinmann, assesseur du tribunal de la Justice à Ratisbonne et premier apothicaire de cette ville, né en 1683. étudia depuis des longues années la botanique, en travaillant avec ardeur à une collection des plantes, aussi complète que possible. Selon un mémoire, qu'il inséra dans l'essai XXIX, pag. 181. des Recueils de Breslau son Herbier contenait déjà en 1722. plusque 900 plantes. Il en fit dessiner un grand nombre par Mr. G. G. E. Seüfert, apothicaire à Creüßen. Cette collection fût augmentée considérablement en 1730. par un de-

(*) Voy. Praefat. ad Decad. I. plantar. select. p. 1. D. G. Dionysius EHRET à D. Weinmanno tunc temporis iconum pro edendo opere suo botanico colligendarum studiosissimo, mercede conducebatur, vt per integrum annum

dessinateur très-célèbre, Mr. G. Denys Ehret. Le savant Mr. Trew, conseiller aulique, nous en donne une relation détaillée (*). On pouvait donc se promettre des avantages très-importans d'une collection si nombreuse, si elle était publiée et si on présentait aux amateurs toutes ces plantes dans un même ouvrage avec les fleurs et les fruits exactement d'après nature dans leur propre figure et couleur. Mr. Weinmann s'engagea donc en 1734. à la publication de cet ouvrage. Déjà auparavant il fût connu aux botanistes par ses mémoires insérés, dans les recueils de Breslau, p. ex. XVI. p. 416. par un mémoire sur des toiles de fil d'aloë, par tant d'autres, comme XIX, p. 287. sur la cicuta aquatique, XXIX. p. 87. sur la fleur du café et de tulipes; p. 180. sur la *nymphaea alba monstrosa* et sur la *caryophyllata folio variegato*. Dans le même mémoire XXIX. on voit une annonce de sa collection botanique. L'entreprise fût d'autant plus encouragée, depuis que l'on vit, avec quelle admiration, avec quelle approbation générale le public avait reçu les plantes, dessinées d'après une nouvelle invention, dans la *Historia Plantarum Succulentarum*.

THIR

num his pingendis solummodo animum adiungeret, ibidemque deinde easdem occupationes per sesquiannum adhuc continuabat D. Loeschenkohl mercatori et horti florississimi possessori, eadem officia praestans.



rum du Dr. Bradley à Londres en 1717 - 1727. et dans la *Historia Plantar. rar. Decad. V.* du Dr. Martin en 1728. Mr. Weinmann trouva heureusement trois artistes célèbres, Mr. Haid, Riedinger, Seüter, tous les trois très- versés dans la methode anglaise, de présenter les plantes et de les rendre avec leurs couleurs naturelles; en même tems ils se chargèrent de tous les fraix de cette entreprise couteuse. Les premiers essais avaient un succès prodigieux; le nombre de souscriteurs s'accrût tellement, que l'ouvrage, commencé en 1734 - 1745. en IV. Vol. s'étendit bientôt à XXI. Cahiers et 1025 Tables. Sur les instances des amateurs, deux medecins tres éclairés et très-habiles, Mr. Dietrich et Bieler de Ratisbonne, accompagnèrent la colléction d'un ample commentaire de 18. alphabets, en latin et en allemand. Mr. Weinmann s'empressa surtout de rendre sa collection aussi complete, que possible. Il fit donc placer sur ces tables une grande quantité des differences dans les fleurs et les fruits, qui interessent et par rapport à l'economie et par rapport à l'embellissement des jardins. Quant aux plantes exotiques, employées et dans la medecine et dans le ménage, mais très peu cultivées alors en Europe, il les emprunta des voyageurs et de tant d'autres ecrivains, en se servant des petites figures dans l'Hist. des Drogues par Pomet, et en donnant aux figures la grandeur, qui lui parût naturelle. Il emprunta aussi plusieurs plantes de la *Phytographia* de Pluknet et de Munting. Ceux de
de


de vegetaux Africains , communiqués par Mr. le Prof. Burmann, si illustre entre les botanistes , font un des principaux ornemens de l'ouvrage. Aussi Mr. Burmann le fit - il traduire en Hollandais pour le faire connaître à ses compatriotes. Mr. de Haller, également grand et par ses lumières & par son activité bienfaisante, decora l'ouvrage d'un prologue contenant une histoire critique de toutes les gravûres botaniques, composées par des Allemands. L'ouvrage même procura à Mr. Weinmann l'honneur, que, pour immortaliser ses merites pour la botanique, l'on donnait à une plante son nom, *Wwindmannia* Linn. Syst. Nat. *Wwindmannia*, Browne Civil and natural history of Jamaica. Lond. 1756. fol. p. 212. (*)

Il ne faut pas pourtant, que nous laissons passer sous silence les imperfections d'un ouvrage si precieux. Il était d'autant plus difficile d'éviter ces imperfections, que Mr. Weinmann l'entreprit dans un tems, où dans la botanique regnait encore presque partout la methode de Tournefort. Dillenius, Vaillant, Boerhaave, plusieurs autres Bota-

(X)(

ni-

(*) Dans les Supplemens de Linné (Brunsw. 1781. 8.) on rencontre les espèces suivantes : 1. W. pinnata. 2. W. glabra. 3. montana. p. 227. Nous ajoûtons W. fyluicola dans la nouvelle Zeelande. On en voit une très belle figure dans les Icon. Banckian. Dec. II. n. 17.



nistes indiquèrent les vices de cette methode par rapport à la determinaison des caracteres generique , à l'arrangement des classifications naturelles, à la denomination des differentes espèces, à la distinction des variations. Mr. Weinmann n'osa donc préférer ni la methode de Tournefort, ni celle de Boerhaave, ni une autre ; il résolut de présenter les plantes en ordre alphabétique. Comme il obtint par ses amis des denominations differentes, selon les differens systèmes botaniques, que chacun avait adopté, ou selon la terminologie vulgaire des apothicaires et des jardiniers, il en resulta une separation des plantes, qui appartiennent à la même famille, et une difformité dans les noms. Comme plusieurs dessins n'étaient fait que d'après des plantes sechées, on ne marqua pas exactement partout les differences specifiques, moins encore les parties sexuelles, qui ne furent choisi par Mr. Linné pour deternier les caracteres. Il n'est pas moins facheux, que Mr. Weinmann se fia trop à l'exactitude des dessins dans les collections de Pomet et Munting, et qu'il n'avait pas l'occasion de les comparer avec les plantes.

Cette nouvelle edition obviara maintenant, autant que possible, aux défauts indiqués. Pour toutes les plantes on se sert des termes conformes d'après la methode du Chevalier Linné, approuvée presque par toute l'Europe ; on grave sur les tables
près

près de chaque plante le nom du genre, de l'espèce, de la variation. De cette manière on se familiarise à la vue du dessin avec la terminologie exacte de botanistes & on voit en même tems au bas de tables les noms latins, allemands, français, usités et chez les anciens Herboristes et encore aujourd'hui chez la plûpart des apothicaires et des jardiniers. Quelques denominations incorrectes ont été changées. On indiqua aussi les plantes, empruntées d'autres botanistes, p. e. de Commelin, Pluknet, Pomet, Munting, pour insinuer, sur quelle autorité est fondée l'exactitude de la figure. Là où les dessins sont douteux ou incorrects, on allégué d'autres ouvrages, qui fournissent des dessins plus fidèles. On était même presque résolu, de donner des certaines plantes un nouveau dessin plus exact: mais on renonça à ce projet; en ne voulant pas indisposer les amateurs, qui par leurs prénumérations avaient si genereusement protégé la première édition, et qui pourroient se plaindre, si, en réjettant trop des planches, nous donnions occasion, que leurs exemplaires de la première édition perdraient trop de leur valeur.

Pour rendre cette édition plus utile, nous donnons des toutes les figures, dont il y a plusieurs milliers dans cette collection de Weinmann, un catalogue exact, qui indique en ordre systématique

)()(2

d'après



d'après la quatorzième édition du *Système botanique* de Linné, faite par le Chevalier Murray, les classes, les genres, les espèces, les subdivisions avec leurs variétés et leur denomination triviale, les noms en allemand, en français et anglais. Auprès des figures empruntées d'autres ouvrages, on marque l'auteur et l'endroit, d'où Mr. Weinmann les tira. Là où ces figures sont douteuses ou peu fidèles, on indique les ouvrages, où l'on les trouve plus exactes. Quant aux plantes officinelles, on indique les tables de la collection botanique de Blackwell, corrigée et augmentée par Mr. le conseiller TREW. Par le moyen d'un tel catalogue systématique on peut, à ce que nous croyons, se passer du texte prolix de la première édition de l'ouvrage de Weinmann, surtout comme les descriptions botaniques, qu'on y trouve, sont bien peu conformes à la botanique plus éclairée de nos jours. Les denominations et les écrits de Linné indiqueront aisément à chacun les endroits, où il peut chercher ce qui lui servira dans le regne vegetal pour la medecine, pour l'oeconomie le jardinage &c. On préférera de le chercher dans les ouvrages séparés, composés par les savans les plus habiles sur des parties particulières, que dans les relations confuses, dont l'ouvrage de Weinmann est appesanti. Les écrits de Linné se trouvent sans cela dans toutes les mains. En Allemagne le système botanique est commenté amplement par Houttyn, Gmelin, Panzer. On a le re-

gne

gne végétal par Dietrich, les institutions botaniques par Schinz, sans parler des ouvrages plus complets des Bauhins, de Ray, de l'immortel Haller. Quant aux plantes médicinales nous renvoyons à la *materia medica* de Dale, à Geofroy, *Onomatologia medica*, à Blackwell, Spielmann, Neumann, Lewis, Alston, Murray, et encore à Linné. Ces auteurs fourniront les connoissances les plus détaillées. Quant aux plantes, dont on se sert pour l'oeconomie, il y a tant d'ouvrages, qui les expliquent, qu'on n'a pas besoin de chercher leur description dans l'ouvrage de Weinmann. Nous n'alléguons que les différens écrits de Du Hamel, le Dictionnaire du jardinage par Miller, les ouvrages de Lüdert, surtout ses Jardins botaniques et oeconomiques, dont la plus grande partie est puisée des ouvrages anglais de w. Hanbury, Mawe et Abercrombie; encore la Pomologie de Manger et les auteurs sur la culture des bois.

En arrangeant ainsi tout de sorte, qu'on peut se passer d'un texte trop prolix, nous épargnons beaucoup des depenses, qu'autrement un tel ouvrage aurait coûté. C'était de la même manière qu'on agit dans la nouvelle édition des excellens ouvrages du grand botaniste DILLENIVS in *Horto Elthamensi & Historia muscorum*, où on se borna à donner un catalogue de plantes figurées.



Le tems et la peine, employés pour rectifier l'ouvrage de Weinmann et pour le rendre d'un usage plus grand et plus commode, me sont recompensés suffisamment, si l'entreprise contribuë, à l'encouragement des études botaniques et à glorifier les Createur dans ses oeuvres.

Jean Elie

Haid.

Le-

Lectori beneuolo.

Paucis tantum commemorare licet, quod ea, quae huic operi subiunxi, parenthesi claudantur, et ab iis segregentur, quae GESNERI sunt. Res parua sane mihi quidem videtur, quae studio et diligentiae clariss. Dr. Joan. GESNERI annexere tentavi. Tempus enim in quo omnia erant absoluenda, mihi, multis occupationibus distracto, et sicuti fors est medicorum, negotiis practicis interpellato, ita erat breuissime circumscriptum, ut quae in promptu fuerunt, tantum exposuerim. Praeterea, quod bene notandum, finis illius, qui sumtus in hoc opus fecit, non erat, ut pluribus additamenti opus augeatur. —

Ille vero vir doctissimus GESNER, rerum naturalium cognitione expertissimus, multorum annorum industria, WEINMANNI herbarium ita disposuit, et ad normam systematicam LINNEI res adeo ordinauit, ut phoenicis instar reuiuiscat,
et



et in vfus cuiuscunque, qui botanici ftudii amore capitur, tranfeat. Non dubito ergo, quin comuni celebretur affenfu hoc opus, quod doctis quibuscunque commendatur.

Auguftae Vindelicorum. 1787.

d. 17. Januar.

Dr. Christoph. Ludov. Becker,
Phyfic. ordinar. et orphanotr.
medicus.

CLAS-

CLASSIS I. MONANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

* SCITAMINEAE. Inferae, fructu loculari infero.

Genus.

Tab. Tom. Lit.

1. CANNA. Das Blumenrohr. *le Balisier.*

Indian cane.

Species: indica LIN. flore rubro. Indisches Bl. II. 297. b.

Varietas: folio variegato, coccineo flore. — 298. a.

— — flore rutilo. — — — b.

— — flore luteo punctato. — 297. a.

— — flore flavescente. — 296.

2. AMOMUM. Kardamome. Cardamome.

Cardamons.

racemosum, WEINM. ex POMET. p. 45. f. 31. I. 101. b.

Zingiber. LIN. Mater. Med. Nr. 70. Jngs

wer. Gingembre. the ginger. N. Hort.

Malab. XI. f. 12. JAQUIN. hort. Vin-

dob. Tab. 75. — — IV. 1025. a.

Zerumbet L. BLACWEL. t. 402. Hort.

Mal. XI. t. 13. Murray. Comment, Goet-

ting. III. 1775. Tab. 2. (Kardamom von

Madagaskar.) — — — 1025. b.

Cardamomum. LIN. m. m. 71.

minus, ex MUNTING. phytogr. t. 65.

SONNERAT, voyage aux Indes Orien-
tales & à la Chine. Vol. II. t. 136.

Malabar. Kard. — II. 306. a.

longum f. medium. POMET. f. 34.

fructus huius cardamomi v. CAMER.

Epit. II. N. 2. — — — b.

- grana paradisi. *LIN.* m. m. 72. *BLACKW.*
 584. *Paradies; Rörner.* Graines de Paradis ou Malaguettes. Grains of Paradis. Cardam. maius. *MUNT.* 65. *BLACKW.* 584. — 305.
3. **COSTUS.** *Rostwurzel.* Costus. Sweet and bitter costus.
arabicus. *LIN.* m. m. 73. *BLACKW.* 394. *Galanga lampoesang dicta WEINM.* Hort. Malab. XI. 8. *MERIAN.* Surinam. 37. *JACQUIN.* Americ. t. 1. (Mulum, ait, differre a costo Arabico.) — III. 527. a.
dubius. *POMET.* Fig. 46. — — b.
4. **ALPINIA** *racemosa.* *LIN.* v. *SLOANE,* (voyage to the islands Jamaica. -) T. 105.
 1. *ROTBOLL* Act. Hafn. Vol. II. Tab. I. — — b.
5. **MARANTA** *arundinacea.* *LIN.* *Schilfsichte Marante, indische Pfeilwurzel.* Marante. Indian arrow wort. - a. *Galanga maior caulescens WEINM.* (Fig. inepta.)
 v. *MARTIN.* centur. rar. T. 37. III. 526. b.
 b. *Galanga minor officin.* *LIN.* m. m. 74. *Kleiner Galgant, petite galange. common galange.*
fig. dubia. *POMET.* F. 51. — — c.
6. **CURCUMA.** *Gilbwurzel, Kurfum.* Souchet des Indes, ou terre merite. Tourmerick.
longa. *LIN.* m. m. 75. *BLACKW.* 396. *HERMANN.* hort. Lugd. Bat. 209. — II. 448. e.
7. **KAEMPFERIA.** *Rämpferin.* Galanga.
LIN. hort. Cliff. Tab. 3. *Galanga maior.*
POMET. p. 79. F. 50. *vitiosa.* *Grosser Galgant.* — — III. 526. a.
 ** MONOSPERMAE.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

11. **HIPPURIS**, Tannwädel. Pin d'eau. Ma-
res-tail.
vulgaris. *LIN.* Gemeiner Schafthalm.

II. 480. e, f.

ORDO II. DIGYNIA.

13. **CALLITRICHE**. Wasserstern. Callitric.
Starwort. auctumnalis. *LIN.* Herbst W. IV. 949. b.
14. **BLITUM**, Schminkebeeren. Blette. Straw-
berry-blite.
capitatum. *LIN.* Köpfige Beermelde. — 945. b.

C L A S S I S II.

D I A N D R I A.

ORDO I. MONOGYNIA.

a. Flores monopetali inferi regulares.

17. **IASMINUM**. Jasmin. Iasmin.
officinale. *LIN.* m. m. 78. Gemeiner Jas-
min. *BLACKW.* 13. witte. I. III. 602. a.
grandiflorum. *LIN.* Spanischer Jasmin. — — f.
azoricum. *LIN.* Azorischer Jasmin. — — b.
fruticans. *LIN.* Gelber strauchartiger J. — — d.
humile. *LIN.* Niedriger Jas. Italian. I. — — e.
odoratissimum. *LIN.* Indianischer wohlrie-
chender Jasmin. Yellow Indian. I. — — c.
18. **LIGUSTRUM**. Hartriegel, Windholz.
Troene. Privet,

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- vulgare. *LIN.* Rheinweide, Hartriegel.
common privet. *BLACKW.* 140. III. 650. b.
Variet: folio variegato. — — d.
19. *PHILLYREA*. Steinlinde, Filaria, Mock-
privet.
media. *LIN.* Mittlere St. broad leaved M. IV. 809. f.
20. *OLEA*. Delbaum. Olivier. Olive.
europaea. *LIN.* m. m. 79. Zahmer Del-
baum. *BLACKW.* 199. *MURRAY.* dis.
de olea europ. Goetting. 1780. 4. III. 764. b.
Var: filuestris folio oblongo subtus incano.
Willd. D. *BLACKW.* 213. — — c.
21. *SYRINGA*. Glieder, Spanischer Holzer.
Lilac. the blue jasmin.
vulgaris *LIN.* flore coeruleo. — IV. 959. a.
variet: flore albo. — 958. c.
— laciniata *Perfida.* — 959. b.
b Flores dipetali superi.
24. *CIRCAEA*. Hexenfraut. Circée. Buchan-
ters night - shade.
lutetiana. Großes Hexenfraut. — II. 389. a. b.
alpina *LIN.* Kleines Hexenfraut. — — c.
c Flores inferi monopetali, irregulares fructus capsulares.
25. *VERONICA* Ehrenpreis. Veronique.
Speedwell.
virginiana *LIN.* Virgin. E. — IV. 1005. b.
spicata *LIN.* Ueberrichter E. — — b. c.
spuria *LIN.* Unächter E. — 1006. d.
officinalis. La veronique mâle, ou thé d'Eu-
rope. Fluellin. *LIN.* m. m. 80. *BLACKW.* 143. — — b.
maritima *LIN.* Am Meerstrand wachsender E. — — a.
serpyllifolia. Quendelblättriger E. — 1004. f.

bec-

Genus.

Tom. Tab. Lit

- beccabunga. Bachbungen. la beccabongue.
 brook-lime. *LIN.* m. m. 81. *BLACKW.* 48. I. 233. a.
 anagallis. Gauchheilbläteriger E. - — b.
 scutellata. Schildförmiger E. - — {234. b.
 {107. b.
 chamaedris. Wilder Gamander. veronique
 chenette. chikweed. - — 1004. g.
 variet. foliis pictis. - - — — h.
 agrestis. Feld E. - - — — c.
 hederifolia. Epheubläteriger E. • - — — d.
 triphylla. Dreibläteriger. - - — — e.
 teucrium. Blauer Gamander. V. teucriette.
 Garmander speedwell. - — 1005. a.
 prostrata. Eigender E. V. rampant. - — 1006. c.
 acinifolia. Feldquendelbläteriger E. V. romaine. — — e.
27. **JUSTICIA** adhatoda. Malabarische Ruß.
 le noyer de Ceylon. Malabar nut. II. 473. b.
29. **GRATIOLA**. Gemeines Gnadenkraut.
 Gratiolle, ou herbe à pauvre, Hedgehyssop.
 officinalis. *LIN.* m. m. 82. *BLACKW.* 411. II. 558. a.
1288. **CALCEOLARIA** integrifolia. *LIN.*
 suppl. p. 86. - - IV. 883. a.
30. **PINGUICULA**. Fettkraut, Butter-
 kraut. Grasslette. Butterwort.
 vulgaris. Gemeines Fettkraut. - IV. 812. h.
31. **VTRICVLARIA**. Wasserschlauch. Len-
 tubulaire. Hooded milfoil.
 vulgaris. Gemeiner Wasserschlauch. - III. 637. c.
 d. Flores monopetali inferi irregulares; fructus gymnospermi.
32. **VERBENA**. Eisenkraut. Verbene. Ver-
 veine.
 officinalis. Gemeines E. *LIN.* m. m. 183.
BLACKW. 41. - - IV. 1004. a.
- vrti-
- A 3

Genus.

Tom. Tab. Lit.

verticifolia. Nesselblättriges E. nettle leaved of

Canada. *MUNT.* 226.

- - - - b.

nodiflora. Knotiges E. V. with conical heads

of Virginia.

- - - 1006. a.

33. LYCOPUS. Wolfssuß, Wasserandorn.

le pied de loup, licorne. Waterhorehound.

europaeus. Gemeiner W.

- - - III. 712. a.

36. ZIZIPHORA. Zizenkraut. Wild basil.

capitata. Köpfiges Z. W. of Syria.

- II. 399. f.

37. MONARDA. Monarde. Monarde. Mo-

narda.

fistulosa. Hohlströhrichte M. *LIN.* m. m. 37. III. 640. c.

38. ROSMARINUS. Rosmarin. Romarin.

Roremarin.

officinalis. Gemeiner R. flores anthos. *LIN.*

m. m. 38. *BLACKW.* 159.

- IV. 872. a.

var. fol. variegatis.

- - - b.

39. SALVIA. Salbei, Sauge. Sage. v. *ETL.*

officinalis. Gemeine S. S. ordinaire, grande.

common sage. *LIN.* m. m. 4. a. maior. (*Bauh.*

S. latifolia. BRUNFELS.) *BLACKW.* 10. — 879. a. b.

b. minor, auriculata Schmalblättrige, edle

Salbei. la petite sauge. Sage of vertue.

BLACKW. 71. (angustifolia *CLUSII.*) — 880. c.

minor non auriculata fol. variegato. Spizsal. — 880. a. b.

viridis. Grüne S. (*JACQ.* icon. plant. rar. 42.) III. 580. c. e.

horminum. Ormin, toute bonne. *LIN.* m. m.

87. *BLACKW.* 122.

- - - 580. b.

varietas.

- - - 582. a.

haematodes. Blutsalbei.

- - - 578. d.

pratensis. Wiesen S. Wildes Scharlachkraut.

ormin.

Genus.	Tom.	Tab.	Lit.
ormin sauvage. meadow clary. <i>BLACKW.</i> 122.	—	—	a. c.
var. flor. albo.	—	—	b.
fol. pictis.	—	579.	a.
difermas. Weiße Salbei.	—	581.	a.
indica. <i>MUN.</i> 180.	—	—	c.
verticillata.	—	580.	d.
verbenacea.	—	581.	d.
glutinosa. Klebrige gelbe S. (<i>JACQ.</i> ic. pl. rar.			
14. viscosa.)	—	—	b.
sclarea. Muskatellerkraut. Orvale; toute bonne.			
<i>LIN.</i> m. m. 88.	—	579.	c.
aethiopis. Geferbte Mohrensalbei. Orvale des			
Prés.	—	—	d.
nemorosa. Glatte rothe S.	—	582.	c.
pinnata. Gefiedertblättrige S. S. with winged			
leaves.	—	581.	f.
filuestris. Wald S. <i>JACQUIN.</i> Austr. 212.	—	579.	a.
e. Flores superi.			
41. MORINA persica. Persische Morine.			
Morine.	II.	312.	

Ordo II. DIGYNIA.

42. ANTHOXANTHUM. Ruchgras. Avenette blonde. Vernal or Springgras.
 odoratum. Wohlriechendes R. - III. 556. b.

Ordo III. TRIGYNIA.

43. PIPER. Pfeffer. Poivre. Pepper.
 nigrum. *LIN.* m. m. 90. *BLACKW.* 348. P.
 noir. black pepper. Gemeiner Pfeffer. IV. 815. a. b.
 longum. Langer Pff. P. long. Longpepper.
LIN. m. m. 91. *BLACKW.* 356. — 814. c. d.
 cubebae. *LIN.* m. m. 92. Suppl. p. 90. Cube-
 ben. Cubebs, Cubebs, *POMET.* 179. fig. vitiosa, II. 440. a.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

a. Flores superi.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

44. VALERIANA. Baldrian. Valeriane.
 Valerian. Phu; maior. Grande V. Garden V.
 Großer, oder Gartenbaldrian. (Altera varietas:
 minor f. officinalis. f. silvestris. Gemeiner,
 Waldbaldrian. V. HILL on valerian.) LIN.
 m. m. 94. BLACKW. 250. - IV. 1000. g.
 rubra. Rother Baldrian. V. rouge. red V. — 1001. e.
 variet: alba. Weißer B. - — d.
 calcitrapa. Sternbaldrian. with wing - poin-
 ted leaves. - - — 1000. e.
 cornucopiae. Füllhorn B. - — 1002. a.
 dioica. Sumpf B. petite V. small V. BLACKW.
 484. (V. officin. pallustris f. phu minor?) — 1001. a. b.
 montana. Berg B. mountain V. - — c.
 celtica. Spica celtica officinar. LIN. m. m. 95.
 JACQUIN. Fl. Vind. p. 203. Nard celtique. — 945. a.
 saxatilis. Stein B. mountain spike nard. — 1000. d.
 locusta. a. olitoria. Ufersalat, Rüsslein-
 kraut. mâche. cornsalad. - III. 620. e.
 b. stellata. Gesterntes Rüsslein-kraut. IV. 1002. b.
 c. vesicaria. N. mit aufgeblasener Frucht. — 1000. f.
 55. CROCUS. Safran. Safran. Safron.
 sativus. a. officinalis. Gemeiner C. cul-
 tivated safron. C. S. auctumnalis. LIN. m.
 m. 55. BLACKW. 144. - II. 438. a.
 b. vernus. Frühlings Safr. Garden S. c. — b-k.
 var. BLACKW. II. k. latifolius flavus. i. lu-

teus

Genus.

Tom. Tab. Lit.

teus minor; h. flore aureo, cum lineis
purpureis; c. flore albo; d. flore albo,
striis coeruleis, coerulescente; e. f. g. fl.
purpureo.

57. GLADIOLUS. Schwertel, Schwertlilie.

Glaieul, cornflag.

communis. Gemeiner S.	-	III. 546. e. f
var. a. flore albo.	-	- - c.
b. flore pallidior rubro.	-	- - d.
angustus. (Tab. IV. 925. b?)	-	- - b.
alatus. Geflügelter S. (Tab. IV. 925. a?)		
Nonne sisyrinchium Cap. b. Sp. BURM.		
ex PLUKN. 224. 8?	-	IV. 925. c.

58. ANTHOLYZA cunonia. (Tab. IV. 925. a?)

III. 546. a.

59. IRIS. Lilie. Flambe, iris, Flower de Luce.

germanica; nostras officinalis. Beilschwurzel.

I. d'Allemagne. common Fl. de Luce.

LIN. m. m. 99. BLACKW. 69.	-	607. a.
florentina. Florent. L. I. de Florence. Flo-		
rentin Iris. LIN. m. m. 98. BLACKW. 414.	-	606. c.
fusiana. Sussanische L. Chalcedonian Iris.	-	611. b.
sambuccina. Holder L. Great Dalmatian I.	-	607. c.
squalens.	-	612. b.
variegata. Bunte L.	-	608. c. c.
pumila. Niedrige L.	-	612. c.
versicolor. Vielsfarbige L. cum varietatibus.	-	612. a, b, d.
virginica? Virginische L.	-	607. b.
sibirica. Sibirische L.	-	613. b.
pseudacorus. Gelbe Wasserlilie, rother Kal-		
mus. Bastard acorus. flambe d' eau.		
BLACKW. 261.	-	III. 606. b.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- graminea. Gras, Pflaumen & Grafs-leaved. Fl. — 611. c.]
 613. a.]
 perfica. Persische P. — — 609. b.
 xiphium. a. flore coeruleo simplici et pleno. — — d. e.]
 b. flore flavo. — — a. c.]
 c. flore albo, pallido. — — 610. e. f. g.]
 d. flore purpureo. — — a. d. c.]
 611. a.]
 e. flore bicolori & variegato. — — 610. b.]
 611. d.]
60. MORAEA. vegeta. Frische Moräa. IV. 925. b.
 b. Flores inferi.
61. WACHENDORFIA. thyrsiflora. Ephem-
 erum phalangoides. BURM. ex PLU-
 KEN. 174. 6. — — II. 478. c.]
62. COMMELINA communis. common.
 Commel. ephemerum Afr. flore dipetalo. — 477. c.]
46. TAMARINDUS indica. Tamarinde,
 (Tamerhinden.) Tamarin. tamarind - tree.
 LIN. m. m. 96. BLACKW. 201. 221. v.
 (JACQUIN. stirp. Americ. hist. p. II. t. 13.
 Hort. Malab. RUMPH. Amb. 2. p. 90. t. 23.
 Curacauientes fructus in maximo haben-
 tur pretio.) — — IV. 964. a. b.]
48. CNEORUM tricoccum. Seidelbast.
 widow - wail. — — II. 362. a.]
 c. Flores graminei, valvulis glumae calycinae.]
66. CYPERUS longus. Lange Cyperwurzel.
 le fouchet long. long-rooted cyperus.
 LIN. m. m. 103. BLACKW. 316. II. 455. a.]
 rotundus. Runde C. LIN. m. m. 104. — — b.]
 esculentus. Essbare C. — — 1c.]
 flaves cens. Gelbdunkle C. — — III. 554. c. d.]
 fuscus.]

Genus.		Tom. Tab. Lit.
fuscus. Straußgras.	- -	- - e.
67. SCIRPUS pallustris. Sumpfsensen.	- -	- - e.
Scirpe. clubrush.	- -	III. 614. d.
SCIR. lacustris. Seesensen.	-	III. 614. c.
maritimus. Seeküstensen. round routed S.	-	553. d.
fluviaticus. Wald S. millet cypergras.	-	555. a.

65. ERIOPHORUM. Wollgras, Wiesens
wolfe. chenouelle. Cottongrass.

polystachion.	- -	- 552. k.
vaginatum.	- -	- 553. b.

Ord. III. DIGYNIA.

I. Flores uniflori vagi.

76. PANICUM. Fennich. Panic. Panickgras.
viride. Grüner F. green P. - - 555. g.
italicum. Ital. F. Italian P. - IV. 786. b.
crus galli. loose P. - III. 552. d.
sanguinale. Schwaden. - - 552. f.
dactylon. Mannagrass. P. manne. creeping P. - 554. g.
miliaceum; milium officinale. Hirse. mielet.
millet. LIN. m. m. 107. - 729. c.
77. PLHEUM pratense. Feldkolbengras.
massette. meadow cats-tail grass, fox-
tail grass. - - 554. f.
74. PHALARIS canariensis. Kanarisches
Glanzgras. canarygrass. (vide semina
canariensis.) Kanarischer Saame. LIN.
m. m. 106. - - 552. h.
arundinacea. schilficht Rohrgras. - I. 180. a.
variet. fol. variegatis. - - b.
aquatica fol. variegatis. - - III. 555. h.
80. AGROSTIS capillaris. Haarförmiges
Streugrass. eternue. fine bentgrass. - 554. k.
90. STI-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

90. *STIPA* pennata. Federgras, Spartengras.
 etiepe, aigrette. - - - 553. a
92. *LAGURUS* ouatus. Samtgras. fox-tail. III. 552. a.
73. *SACCHARUM* officinarum. Zuckerrohr.
 Sucre. sugar - cane. LIN. m. m. 105.
MUNT. 109. *SLOANE.* I. 66. I. 178. a. b.
 2. Flores biflori vagi.
82. *MELICA* nutans. Ueberhangendes glas-
 tes Perlgras. Melicgras. - III. 553. h.
 3. Flores multiflori vagi.
84. *BRIZA* media. Mittleres Zitergras. Amou-
 rette. quakinggras. - - - 555. e.
 maxima. Das größte Z. great quakinggr. - [554. l.
 556. a.
83. *POA*. Rispengras. Poherbe. meadow-
 gras. - - -
 aquatica. Wasser R. Viehgras. reed. M. III. 554. h.
 triuialis. Weggras. common M. - 556. l.
 compressa. Zusammengedrucktes R. - 554. i.
88. *FESTUCA* duriuscula. Schwingel. Fe-
 stuque. fescuegras. - - - 554. b.
89. *BROMUS* pinnatus. Gefiederter Tresp.
 brome. spiked brome - gras. - - [552. e.
 556. g.
 tectorum. Dachtresp. Wall brome - gras. - 552. c.
91. *AVENA* sativa alba. Weißer Haber.
 avoine. oats. - - - I. 205. a.
 nigra. Schwarzer H. black oats. - - - b.
93. *ARUNDO*. Rohr. Roseau. reed.
 phragmitis. Schilf, gemeines Rohr. com. R. [I. 179. a.
 III. 554. a.
 donax. Zahmes Cyprisches R. Ros. des jardins.
 the great reed, *MUNT.* 108. - I. 179. b.
 varie-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

varietas: folio variegato. Spanisches R. I. 179. c.

bambos. Bambus R. bambu cane. H. Mal. I. 16. — 226.

4. Spicati receptaculo subulato.

97. SECALE cereale. a. hibernum. Winters

roggen. Seigle. Rie. BLACKW. 424. IV. 910. c.

b. verum. Sommerroggen. — — — d.

var. Spica gemina. — — — b.

99. TRITICUM aestivum. Sommerweizen.

blé tremoir, wheat. — IV. 981. b.

hibernum. Winter W. froment. W. winter.

LIN. m. m. 110. BLACKW. 40. — — — a.

spelta. Kern, Korn. — — — a.

compositum. — — — c.

turgidum. — — — d.

repens. radix graminis officinar. Quecken,

Graswurzel. chien - dent. quickgras. LIN.

m. m. III. — — — III. 556. f.

98. HORDEUM vulgare. Gemeine Gerste.

Orge. springbarley. LIN. m. m. 109.

BLACKW. 423. — — — 577. c.c.

variet. nudum, celeste. Jerusalemkorn. na-
cked barley. — — — b.

95. LOLIUM perenne. Süßer Winters

solch. painvin. perennial darnel. — 556. e.

Ord. III. TRIGYNIA.

104. HOLOSTEUM umbellatum. Hüners

raute. — — — I. 78. c.

CLAS-

CLASSIS IV. TETRANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA,

a. Flores monopetali monospermi inferi.

Genus. Tom. Tab. Tit.

110. PROTEA. Schillerbaum, Goldbaum.

planer. silvertree.

* dentatae.

conocarpa. scolymocephalus African. folio
crasso neruoso. *BURM.* Conocarpodendron

BOERH. Ind. alt. II. 196.

IV. 899. b.

hypophylla. Conocarpod. *BOERH.* II. 198. — 902. a.

cucullata. hypophyllo - carpod. *BOER.* II. 206. — 905. b.

scolymus. lepidocarpodend. *BOER.* II. 192. — 893. b.

mellifera. lepidocarpod. *BOERH.* II. 187. — 896.

repens. lepidocarpodend. *BOERH.* II. 190. — 897. a.

pallens. Scolymocephalus Afric. Brandholz
baum. *BURM.* Conocarpod. *BOERH.* II.

197.

— 901.

varietas: a. scolymocephalus minor. (coni-
fera.) *BURM.* conocarpod. *BOERH.* II. 200. —

903. a.

b. foliis tenuissimis. *BURM.* conoc. *BOERH.*

II. 203.

— 904. b.

c. fol. tenuibus angustis. ib.. *BOERH.* 204. — 905. a.

Lewisanus. scolymocephalus fol. breuissimis.

BURM. conocarpod. *BOERH.* II. 202.

— 904. a.

argentea. Scolim. fol. fericeo. *BURM.* Conoc.

fol. argenteo. *BOERH.* II. 195.

— 900.

** oblongae.

acaulis. Lepidocarp. *BURM.* *BOERH.* II. 191. — 897. b.

grandiflora. Lepidoc. ib. II. 283.

— 891.

spe-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

speciosa. Scolymoc. tulipifer latifolius. BUR.

BOER. II. 185. — 893. a.

variet: a. scolim. fol. angustis villosis. — 894.

b. scolim. cono variegato. Lepidoc. BOERH.

II. 188. — 895.

c. sc. frutice conifero. Lepid. BOER. II.

189. — 898.

hirta. scolymo. fol. Dorycnii. B. Lepidoc.

B. II. 194. — 899. a.

variet: scolym. foliis lanuginosis. BURM.

Hypephyllocarpodendron. BOERH. II. 209. — 906. a.

*** rotundatae.

cynaroides. Scolym. fol. lato rotundo B.

Lepidocarpod. BOERH. II. 184. — 892.

variet: scolym. fol. subrotundis glabris B.

Conocarpod. BOERH. II. 199. — 902. b.

112. GLOBULARIA vulgaris. Gemeine

Kugelblume, franz. Masliebe. Globulaire.

blue daisy. — I. 238. a.

b. Fl. monopetali, monospermi, fu-
peri, aggregatae. —

114. DIPSACUS. Weberkarten. Cardiere. Tazel.

fullonum. Weberdistel. Chardon bonnetier.

BLACKW. 50. siluestris. — II. 465. a.

variet: flore albo sativus. — 466. b.

— flore rubro. — 467. a.

laciniatus. — — — b.

115. SCABIOSA. Scabiose. Scabieuse. sca-

bious. —

aruenfis, officinarum. LIN. m. m. 113.

BLACKW. 185. Gemeine Scab. Grind,

Apostemfraut. Sc. des Prés. scab. pratensis.

common field sc. — — IV. { 887. c.

889. c.
succisa.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

succisa. morsus diaboli officinarum. Teufels;

biß. mors du diable. devils-bit. LIN. m. m.

112. BLACKW. 142. (OED. Fl. Danica. 279.)

flore coerul. — — — 887. e.

variet. flore rubro. — — — f.

filuatica. Bald Ef. Sc. des bois. — 887. b.

columbaria. quoad folia et caulem; flos est

catananches coeruleae. — — — 886. c.

stellata. Grosse Spanische Ef. — — — e.

variet. minor, alba & lutea. — — 888. d. c.

atropurpurea. — — — [889. b.
888. a.]

variet. a. rubra. — — — — a.d.

b. alba. — — — — 888. b.

c. variegata. Indische Ef. — — 886. d.

prolifera. — — — — 888. e.

116. KNAUTIA orientalis. Knaudia, aus

Indien. — — — — 886. b.

c. Fl. monopetali, monocarpi, inferi.

142. PLANTAGO. Begerich. plantain.

wayhead, platin.

maior; latifolia officinar. LIN. m. m. 119.

BLACKW. 35. (OED. Fl. Dan. 581.) great

platin. — — — — [820. b.
821. a.]

a. rosea spicata. — — — — 821. e.

b. — expansa. — — — — 822. a.

media. — — — — [820. d.
821. bcd.]

lanceolata. Spizweg. P. à cinq côtes. rib-

wort. BLACKW. 14. (OED. Fl. D. 437.) — [822. b.
820. a.]

lagopus. — — — — 820. a.

alpina. — — — — 822. d.

psyl-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- psyllium, vnde semina officinar. Flohsaamen.
 pulcaire, herbes aux puces. fleawort.
L. m. m. 120. *BLACKW.* 412. — — 837. b.
 cynops. Französ. Flohsaamen. H. annuelle.
BLACKW. 543. — — — 543. a.
138. *PENAEA* sarcocolla. (mucronata ?)
L. m. m. 118. V. (*PLUCKN.* mant.
 183. t. 44. *MURRAY.* mat. med. Vol. I.
 p. 198. Sarcocol.) — — 885. b.
 d. Fl. monopetali, monocarpi, superi.
145. *SANGVISORBA* officinalis. Gemeis-
 ne Bibernel. pimpernel. burnet ? *L.*
m. m. 121. S. potius media? — — 811. a.
 canadensis. greatest Canada burnet. — — b.
 le. Fl. monopetali, dicocci, superi; stellatae.
- 119 *RVBIA* tinctorum, officinar. Krabb,
 Färberröhte. garance. dyers madder.
L. m. m. 106. *BLACKW.* 435. (cf.
P. ARDUINO memorie di osservazioni
 sopra varie piante. Padova. 1766. 4. vbi
 icon.) — — I. 146. a.
125. *GALIVM* filuaticum. Wald-Magerfr.
 Caille-lait. wood ladies bed- straw. [III. 714. c.
 [IV. 872. g.
 verum. Gelbes M. C. jaune. yellow ladies
B. luteum officinarum. *L. m. m.* *BLACKW.*
 435. — — — III. 530. b.
 mollugo. Weißes M. C. blanc. wild madder.
BLACKW. 168, — — — a.
 montanum. Berg M. mountain Ladiesb. III. 714. b.
 palustre. Sumpf M. — — I. 147. b.
 vliginosum, Wasser M. marsh goose grass, — — c.
 pusillum. Kleines M. — — IV. 873. c.

B

glau-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- glaucum. Lichtblaues M. - I. 146. b.
 aparine. Klebkraut. grateron. cleavers or
 goosegrafs. *BLACKW.* 39. - — 147. a.

121. *ASPERVLA* odorata. (Matrifilua of-

ficinar.) *L. m. m.* 111. Sternleberfraut,
 Waldmeister. aparinette, mouquet des
 bois. woodrow. (rubcola montana,
BAUH. OED. Fl. Dan. 562.) *BLACKW.*

60. Wohlriechender W. - III. 714. e.
 aruensis. Kleines blaues St. - IV. 872. e.
 taurina. Weisses St. - — 873. a.
 cynanchica. Kleine Färberröthe, fleischfarben
 St. petite garance, herbe à l'esquinan-
 cie. squinancywort. - IV. 872. f.

f. Fl. tetrapetali, inferi.

148. *EPIMEDIVM* alpinum. Pantoffelblu-

me, Bischofshut, Italien. Alpen P. cha-
 peau d'evêque. barren-wort.

II. 479. b.

g. Fl. tetrapetali superi.

147. *CISSVS* acida. planer. (*JACQUIN.* fel.firp. Americ. hist. p. 17. *BROWN* Jam. I.p. 147. *SLOANE* hist. Jam. I. p. 233. tab.142. f. 1. *PLUKN.* Alm. 71. tab. 152. f. 2.*RUMPH.* Amb. V. p. 450. tab. 166. f. 2.

Crescit Carthagenae, in Jamaica et S.

Domingo.) - - IV. 814. a.

149. *CORNVS*. Kornelkirschen. cornoullier.

cornel.

mascula. Dürlizgen. cornier mâle. cornel - berry

or cornelial cherrytree. *BLACKW.* 121. II. 429. d.

sanguinea. Hundebeeren. (sanguin, femelle.

dogwood. - - — — e.e.

157. TRA-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

157. *TRAPA natans*. (nux aquatica officinar.)
 Stachelwassernuß. la mère. water cal-
 trop. *L. m. m.* 123. - IV. 979. a.
480. *SANTALVM album*. Weisser Sandel.
 fantal. white sanders. *L. m. m.* 125.
 (*BREYN. T. 5. f. 1.*) - — {883. c.
 884. a. b.
 h. Fl. incompleti, inferi.
162. *RIVINA humilis*. Rivinische Pflanze.
 rivinie. - - — I. 87.
168. *ALCHEMILLA vulgaris*. Frauens-
 mantel. pié de lion. ladymantel. offi-
 cinar. *L. m. m.* 147. (*Oed. Fl. Dan.*
Tab. 693.) - - I. 37. a.
 varietas: folio luxuriante. - - — 36. d.
158. *DORSTENIA contraierua*. Dorstens-
 pflanze, Kontrajerva. officinar. *L. m. m.*
 124. ex *MUNTING. 213.* fidereon; ser-
 pentaria mirabilis est planta ficta. cf.
TREW. commerc. p. 377. an. 1738.
BLACKW. 599. philos. transactions
 nr. 421. - - IV. 916. a.
 h. Fl. incompleti, superi.
159. *ELAEAGNVS angustifolius*. Wilder
 Böhmischer Delbaum. olivier de Boheme.
 wild oliver. - - - III. 764. a.
156. *ISNARDIA palustris*. *MUNTING. 227.*
 Wasser Glaskraut. - - IV. 798. d.

Ord. II. DIGYNIA.

171. *HYPECOVM erectum*. Lappenblume.
 cumin cornu. erect. Hyp. - III. 590. h.
- B 2
170. CUS-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

170. *CVSCVTA* europaea. *Flachsseide*, *Silz*
 fraut. la cuscute. devils guts, dodder
 hellweed. *BLACKW.* 154. - II. 449. a.
 epithymum. *Thymseide*. cusc. minor. *L. m.*
m. 129. - - - 479. c.
 166. *APHANES* aruensis. *Frauenmantel* (I. 36. c.
 gen. parsley piert. perche pier. - (IV. 890. a.)

Ordo III. TETRAGYNIA.

172. *ILEX* aquifolium. *Stechpalme*. le houx.
 hollytree. *BLACKW.* 205. - I. 158. a.
 a, foliis variegatis. *MUNT.* 38. - - - b.
 b, fol. oblongis inermibus. *MUNT.* 39. - 159. b.
 c, fol. superficie spinosis, albis viridibus. - - a.
 174. *POTAMOGETON* natans. *Saam*
 fraut. pondweed. - IV. 830. c.
 lucens. longleaved p. - - 829. e.
 - varietas: foliis crassis, caule crasso. - - f.
 perfoliated per foliated. p. - - 830. a. b.
 crispum. - - - 829. a.
 176. *SAGINA* procumbens. *Massfraut*. pe-
 art-wort, or chick weed breackstone. I. { 78. e.
 { 77. b.

CLASSIS V.
 PENTANDRIA.
 ORDO I. MONOGYNIA.

I. Flores monopetali, inferi, tetraspermi; asperifoliae.

Genus.

Tom. Tab. L.

179. *HELIOTROPIVM* europaeum. *Scor*
 pionfraut, *Krebsblume*. heliotrope. Eu-
 ropean tournefol. (*Indicum* forsan 566. g?) III. 566. d. g.
 180. *MYO-*

Genus.

Tom. Tab. Lit.

180. MYOSOTIS, Mausöhrigen. myosotide.

mouse ear.

scorpioides. *a.* aruensis. Feld M. scorpiongrafs. — — *a. c.*— *b.* palustris. Vergiß mein nicht. — — *b.*lappula. Skorpionschwanz. — — *f.*

181. LITHOSPERMVM. Steinhirse, Stein-

saame. gremil. grommel.

officinale. herbe aux perles. officinal grom-

mel. *L. m. m.* 131. *BLACKW.* 436. (maiuserectum *B.*) — — — 671. *b.*aruense. Wilder St. gr. sauvage. field grom. — — *c.*purpureo-coeruleum. — — — — *a.*
[I. 272. *a.*

182. ANCHVSA officinalis. Gemeine Och-

senzunge. buglosse, gardenbuglofs. bug-

lossum officinar. *L. m. m.* 132. *BLACKW.*

112. 500. (Fl. Dan. 572.) Varietas da-

tur flore albo. — — — I. 271. *a. b. c.*

angustifolia. Wilde Ochsenz. wild borage.

MILLER. 72. — — — 272. *d.*

semperuirens Immergrünende Ochsen. ever-

green borage. — — — *b.*

183. CYNOGLOSSVM. Hundszunge. cy-

noglosse, langue de chien. hondstongue.

officinale; sc. varietas flore rubro. Gemeine

H common *H. L. m. m.* 134. *BLACKW.*249. — — — II. 454. *c.*apenninum. Berg H. greatest mountain *H.* — — *b.*cheirifolium. Kretische H. *H.* of Crete. — — *a.*

omphalodes. Nabelsaamen. petite bourrache.

spring navel-wort. — — — I. 253. *a.*

184. PVLMONARIA officinalis. Gemei-

nes Lungenkraut. pulmonaire. sage of

- Jerusalem. *L. m. m.* 135. *BLACKW.*
 376. Est varietas auctor. nostri foliis non
 maculatis (*Fl. Dan.* 482.) — 272. c.
185. *SYMPHYTVM officinale.* (*Consoli-
 da maior Pharm.*) Gemeine Schwarzwur-
 zel. consoude. comfrey. *L. m. m.* 135.
BLACKW. 252. (*Fl. Dan.* 664.)
- a. flore rubro s. purpureo-coeruleo { *IV.* 957. a. b. c.
 — 958 a.
 b. flore albo. Wallwurzel. Solet eligi a Ph. — 956. c.
 tuberosum. — — — — 958. b.
186. *CERINTHE maior.* Grosse Wachsblu-
 me. melinet. honeywort. a. maculata
 rubra purpurea. — — — *II.* 360. b.
 b. flaua maculata. — — — { 359. a.
 — 360. a. c.
 c. variegata purpurascens. — — — 359. b.
 minor. Kleine W. smaller H. — — — c.
187. *ONOSMA echioides.* Lotwurzel. flore
 luteo, non rubro. — — — *I.* 117.
188. *BORAGO officinalis.* Gemeiner Bor-
 retsch. bourache. borage. (*buglossum
 latifolium C. B. Hort. Roman. T. II.
 t. 20. 21.*) *L. m. m.* 188. *BLACKW.*
 36. a. flore coeruleo. — — — 253. b.
 b. flore albo. — — — c.
 indica. Jüdischer B. — — — 254. b.
189. *ASPERVGO procumbens.* Schorfs-
 fraut. rapette. — — — 148. a.
190. *LYCOPSIS variegata.* Krummhals,
 Wolfsgesicht. flores ex albo purpurei. — 254. c.
 aruenfis. small wild bugloss. fl. coeruleo. — — a.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

191. ECHIVM. Wilde Ochsenzunge, Rats

terkopf viperine. vipers bugloss.

vulgare. Gemeine W. D. a. fl. coeruleo.

BLACKW. 299. - - II. 475. b.

b. laticaulis. flore coeruleo. - - 475. c.

c. flore albo, rubro. - - [474. d. e.

creticum. Kretische W. D. V. of Candia. - 475. a.

2. Flor. monopetali, inferi, angiospermi, 474. c.

197. PRIMVLA. Schlüsselblümchen. prime-

vere, prime-rose. cow-flip.

veris. Vide a. officinalis. Angli hanc deno-

minant paralyfin. L. m. m. 138. BLACKW.

226. odorata est. Gemeines Schlüsselbl. IV. 831. h.

Hæc vel a. flore rubro umbellato. - 832 c. d. e.

vel b. flore umbellato prolifero reperitur. - [831. l.

832. a.

b. elatior, ab Anglis primula vocata. BLACKW.

52. (Fl. Dan. 434.) Himmelschlüssel. - 834. c. e. f.

a, flore luteo pallido. - - 831. i.

b, flore incarnato. - - k.

c, flore rubro prolifero. - - b.

c. acaulis, a. flore flauo. - - g.

b, flore rubro. - - c. d. e.

c, flore violaceo. - - f.

d, flore albo. - 832. f.

e, flore albo incarnato. - - g.

Plures colorum varietates v. - 833.

farinosa. Lerchenblümgen. - 834. a. b.

auricula. Bergsanitel, Murifel. oreille d'ours.

bears ear.

a. alpina foliis rotundis, flore albo. I. 207. b.

b. — foliis carnosis glabris, alba. - - c.

c. — laticaulis. - - d.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- d. flore variegato.* - - - 208. a. b. d.
e. flore purpureo pleno. - - - c.
f. foliis farina quasi asperfis. - [209.
 210.
g. plures colorum varietates V. - 211. - 216.
199. **SOLDANELLA** *alpina.* Bergsoldan-
 nelle. soldanelle. mountain foldanella. II. 420. b.
201. **CYCLAMEN** *europaeum.* (arthanita
 Pharm.) *L. m. m.* 139. *BLACKW.* 147.
 (*MILLER.* T. 115. Hort. Rom. II. 63.)
 Schweinebrod, Erdscheibe. cyclamen,
 pain de pourreau. Sowbread. - 453. d. e. f.
a. flore albo. - - - a. b.
b. folio longiore anguloso. - - c.
202. **MENYANTHES** *trifoliata.* (trifolium
 fibrinum f. paludosum Pharm.) *L. m. m.*
 140. *BLACKW.* 474. (Fl. Dan. 541.) *Wit-*
berflee. meniante, ou trefle d'eau. marsh
 trefoil, or buckbean. - IV. 979. e.
nymphoides. Wasser Wiberflee. meniante de
 riviere. fringed waterlilly. - III. 761. c. f. g.
203. **HYDROPHYLLVM** *virginicum.*
 Virginiſches Waſſerblaſ. waterleaf. - 588. a.
205. **LYSIMACHIA** *vulgaris.* Gelber Wei-
 derich. corneille. yellow willow herb
 or loofe ſtrife. - - I. 247. b.
a. foliis alternis. - - - a.
b. foliis ternis. - - - [246. c.
 248. a.
c. quaternis. - - - 249.
ephemerum. - - - 195. a.
ſpicata purpurea. purple looſeſtrife. *ex MUNT.*
 211. - - - III. 688. c.

thy-

Genus.		Tom. Tab. Lit.
thyrsiflora.	-	I. 234. a.
punctata. Schwarzpunctirter W. toothed. L.	-	248. b.
nummularia. (nummularia Pharm. maior lutea.) Pfennigkraut, Egelkraut. nummulaire.		
moneywort. L. m. m. 141. BLACKW.		
542. (Fl. Dan. 493.)	-	III. 758. e. f.

206. ANAGALLIS. Hennendarm. mouron
mâle et femelle. pimpernel. L. m. m. 142.
BLACKW. 43. (Fl. Dan. 88. CURTIS Fl.
Lond. fasc. I.)

aruensis. a, flore phoeniceo. Rother, gemei-		
ner H. common pimp. (BRUCH. diff.		
de anagallide. Argentor. 1768.	I. 106. b.	
b. foliis ternis. Kleeblättrlicher H.	-	c.
c. flore carneo. Fleischfarbener H.	-	e. f.
d. coeruleo flor. Blauer H. mouron femelle.		
femal pimp. BLACKW. 274.	-	107. b.
monelli. Schmalblättriger H. narrow leaved P.		
latifolia. Breitblättriger H. spanish bread		
leaved p.	-	d.

215. CONVOLVULVS. Winde. liferon.
bendweed.

aruensis. Alter W. petit liferon. small bend-		
weed. flore albo et roseo.	-	II. 415. c. b.
varietas variegato folio.	-	416. a. b.
sepium. (conuoluulus maior albus Pharm.)		
- Saunwinde. grand liferon. great B. BLACKW.		
38. (Fl. Dan. 458.)	-	413. a. b.
hederaceus, flore violaceo.	-	415. a.
flore albo.	-	414. a.
purpureus. Purpur W. purple B.	-	c.
varietas, flore coeruleo, albo - purpureo.	-	b.
nil.	-	419. b.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- turpethum. Indische Winde. turbith. *L. m. m.*
 149. *BLACKW.* 397. (*HERM.* Hort. Lugd.
 B. 177. 178.) - - - IV. 999. a.
 ficulus. Sicilische W. - - - II. 418. a.
 batatas. Indischer Erdapfel. batates. Spanisch
 batatas. *MUNT.* 176. *PLUKN.* 166. Ephem.
 Nat. Cur. cent. 269. - - - 421. a. b.
 tricolor. Sicilische, Afrikanische W. flore al-
 bo et cyaneo. - - - [416. c.
 417. b.
 pentaphyllos. Fünffingerblättrige W. - 417. c.
 cantabrica. Kantabrische W. lavande-leaved
 bind weed. - - - [414. d.
 416. e.
 lineatus. - - - 416. d.
 cneorum. Kretische W. rock-rose. - [417. a.
 469. d.
 foldanella. (brassica marina. Pharm.) Meerwin-
 de. foldanelle, choux marin, Seacoole. - 420. a.
 mechoacanna. Mechoacan, mechoacan white
 mechoacan. (*Conuoluulus americanus* me-
 choacan. dictus, *RAII* Hist. Plant. T. I. 723.
Jeticucu PISO. Ind. 252.) *L. m. m.* 147.
BLACKW. 571. *MUNT.* 218. 219. fatiua et
 filuestris, rubro & albo flore. - III. 715. a. b.
 dubius, numulariae folio. *MUNT.* 222. - 738. d.
 216. IPOMOEAE quamoclit. Federwinde,
 Trichterblume. - - - II. 419. a.
 coccinea. Scharlachwinde. scarlet conuolu-
 lus. - - - 418. b.
 217. POLEMONIVM coeruleum. (valeria-
 na coerulea. *BAUH.*) Speerfraut, gries-
 chischer Baldrian. Grec valerian. IV. 1001. g.
 varietas flore albo. - - - f.

- Genus. Tom. Tab. Lit.
243. **CORIS** monspeliensis. Erdfiefer. II. 429. c.
245. **VERBASCUM** thapfus. Weiffkraut.
 bouillon blanc. great mullein, high taper, cows longword. L. m. m. 156.
BLACKW. 3. (Fl. Dan. 631.) IV. 1003. a.
 lychnitis, cum variet. flore albo. *BLACKW.*
 502. — — — — c. b.
 blattaria. Schabkraut. herbe aux mites. moth
 mullein. varietas datur flore albo. I. { 245. c.
 246. a.
 phoeniceum. — — — — 248. d.
 myconi. auricula vrfi borraginoides. *MUNT.*
 107. — — — — 207. a.
246. **DATURA** stramonium. Stenchäpfel.
 stramoine, pomme epineuse ou l'endormie. thornapple. L. m. m. 159.
BLACKW. 313. (Fl. Dan. 436. *STOERCK.*
 de stramon.) — — — — IV. 950. d.
 ferox. Th. with larges spines. — — — — b. (?)
 tatula. violeter St. violet coloured Th.
 (Solanum foetidum. *BAUH.*) — — — — 951. a.
 metel. Weissgrauer Afrifan. St. Th. with a
 globular nodding fruit. — — — — b.
 fastuosa. Th. with smoot leaves. Tolläpfel. — — — — 952. b.
 varietas flore pleno, nigrescente rubro. — — — — a.
247. **HYOSCYAMUS**. Bilsentkraut. Jus-
 quiamme. Hannebanne, henbane.
 niger. Schwarzes B. common. H. L. m. m.
BLACKW. 520. (*STOERCK.* l. c. flores lu-
 ridi pallentes sulphurei.) — — — — III. 588. d. e.
 albus. Weisses B. (maior *BAUH.*) *BLACKW.*
 141. — — — — — — c.
 aureus. Goldfarbnes B. — — — — — — b.
248. NL.

248. **NICOTIANA** tabaccum. Gemeiner Tabak. le Tabac. broadleaved tobacco. (major latifolia *BAUH.*) *LIN.* m. m. 161. *BLACKW.* 146. (*REGNAULT.*) III. 757. a.
- rustica. Kleiner Tabak, Amerikanischer Tabak. herbe à la reine. English tobacco. *BLACKW.* 437. (minor latifol. *BAUH.*) IV. 831. a.
249. **ATROPA** mandragora. (Mandragora Pharm.) Atrun. mandragore. mandrake. *BLACKW.* 364. (fructu rotundo. *BAUH.* *MILLER* 173.) - - III. 708. a. b.
- varietas flore subcoeruleo. Hundspfeife. (Jacobus Arab. cf. *MARITI* Reise. P. II. 16.) - - c.
- belladonna. Tollbeeren, Wolfstirschen, Nachtschatten. belladonne. nightshade, dwale. *L.* m. m. 164. *BLACKW.* 564. (solanum furiosum Pharm. *MILLER* 62.) I. 235. a.
250. **PHYSALIS** alkekengi. (Solanum vesicarium *BAUH.*) Judenfirschen. coqueret. winter cherry. *BLACKW.* 161. *L.* m. m. 164. - - - IV. 931. a.
- varietas foliis variegatis. - - - - - b.
- somnifera. - - - - - c.
251. **SOLANVM.**
- nigrum. (Solan. officinar. *BAUH.*) Nachtschaten. morelle. common nightshade. *L.* m. m. 165. *BLACKW.* 107. (Fl. Dan. 460.) - 937. c.
- dulcamara. (solan. lignosum Pharm. f. scandens *BAUH.* Fl. Dan. 607.) Je länger je lieber. morelle grimpante. bitter sweet. - 932. a. b.
- Varietas a. flore albo. - - - - c.
- b. foliis variegatis. - - - 933. a.
- pseudocapsicum. Korallenbäumchen. - 930. d.
- lyco-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

lycopericum. Liebesapfel. pomme d'amour.

BLACKW. 133. fructu rubro maiore, mino-

re, luteo, rubente. — — 935. b. a. d. e.

varietas luteo fructu. — — c.

melongena. Eierapfel. majenne. *BLACKW.*

549. a. fructu rotundo. — — 933. b.

b. f. oblongo violaceo. — — 934. a.

c. f. oblongo albo. — — b.

tuberosum. Erdapfel. patate. *BLACKW.* 525.

527. — — — 927. a.

indicum. Indischer N. — — 937. b.

fodomaum. — — — a.

dubium. spinacia Americana. *MUNT.* 49. — 946. c.

252. CAPSICVM annuum. Indischer Pfeffer.

poivre d'Inde ou deG uinée. (Piper indi-
cum f. hispanicum Pharm.) *L. m. m.*

167. *BLACKW.* 129. — — [927. b.
928. b. c.]

a. filiquis longis propendentibus. — 927. c. e.

b. recurvis. — — d.

groffum. — — — 928. a. d. f.

varietas : tetragonum. — 929. a. b. c.

baccatum. — — — 930. c.

frutescens. — — — a. b.

253. STRYCHNOS nux vomica. Krähauß

gen. noix vomique. vomick nuts. *L.*

m. m. 168. *BLACKW.* 395. (*BURM.* thes.

Zeyl. 171) — — 926. c.

1370. IGNATIA amara. Strychnos faba S.

Ignatii. *L.* suppl. 149. faba febrifuga.

L. m. m. 169. Ignatzbohnen. feve de

S. Ignace, S. Ignatius bean, *II.* 500. c.

261. *CESTRVM* diurnum. Hammerstrauch.
bastard jasmin. - - III. 650. c.
262. *LYCIVM* afrum. Afrikanischer Dofz-
dornstrauch. Jasminoides. boxthorn. IV. 864. a.
barbarum. - - - — — b.
256. *CORDIA* myxa. *L. m. m.* 171.
BLACKW. 398. Brustbeeren, Sebesten. — 910. a.
264. *SIDEROXYLON* spinosum. III. 687. e.
3. Fl. pentapetali inferi.
265. *RHAMNVS* catharticus. Kreuzbeeren,
Wegdorn. bourg-epine, neprun. pur-
gingthorn. *L. m. m.* 172. *BLACKW.*
135. - - IV. 945. c.
insectorius. graines d'Avignon. Gelbfärbende
Körner von Avignon. - III. 687. d.
frangula. Faulbaum, Pulverholz. bourdaine.
black alder tree. *BLACKW.* 152. I. 40. a.
alaternus. Alaternbaum. alatern. evergreen
privet. - - - — 31. c.
a. foliis variegatis. - - - — — d. e.
b. angustifolia. - - - — — f.
paliurus. Judendorn, Christdorn. - IV. 780. a. b.
juiuba? Lakabaum. jujubier des Indes.
BLACKW. 388. - - — 960. a.
Zizyphus. Rother Brustbeerbaum. *BLACKW.*
569. - - - III. 614. b.
266. *PHYLICA* ericoides. Unächter Alatern-
baum. - - - I. 31. b.
270. *CELASTRVS* pyracanthus. Celasfer.
staff tree. - - (II. 494. c. b.
III. 687. b.
271. *EVONYMVS* europaeus. Spindel,
Spulbaum. fusain. spindel tree. II. 494. d.
272. *DIOS-*

Genus.

Tom. Tab. Lit.

272. DIOSMA rubra. Duftstrauch. African
spiraea. - - I. 31. a.
287. CLAYTONIA portulacaria. IV. 828. c.
274. BRVNIA nodiflora. - II. 448. d.
lanuginosa. - - - — — e.
284. VITIS vinifera. Weinrebe. la vigne.
vine. L. m. m. 179. BLACKW. 153.
(SCHMIDEL icon. pl. VII.) IV. 1017. b.
fructu albo. - - — 1015.
fructu rubro. - - — 1016.
fructu apyreno. a, vuac passae minores f. (co-
rynthiacae. Ph.) Korinthen, Rosinen. rai-
sins de Corinthe. the currant vine, dry cur-
rants. - - — 1014. a.
b, fructu maiore. (passae maiores Pharm.
passulae Damascenae.) Grosse Weinbees-
ren, Zibeben. raisins de Damas. raisins
of the sun. - - — — b.
laciniosa. Petersilienrebe. - — 1017. a.
4. Fl. monopetali, inferi, monospermi.
213. PLUMBAGO europaea. Bleiwurzel.
dentelaire, herbe au cancer, malherbe.
leadwort. - - II. 460. f.
242. MIRABILIS. Wunderblume, Schweis-
zerhosen. Jalape, belle de nuit, mer-
veille de Perou.
ialapa. BLACKW. 404. a. flore rubro. III. 732. a, b, c.
b. flore variegato. - — 733. a.
c. flore flauo. - - — — b.
d. flore albo. - - — — c.
5. Fl. monopetali, superi.
218. CAMPANULA. Glockenblume. cam-
panule. bell flower.

rotun-

Genus.	Tab.	Tom.	Lit.
rotundifolia. petite camp.	-	II.	287. a. b.
rapunculus. Rapünzlein. raiponce. rampion.	-	-	290. a. b.
persicifolia.	-	-	[290. c. d.
	-	-	291. a. b.
pyramidalis flore coeruleo et albo.	-	-	289. b. c.
bononienfis.	-	-	293. a.
rapunculoides.	-	-	[286. c. d.
	-	-	292. c. d.
latifolia.	-	-	[287. c. d.
	-	-	288. c. d.
ceruicaria.	-	-	288. b.
petrea.	-	-	- a.
medium.	-	-	289. a.
trachelium. (vrticæ folio <i>BAUH.</i>) Nasentraut.			
gentelée. Our ladies gloves.	-	-	294. d.
* a. flore albo, simplici et pleno.	-	-	[293. b.
	-	-	294. c.
b. ramus flore cœruleo et albo.	-	-	292. a. b.
c. vaietas morbofa ex aphidibus.	-	-	[292. c.
	-	-	293. c.
glomerata. a. flore albo et coeruleo.	-	-	291. c. d.
b. uniflora fl. coeruleo & albo.	-	-	294. a. b.
speculum veneris. Frauenspiegel. douette.			
Venus looking glass.	-	-	286. a. b.
hirsuta monstrofa <i>WEINM.</i> an campan. thy-			
foides abortiua? vel filago leontopoides?	-	-	291. e.
220. PHYTEVMA spicata. Waldrapungel.			
phyteume. horned rampions.	IV.	862.	e. f.
228. CINCHONA officinalis. Chinchina, Pe-			
ruuvianus cortex Pharm. (Quinquina, de			
la <i>CONDAMINE</i> . v. mem. de l'acad. d.			
sc. de Paris. 1733. et 1738. <i>LURSEN</i>			
disf. de cort. Peru., Lugd. Bat. - Rich.			
<i>PULTENEY</i> disf. de cinchona officin.			
Edinburg. 1764.) <i>BLACKW.</i> 337. Po-			

Genus.

Tom. Tab. Lit.

POMET. 88. *L. m. m.* 151. *Echinarinde.*
quinquina. the cortex. (*JACQUIN*, *ft.*
Americ. hist. p. 35. Tab. 63. *PLUCKN.*
alm. 288. tab. 30. fig. 3. *Crescit in fru-*
ticetis circa Hauanam & in Domingo
ad finum Bayaha, ab Jacquino descri-
pta Cinch. caribaea, floretque Septembri
& Octobri.)

II. 367. a.

230. *COFFEA arabica.* *Rase. coffe.* *L. m. m.*
 152. *BLACKW.* 25. (*ELLIS* *hist. acco-*
unt of Coffee. London, 1774. *LINN.*
amoenit. acad. T. II. p. 160. *Primus,*
qui arborem, semina, eorumque vsum
gratum inter Europaeos euulgauit, me-
dicus fuit Augustanus Leon. RAVWOLF,
cuius trium annorum mora in Oriente
fuerat. V. eius Beschreibung der Raifs,
so er in die Morgenländer selbst voll-
bracht. Lauingen. 1582. 4. - 1 Th. 8. kap.

Coffeam occidentalem delineauit idem clariss.

JACQUIN. l.c. p. 37. Tab. 68. vt & *BROWN*
et PLUM. Tanta est, ait ille, hanc plantam
 inter coffeamque arabicam similitudo, vt
 locare sub eodem genere neutiquam haesi-
 tauerin, si numerum in fructificatione de-
 mas solum.) - - -

— 279. b.

233. *LONICERA caprifolium.* *Geißblat.*
chevre - feuille. honey suckle, wood-
bind. - -

IV. 801. e.

periclymenum. Speklilie. alba in hortis.
semperuirens. Korallenginsten. -
xylosteum. Hefentirschen, Schießbeer.
alpigena. - -

— 802. a.b.c.

— — d.

— 1022. c.

— — a.

C

240. Ge-

240. **GENIPA** americana. - III. 531. b.
6. Flores pentapetali superi.
281. **RIBES** rubrum. Rothe Johannisbeer.
großelieher à fruit rouge. red courants.
(Ribesii rubri Pharm. L. m. m. 176.)
BLACKW. 285. - IV. 865. e. f. g.
a. fructu albo. - - - a. b.
b. fructu incarnato. - - - c. d.
nigrum. Schwarze Johannisbeer. G. à fruit
noir. squinancy berry, blacks courants.
BLACKW. 285. - - - h.
reclinata. Stachelbeer. *BLACKW.* 277. III. 558. d. f.
großblumia. wilde Kreuzelbeer. goosberry
tree. baccis hirsutis. - - - c. e.
vua crispa; baccis glabris, fructu rubro. - - - b.
283. **HEDERA** helix. Ephen. le lierre. ivy.
(hedera arborea Pharm.) L. m. m. 178.
BLACKW. 304. - - - 563. d.
varietas: foliorum, limbo aureo. - - - e.
quinquefolia. - - - 564. a.
285. **LAGOECIA** cuminoides. Federknopf.
L. m. m. 180. - II. 458. d.
7. Fl. incompleti, superi.
292. **THESIVM** linophyllum. Feinblatt.
bastard toadflax. - I. 142. a.
8. Fl. incompleti, inferi.
288. **ACHYRANTHES** aspera. Spreu:
blume. - - - 98.
289. **CELOSIA** argentea. Samtblume,
Tausendschön. amarante, passe-velours.
flower gentle. - - - 96. c.
margaritacea. - - - 84. c.
cocci-

Genus.		Tom. Tab. Lit.
coccinea.	- - -	— 85. e.
castrensis.	- - -	— 86.
cristata. Hahnenkamm.	-	{ — 84. a. b. d. — 85. a. b. c. d. — 96. a. b.
290. ILLECEBRVM verticillatum. Knorr		
pelblume. knotgrafs.	-	III. 570. h.
paronychia. Tassenkraut. herbe aux panaris.		
common whitlow grafs.	-	IV. 824. d.
varietas ex <i>MVNT.</i> 231.	-	— 825. a. b. c.
291. GLAVX maritima. Milchkraut. milk-		
wort. an Micropus supinus?		III. 547. b.
9. Fl. monopetali, inferi; contorti.		
294. CERBERA ahouai. Schellenbaum.		III. 577. a.
295. VINCA minor. Kleines Sinngrün,		
Wintergrün. pervenche. perwinkle.		
(<i>Vinca peruinca.</i> Ph.) <i>L. m. m.</i> 182.		
<i>BLACKW.</i> 59. flore albo et coeruleo.		IV. 1010. d. c.
maior. Großes S. la grande P. foliis varie-		
gatis.	- - -	— — e.
297. NERIVM oleander. Lorbeerrose, Oleand-		
er. laurier - rose, rosebay. <i>BLACKW.</i>		
531.	- -	III. 756. b.
a. flore albo.	- - -	— 754. b.
b. folio variegato.	- -	— 756. b.
c. angustifolium, (odorat vaporem vene-		
natum.) flore carneo, odoratissimo.	-	— 755. c.
et pleno rubescente.	-	— 756. a.
d. latifolium, flore pleno.	-	— 755. b.

Ordo II. DIGYNIA.

a. Fl. monopetali, inferi.

303. PERIPLOCA *graeca*. Virginian filk. I. 154. b.
304. CYNANCHVM *acutum*. Hundswur-
 ger. scammonée de Montpellier. — 155. a.
aphyllum. Euphorbia *viminalis*. — II. 493. b.
305. APOCYNVM *venetum*. Hundsfohl. I. 153. b.
apocin. dogbane. — II. 492. d.
androsaemifolium. — — I. 154. a.
species forte morboſa læſa. — 166. a.
306. ASCLEPIAS *gigantea*. MONT. 105.
 (BROWN. Jam. I. p. 182. PLUKN. alm.
 35. tab. 175. f. 3. ALPIN. Aegypt. 85.
 t. 86. RHEED. Mal. II. p. 53. t. 31.
 RUMPH. Amb. VII. p. 24. tab. 14. f. 1.
 JACQVIN ft. Amer. hiſt. p. 46. T. 88.
 Flores crocei non ſunt, vti falſo Pr. AL-
 PINVS ſcripſit, ſed purpurei, albi. Ele-
 gans hæc planta poſt SLOANII tem-
 pora in Jamaicam deuenit; vbi Februario
 floret. — — — 152. a.
ſyriaca. Seidenpflanze. apocin. BLACKW. 521. — 151.
curaffauica. — — — 152. b.
fruticofa. — — — 153. a.
vincetoxicum. Schwalbenwurzel. domte ve-
 nin. ſwallow wort. L.m.m. 185. BLACKW.
96. (hirundinaria Ph.) — — IV. 1011. a.
307. STAPELIA *variegata*. Krötenblume
 an dem Kap der guten Hofnung. I. 155. b.
varietas luxurians, variegata. — 156.
hirsuta. (MILLER 258.) — — 157.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

322. GENTIANA. Enzian. gentiane.

lutea. Gelber E. Bitterwurzel. la grande gentiane. *L. m. m.* 195. (*MILLER* 139. 2. *Gentiana rubra* Ph.) - - -

III. 534. b.

asclepiades. - - -

— 535. e.

acaulis. - - -

— — a.

verna, coerulea & alba. - - -

— — b. d.

bauarica. (Multum haec species reperitur sub solo etiam Sueuico, cis Licum in prato illo, quod dispartitur a magno aquae ductu: der Ablafs, ex Lico deriuato, prope Augustam Vindel. et a Pharm. nostris non raro rubrae loco colligi solet.) - - -

535. c.

amarella. *L. m. m.* 197. - - -

— 534. d.

varietas flore pleno. - - -

— — e.

ciliata. Himmelsstengel. - - -

— — c.

cruciata. Kreuzwurzel. G. croifette. *BLACKW.*

451. - - -

— — a.

centaurium. Tausendgüldenfraut. la petite centauree. centaure. *L. m. m.* 196. *BLACKW.*

452. (Centaurium minus Ph. *Fl. Dan.*

617.) - - -

II. 348. a.

varietas flore albo. - - -

— — b.

b. Flores incompleti.

808. HERNIARIA glabra. Bruchkraut,

Harnkraut. herniole, turquette. ruptu-rewort. *L. m. m.* 186. *BLACKW.* 324. III. 570. g.

309. CHENOPODIUM. Gänsefuß. pâte d'oye. goosefoot.

bonus Henricus. Guter Heinrich, wilder Spizl. 250. b.

nat. bon Henri. English mercury. — 251. a.

varietas: foliis pictis variegatis — 250. c.

album. Wilde Melde. arroche sauvage, wild

orache. - - -

— 200. a.

C 3

hybri-

Genus.	Tom. Tab. Lit.
hybridum. - - -	— 203. b.
botrys. Traubenkraut, türkischer Beifuß. pigment botris. dok of Jerusalem. <i>L. m. m.</i>	
189. <i>BLACKW.</i> 314. - -	— 255. a.
ambrosioides, Mexikanischer Thee. - -	— 255. b.
vulvaria. arroche foetide, olidaire. stinking orache. <i>L. m. m.</i> 191. <i>BLACKW.</i> 100.	
(atriplex foetida <i>BAVH.</i>) - -	— 203. a.
polyspermum. - - -	— { 201. b. 250. a.
scoparia. Besenkraut. (<i>Linaria scoparia. B.</i>) - -	— 235. b.
maritimum. Küstenmelde. Seablite, or white glasswort. - - -	III. 616. c.
310. BETA vulgaris, rubra. Rothe Rüben, Mangold. poirée, beet. <i>L. m. m.</i> 192.	
<i>BLACKW.</i> 255. - -	I. 241.
pallide virens. Weißer M. poirée blanche.	
white beet. <i>L. m. m.</i> 311. - -	— 242.
311. SALSOLA. Glaskraut, Salzkraut. Soude. Glasswort.	
kali. Südeuropäisches S. - -	III. 616. d.
soda. <i>JACQVIN.</i> 68. - -	— — e.
altissima. - - -	— — f.
fruticosa. Spanisches S. - -	{ — 616. c. IV. 914. d.
314 GOMPHRENA globosa. Kugelamas rant. globe - amarante. <i>RUMPH. REED.</i>	
rubra et alba. - -	I. 97. a. b.
316. VLMVS campestris. Ulmbaum, Rüstbaum. orme. elm. <i>L. m. m.</i> 194.	IV. 1018. b.
c. Fl. pentapetali, superi, dispermi; umbellatae.	
324. ERYNGIVM Mannstreu. panicot. eryngo.	

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- campestre. Gemeine M. chardon Roland. com-
mon eryngo. *L. m. m. 198. BLACKW.*
297. (*Fl. Dan. 554.*) - II. 484. b.
planum. Latifolium forsan? - — 485. c. d.
flore coeruleo. - - — 486. e.
alpinum. Berg M. (*JACQVIN* icon. plantar.
rariorum. Tab. 94.) - - — — b.
maritimum. Seeküsten M. Drachendistel. pa-
nicot de mer. (In Anglia et Belgio pro
campestri in usu est Pharm.) — — a.
foetidum. dipfacus Americ. *MVNT. 185.* — 466. a.
326. SANICVLA europaea. Europ. Saniz
fel. sanicle. *L. m. m. 200. BLACKW. 63.*
(*Diapensia Pharm. Fl. Dan. 283.*) IV. 885. a.
328. BUPLEVRVM rotundifolium. Bruch-
wurzel, Durchwachs. perceseuille. tho-
rowwox. *L. m. m. 201. (Perfoliata*
Pharm.) BLACKW. 95. - — 801. b. c.
falcatum. Hasenohrlein. oreille de lievre. [— 801. d.
I. 273. d.]
330. TORDYLIVM syriacum. Syrisches
Seselfraut. - - IV. 977. b.
latifolium. - - II. 344. a.
maximum, cuius semina fig. posteriori non [345. b.
respondent. - - 384. c.]
anthriscus. Betellaus. - — 344. c.
331. CAVCALIS grandiflora Akerflette. la [344. b.
grande girouille. cornparsley — 458. e.]
leptophylla. - - — 345. a.
daucoides. (platycarpus) - - — 345. c. d.
333. DAVCVS Möhre. Vogelneß. carotte.
birds nest.

Genus.

Tom. Tab. Lit

- carota *a.* filuestris. Wilde Möhre. wild carrot. *BLACKW.* 364. — — — 458. a.
 Varietas datur umbella rubente. Möhre
 renköinig. — — — — b.
b. fatiua. (hortensis) Gelbe Rüben. pan-
 net carotte *L. m. m.* 203. (*RIVIN.*
T. 27.) — — — — c.
 varietas : radice atro rubente. Möhrrübe. — 459. c.
335. *BVNIVM* bulbocastanum. Erdnoten.
 Erdkastanien. terre - noix. earth - nut,
 kipper - nut. — — — I. 273. a.
336. *CONIVM* maculatum. Geflehter Schir-
 ling. grande cigue. hemlock (*Cicuta*
terrestris maior C. BAVH.) *L. m. m.*
 336. *BLACKW.* 451. 573. (*STOERCK*, de
cicuta.) — — — II. 382. b.
337. *SELINVM* palustre. Delfenich. *BLACK.*
 556. — — — 459. b.
338. *ATHAMANTA* libanotis. Hirschwur-
 zel, Möhrkümmel. grand persil de mon-
 tagne. mountain dauke. — — — 458. f.
cernuaria. — — — III. 647. b.
339. *PEVCEDANVM* officinale. Haars-
 strang. peucedane, queue de pourceau.
 sulphurwort. *L. m. m.* 206. (*GAR-*
SAVLT, 452.) — — — IV. 806. d.
 silaum. Wiesensesel. saxifraga de Prés. hogs-
 fennel. — — — — 918. d.
343. *FERVLA* ferulago ? — — — II. 504. a.
 assa foetida. (Assa foetida Ph.) stinkender
 Asant, Zeufelsdreck. (hingisch Persarum)
KAEMPEER amoen. exot. 535. *L. m. m.*

Genus.

Tom.Tab.Lit.

207. *POMET.* (Prope oppida *LARA* &
GAMARO reperitur.) - I. 181. a.b.
 fagapenifera. *POMET.* 285. *L. m. m.* 659.
 Fig. dubia. - II. 504. c.
345. *HERACLEVM* sphondylium. Heil:
 fraut, Bärenfraut. berce. cow parsnep.
BLACKW. 540. - — 943.
 panaces. - - - — 944.
346. *LIGVSTICVM* leuisticum. Liebstock:
 lein. liveche. lovage. (levisticum Ph.)
L. m. m. 211. *BLACKW.* 275. III. 647. a.
 peloponense. cicutaire. - II. 384. b.
347. *ANGELICA* archangelica. Engelmur:
 zel. angelique. angelica. (angelica fa-
 tiua Ph.) *L. m. m.* 212. *BLACKW.* 496.
 (Fl. Dan. 206.) - I. 130.
 filuestris. Wilde E. angelique sauvage. wild
 angelica. *L. m. m.* 213. (*REGNAULT.*) — 131. a.
 lucida. - - - — { 132.
 136.
348. *SIVM.* Wassermurk, Groscheppich. ber-
 le. water parsnep.
 ninsi (Nisji, nindfin & dfin dsom, *KAEM-
 PFER.* amoen. exot. 818.) *BLACKW.* 514.
 (*BVRM.* Fl. Ind. T. 29. fig. 1.) *L. m. m.*
 214. Chinesischer Groscheppich. Auctor. icon
 spur. videtur. - - - III. 758. c.
 latifolium. - - - { I. 133.
 IV. 924. c.
 angustifolium - - - I. 134.
 nodiflorum. - - - — 135.
 fifarum. Zuckermurjel. chervi. skirret. IV. 924. d.
 falcaria. - - - I. 99. a.
 varietas: folio variegato. - — 100. a.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

349. *SISON canadense*. - [I. 100. b.
III. 743. c.
amomum. bastard stone-parsley. I. 101. a.
350. *BVBON macedonicum*. (petroselinum macedonicum Ph.) Steineppig. persil de Macedoine. Macedonian parsley. L. m. m. 216. *BLACKW.* 382. (*REGNAULT.* III. 591. b.
351. *CVMINVM cyminum*. (cuminum Ph.) Rümisch. cumin. (*RIVIN.* pentap. tab. 40.) II. 447. b.
352. *OENANTHE fistulosa*. Rabendolde. dropwort. - - - 509. c.
353. *PELLANDRIVM aquaticum*. Pferdsame, Wasserfenchel. *BLACKW.* 570. (*RIVIN.* tab. 65. *ERNSTING.* phellandrologia. J. H. *LANGE.* vom Wasserfenchel. 1773. 8.) - - 383. a.
354. *CICUTA virosa*. (cicuta aquatica Ph.) Wüterich. cique. water-hemlock. L. m. m. 219. *BLACKW.* 574. (*Fl. Dan.* 208. *GVNN.* Fl. Norueg. I. 2.) - - [382. a.
383. b. c.
354. *AETHVSA cynapium*. Wilde Petersilie. petite cigue. lesser hemlock. *BLACKW.* 517. - - - 384. a.
meum. (meum athamanticum Ph.) Beerwurzel. meum. spicknel. L. m. m. 220. *BLACKW.* 525. (*RIVIN.* 63.) III. 729. a.
355. *CORIANDRVM sativum*. Rorian; cor. coriandre. coriander. L. m. m. 221. *BLACKW.* 178. (*REGNAULT.*) II. 429. a.
357. *SCANDIX cerefolium*. (chaerophyllum Ph.) Rörseftraut. cerfeuil. chervil. L. m. m. 222. *BLACKW.* 236. (*REGNAULT.*) - 353. b. c.
odcrata.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

odorata. Italien. Körbelfraut. cerfeuil musqué. sweet chervil. — 353. a.

pecten. Nadelkraut, Venuskamm. peigne de Venus, aiguille. sheperd's - needle, Venus comb. — — — IV. 890. b.

anthriscus. — — — II. 345. a.

358. CHAEROPHYLLVM silvestre. (cicutaria Ph.) Wildes Körbelfraut. cerfeuil sauvage. wild chervil, cow - weed. L. m. m. 223. (RIVIN. 44.) — 353. c.

bulbosum. — — — I. 273. b.

temulum? — — — III. 743. b.

359. IMPERATORIA ostruthium. Meisterswurz. imperatoire. master-wort. L. m. m. 224. BLACKW. 279. (RIVIN. 7.) — 604.

361. THAPSIA villosa. malherbe. BLACK. 459. MUNT. 243. — — — IV. 972. b.
foetida. — — — — — a.

362. PASTINACA sativa. a. latifolia. Pastinackwurz. pastenac. parsneps. L. m. m. 225. BLACKW. 379. (RIVIN. 6.) — 800. a.
b. silvestris. — — — 799. d.

opopanax. (gummi opopanax Ph.) Opopanax. L. m. m. 226. (panax heracleum MORIS. hist. plant. T. III. p. 315. tab. 17. BOCCONE. journ. d. savans. 1676. p. 28.) — 786. a.

363. SMYRNIVM perfoliatum. Smyrnenkraut. — — — IV. 926. a.
olusatrum. Engelswurz. maceron. Alesander. — BLACKW. 405. — — — b.

364. ANETHVM graecolens. Dill. anet. dill. L. m. m. 227. BLACKW. 545. (RE-GNAULT. FORSKAL. Fl. Aegypt. Arab. 23.) I. 129. a.

varie-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

varietas: Fernambuccum. — — — b.

foeniculum. *a.* dulce Italicum. *b.* vulgare

Germanicum. Süßer und gemeiner Fenchel.

fenuil commun. sweet fennel. *L. m. m.*

228. *BLACKW.* 288. (*REGNAULT.*) II. 513. *a. b.*

364. *CARVM* carui. Feld, Brodsummel.

carvi. carway. *L. m. m.* 229. *BLACKW.*

472. (*REGNAULT.*) — — — 321. *a. b.*

368. *PIMPINELLA* faxifraga. (*alba Ph.*)

Bibernell. boucage. bournel. *a.* maior. [IV. 812. c-g.
II. 459. a.]

b. minor. *L. m. m.* 230. Weißer B. *BLACKW.* IV. [812. a.d.
529. (*RIVIN.* 83.) — — — 811. e.]

magna. (*alba & nigra Ph.* cf. *MURRAY.* *m. m.*

Vol. I. p. 296.) — — — 811. c.d.

anifum. Unis. anis. anise. *L. m. m.* 231.

(anifum vulgare *Ph.*) — — — I. 138. *a.*

367. *APIVM* petroselinum. Petersile. per-

fil commun. parsley. (petroselinum

Ph.) *L. m. m.* 232. *BLACKW.* 172. IV. 806. *a. b.*

varietas: latifolium. — — — I. 150. *a.*

graeuolens. Seleri. (hortense dulce.) l'ache.

feleri. *L. m. m.* 233. *BLACKW.* 443.

368. *AEGOPODIVM* podagraria Baum-

tropfen. Strenzel. la podagrarie. herb

Gerard, goutweed. — — — 131. *b.*

Ordo III. TETRAGYNIA.

1. Flores superi.

370. *VIBVRNVM* iantana. Mehl, oder

Schlingbaum. viorne. mealytree. IV. 1008. *a.*

opulus. Wasserholder, rothe Schießbeer. l'obier.

water elder. — — — 882. *b.*

varie-

Genus.

Tom.Tab.Lit.

varietas: flore globoso pleno, roseo. Gelb-

rische Rose, Schneeball. — — a.

tinus. Wilder Lorbeer. laurier-tin. wild bay. III. 635. d.

372. SAMBVCCVS nigra. Glider, Holz-

lunder. sureau. common elder. L. m. m.

• 258. BLACKW. 151. — IV. [881. b.
[882. e.

varietas: a. folio variegato. — — 882. c.

b. fructu albo. — — 881. a.

c. laciniata. — — 882. d.

racemosa. (cf. JACQVIN. icon. plant. rar. 81.) — 881. c.

ebulus. Altich. hieble. dwarf elder. L. m. m.

237. BLACKW. 488. — II. 473. a.

1379 SEMECARPVS anacardium. L. suppl.

182. An Auicennia tomentosa aut Bon-
tia germinans? Fig. dubia ex POMET.

200. et LEMERT 22. c. cf. oepata

Hort. Malab. IV. 45. — I. 104.

2. Fl. superi.

371. CASSINE maurocenia. PLVCKN. 158.

2. a. fruct. rubro. — II. 350. a.

b. fructu coeruleo. Cerasus African. BVRM.

PLVCKN. 157. 5. — — b.

c. cerasus Afric. racemosa rubra absque pe-
diculo, fol. longiore, latiore. BVRM.

PLVCKN. 157. 3. — — c.

d. fructu rubro multiplici, folio longiori.

BVRM. PLVCKN. 158. 3. — — d.

e. fructu coeruleo, fol. longiore et angustio-

re. BVRM. — — e.

369. RHVS coriaria. Sumach, Gerberbaum.

sumac. common sumach. L. m. m. 234.

BLACKW. 541. 486. — IV. 955. b.

toxi-

- Genus. Tom. Tab. Lit.
- toxicodendrum. Virginischer E. *MVNT.* 60. — 1013. c.
- lucidum. Glänzender E. icon dubia ex
POMET. 299. *PLVKN.* 166. 2. — 955. a.
- copallium. L. m. m. 135? — II. 424. c.
- cotinus. Verufenbaum, Gelbholz. kустet. Ve-
 nice or red sumach. — 432. b.
374. STAPHYLEA pinnata. Pimpernuss;
 baum. nez - coupez, faux pistachier. blad-
 der nut-tree. — IV. 816. b.
375. TAMARIX gallica. Tamarisfen. tama-
 ris de Narbonne. L. m. m. 239. *BLACKW.*
 331. (*MILLER* 262. 1.) — 965. b.
- germanica. teutscher E. *BLACKW.* 331. (*MIL-
 LER.* 262. 2. *Fl. Dan.* 234.) — — a.
378. CORRIGIOLA littoralis. — 825. d. e.
380. ALSINE media. Hünerdarm, Vogels
 fraut. morgeline. common chickweed.
BLACKW. 164. — I. 106. a.
382. BASELLA rubra. Weerblume. (*RUMPH.*
 Amb. 5. 154.) — IV. 936. b.

Ord. IV. TETRAGYNIA.

384. PARNASSIA palustris. Leberblume,
 Einblat. parnassie. grafs of parnaslus. II. 392. d.

Ord. V. PENTAGYNIA.

386. ARALIA racemosa. Weerangelika. ber-
 ry-bearing angelica. — I. 137. a.
388. STATICE armeria. Meergras. gazon
 d'Espagne ou d'Olympe, statice. thrift
 sea gilli flower. — III. 552. g.

Genus. Tom. Tab. Lit.

limonium. Kother Behen. behen rouge. sea

lavander. *L. m. m.* 241. (*Fl. Dan.* 315.*GMELIN.* *Fl. Sibir.* II. tab. 92.) — 663 a.e.f.

tatarica. - - - - - — — c.

flexuosa. - - - - - — — g.

speciosa. - - - - - — — b.

sinuosa. - - - - - — — d.

389. LINVM vitatissimum. Flachg. le lin. flax.

L. m. m. 242. *BLACKW.* 160. (*REG-NAVL.*) - - - III. 669. a.

perenne. Jorddaurender Fl. - - - — — b.

narbonense. - - - - - — — c.

austriacum? - - - - - — — d.

maritimum. - - - - - II. 348. c.

301 DROSEBA rotundifolia. (Rorella f.

ros folis Ph.) Sonnenthau. rosée du

soleil. fundew. *L. m. m.* 244. *BLACKW.*

432. - - - - - IV. 872. c.

longifolia. - - - - - — — d.

392. CRASSVLA coccinea. Diefblat. leffier

orpin. - - - - - II. 435. a.

perfoliata. (*COMELIN.* t. 23.) — — b.

nudicaulis. - - - - - I. 61. II. 435. c.

Ord. VI. POLYGYNIA.

394. MYOSVRVS minimus Mausechwanz.

moufe tail. - - - — 346. a.

CLAS.

CL A S S I S VI.

HE X A N D R I A.

Ordo I. MONOGYNIA.

a, Eiores calice et corolla instructi.

Genus.

Tab. Tom. Lit.

395. BROMELIA ananas. Ananas. BLACKW.

576.

a. carne albida, fructu ouato. LOCHNER. I. [112.
ananas. T. I. IV. - - - 114.

b. carne rubra. LOCHN. I. 14. - - - 113.

c. fructu pyramidato, carne aurea. BLACKW. [115.
568. LOCHN. III. 32. - - - 116.

karatas? ananas folio sinuato. LOCHN. II. 15.

ex horto Munchausiano. JACQVIN. hort.

Vindob. III. t. 36. (ei. select. stirp. Ame-

ric. histor. T. 260. 24.) - - - 478. a. b.

423. LEONTICE leontopetalum. Löwen-
blatt. lion's leaf. MVNT. 229. III. 639.

476 BERBERIS vulgaris. Saurach. Erbs-
sch. epine vinette. pipperidgebush,
berberybush. J. m. m. 259. BLACKW. 476. I. 240. c.
cretica. - - - III. 687. c.

472. PRINOS verticillata. Winterbeere.
MVNT. 51. - - - I. 32.

b. Fl. spathacei.

400. HAEMANTHVS coccineus, Blut-
blume. blood flower. - - - III. 562.

401. GALANTHVS nivalis. Schneetro-
pfen. perce-neige. snowdrop. - 642. b.
flore pleno. - - - - - c.

402. LEV-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

402. LEVCOIVM vernum. Merzenglöck

lein, Hornungsblume.

	-	-	-	[641. d.
				[642. a.
aestivum.	-	-	-	641. e.
auctumnale.	-	-	-	- f.

403. NARCISSVS Narcisse. narcisse. daf-
fodile.

poeticus.	-	-	-	III. [748. g.
				[749. a.
flore pleno.	-	-	-	746. d. f.
pseudonarcissus. (filuestris BAVH.)				- c.
a, nectario luxuriante.	-	-	-	750. d. e.
b, flore pleno.	-	-	-	746. b. e.
g, orientalis, nectario aureo, fl. pleno.				750. f.
bicolor.	-	-	-	748. c.
calathinus.	-	-	-	749. b.
orientalis.	-	-	-	748. b.
tazetta. tazette. a, floribus albis.	-	-	-	749. e.
b, fl. medio-luteis.	-	-	-	- d.
c, fl. luteis.	-	-	-	- c.
moschatus.	-	-	-	750. a. b. c.
ionquilla. jonquille. (N. iunci folius BAVH.)				848. a. f.
flore pallidiore.	-	-	-	- d.
flore pleno.	-	-	-	- e.

406. AMARYLLIS lutea. Amarille.

atamasca.	-	-	-	III. 652. c.
				- b.
formosissima. (Mexicanische A.)				- a.
belladonna.	-	-	-	653. a.
orientalis. Brunsvigia. HEISTER.				747. -

407. BVLBOCODIVM vernum. Uchtbluz

me. - - - II. 404. d.

409. ALLIVM porrum.lauch. porreau.

leek, L. m. m. 246. BLACKW. 421. IV. 828. a.

D

rotun-

Genus.	Tab.	Tom.	Lit.
rotundum.	—	—	b.
oleraceum. Knoblauch. ail. garlick. <i>L. m. m.</i> 248.			
victoralis. Siegmurzel. spotted ramsons.			
<i>L. m. m.</i> 247.	—	—	38. a.
carinatum.	—	—	39. d.
flauum.	—	—	c.
moly. (<i>Moly latifolium luteum BAVH.</i>)	III.	734.	b.
lineare.	—	—	c.
vineale.	I.	[38. c. 39. b.]	
ursinum. Waldlauch. ail des bois. ramsons.	—	38.	b.
ascalonicum. Eschlauch. escalote.	II.	349.	b.
cepa. Zwibel, Bößler. oignon, ciboulle. oignons. <i>L. m. m.</i> 249. rad. alba et purpurea.	—	—	a.
fistulosum. Johannislauch. <i>Cepa oblonga.</i>			
<i>BAVH.</i>	—	—	c.
schoenoprasum. Schnitlauch porrette. chives.	—	—	d.
c. Fl. nudi.			

410. LILIVM Lilie. lis. lily.

album f. candidum. (flor. erecto <i>BAVH.</i>)			
Weisse Lilie. <i>L. m. m.</i> 250. <i>BLACKW.</i> II.	III.	651.	c.
varietas, a, cum striis purpureis	—	654.	a.
b, flore pleno.	—	—	b. c.
bulbiferum. Feuerlilie. lis orangé. red lily.			
(Purpur. croceum maius <i>BAVH.</i>)	—	655.	b. c.
varietas, flore pleno.	—	656.	a. b.
martagon. Goldlilie, türkischer Bunt. lis sauvage. Turk's cap. Lil. flore reflexo mon-	III.	[657. c. 658. a. b.]	
tanum, <i>BAVH.</i>	—	—	
varietas, flore albo.	—	657.	a. b.
pomponium.	—	[659. b. 660. c.]	
chalcedonicum.	—	[659. c. 660. a. b.]	
			super-

Genus.

Tom. Tab. Lit

superbum ; imperiale moschatum, flore albo.

WEINM. - - - - 659. a.

411. FRITILLARIA meleagris. Fritillarie.

fritillaire. - - - II. 515. c.

a, flore flauo viridi. - - - 516. a.

b, flore flauo, simplici, variegato. - { - b.
517. b.

c, fl. purpureo ramoso. - - - 517. c.

d, fl. atro purpureo. - - - - d.

e, fl. albo variegato. - - - 515. b.

f, fl. luteo, variegato, pleno. - 517. c.

g, minima. - - - - d.

h, atropurpurea ferotina. - - - - a.

imperialis. Kaiserkrone. (Ex Oriente 1570.

in Europam allata fuit.) - III. { 661. a. b.
662. c.

a, prolifera. - - - - b.

b, flore albo. - - - 661. c.

c, flore flauo. - - - 662. a.

412. VUULARIA perfoliata. Zapfenkraut. IV. 921. c.

414. ERYTHRONIVM dens canis. Hundsz.

zahh. dent de chien. dog's tooth. II. 460. a.

varietas: flore albo. - - - - b.

415. TVLIPA filuestris. Wilde Tulpe. tuli-

pan. tulip. (Stirps Turcica, quae ad

Europaeos Sec. XVI, deuenit.) IV. 996. b.

varietas: lutea. - - - 992. a.

praecox purpurea, oris candidis. - 994. b.

Gesneriana lutea. - - - 989. a.

varietates, 1, alba, lituris purpureis. - { 992. b.
987. b.
986. c.
990. c.
996. a.

Genus.

Tab. Tom. Lit.

eadem, floribus plenis et semiplenis.

{ 984. a. b. c.
 — { 985. a. c.
 { 986. a. b.

2. ex flauo & rubro mixta. -

{ 987. c.
 — { 988. b. c.
 { 989. b.
 { 990. a. b.

3. flore purpureo et violaceo. -

{ 986. d.
 — { 991. b.

pleno purpureo. - - -

{ 984. d.
 — { 985. b.

4. flore viridi, margine purpureo.

— 987. a.

maculata stris purpureis. -

— 991. c.

5. versicolor. - - -

— 988. a.

6. prolifera lutea punctata. le monstre

{ 995. a. b. c.

jaune double. - - -

{ 993. b.

7. petalis laciniatis. le monstre jaune et rouge. - - -

{ 982. b.
 — { 983. a. b.

8. foliis in petala degenerantibus. la crasse
 stilleuse. *TOURNEFORT*.

{ 991. a.
 — { 992. c.
 { 993. a.
 { 997. a.

418. ORNITHOGALVM. Vogelmilch. ornithogale, star of Bethlehem.

luteum. - - - - - III. 773. d.

arabicum. - - - - - — 734. a.

latifolium. - - - - - — 773. e.

umbellatum. (medium angustifol. *BAVH.*) — — b.

nutans. - - - - - — — c.

narbonense. - - - - - I. 185. a.

419. SCILLA maritima. L. m. m. 251.

BLACKW. 591. Meerzwibel. scille rouge.

sea-onion. - - - - - IV. 390. d.

Stirnblümlein. fl. coeruleo incar-

nato. - - - - - III. 587. b. c.

Genus.				Tom. Tab. Lit.
<i>amœna.</i>	-	-	-	— — e.
<i>Italica.</i>	-	-	-	— — d.
<i>orchioides</i> <i>BVRM.</i> fl. incarnatis.				— 586. d.
421. ASPHODELVS luteus. <i>Asfodil.</i> as- fodele jaune. kings spear. <i>BLACKW.</i>				
233. <i>JACQVIN.</i>	-	-	-	I. 185. b.
<i>ramosus.</i>	-	-	-	— 184. a.
<i>fistulosus.</i> (foliis fistulosis <i>BAVH.</i>)				— — b.
422. ANTHERICVM. Bastardasfodil. pha- lange.				
<i>ramosum.</i> Erbspinnenfraut.	-	-	-	IV. 807. a.
<i>liliago.</i> (phalang. <i>ramosum</i> <i>BAVH.</i>)				— — b.
<i>asphodeloides.</i>	-	-	-	I. 184. c.
<i>frutescens.</i>	-	-	-	— 45. b.
457. ASPARAGVS officinalis. Spargel.				
asperge. sperage. <i>L. m. m.</i> 253. <i>BLACKW.</i>				
332.	-	-	-	— 182. a. b. c.
<i>hortensis.</i>	-	-	-	— 183. a.
<i>albus.</i>	-	-	-	— 181. d.
<i>pennatus.</i> <i>BVRM.</i> frutex capensis baccifer.				
<i>PLVK.</i> 184. I.	-	-	-	— 183. b.
1256. DRACAENA draco. <i>BLACKW.</i> 358.				
<i>BEHRENS</i> diff. Goettingae, 1770. (cf.				
<i>MEDIKVS</i> Theodora speciosa. pag. 81.) IV. 785. a.				
425. CONVALLARIA maialis. Maiblüm- chen. le muguet. may-lily, lily of the valley. <i>L. m. m.</i> 254. <i>BLACKW.</i> 70.				
(<i>Lilium conuallium album</i> <i>BAVH.</i>)				III. 653. b. c.
<i>bifolia.</i> Einblat. (<i>L. conuall. minus</i> B.)				— — d.
<i>polygonatum.</i> Weisswurz. genouillet, sceau de Salomon. Salomons seal. <i>L. m. m.</i> 255.				
<i>BLACKW.</i> 251.	-	-	-	IV. 920. a.
varietas, flore pleno.	-	-	-	— — c.

Genus.	Tom. Tab. Lit.
multiflora. (polygonatum latifol. <i>BAVH.</i> Fl.	
<i>DAN.</i> 152. — — — — b.	
verticillata. (polygon. angustifol. B. Fl.	
<i>DAN.</i> 86.) — — — — 921. a.	
stellata, — — — — — b.	
426. POLIANTHES tuberosa. <i>Tuberosa.</i> III. 584. a.	
varietas, flore pleno. — — — — b.	
427. HYACINTHVS non scriptus. <i>Sya:</i>	
cinthe. Jacinte. hyacinthe. <i>BLACKW.</i> 61. — 585. e.	
varietas: flore albo. — — — — e.	
orientalis, flore simplici. — — — — { — f.	
	{ 586. a.
varietas: a, flore pleno coeruleo. — — — — { 584. c.	
	{ 585. c.
	{ 586. b.
b, fl. violaceo pleno. — — — — 586. c.	
c, fl. albo pleno. — — — — { 584. d.	
	{ 585. a.
d, fl. rubro pleno. — — — — 585. b.	
e, variorum colorum. — — — — 587. a.	
muscari. — — — — — 583. f.	
monstrosus. — — — — — a.	
comosus. — — — — — b.	
botryoides. Traubenhyacinth. printaniere. — — — — c.d.e.	
1382. PHORMION hyacinthoides hyacin-	
thus orchiioides serpentar. <i>BVRM.</i>	
<i>PLUCKN.</i> 195. 5. — — — — 582. e.	
africanum, flore croceo. hyacinthus orchioi-	
des diphyllon flore croceo. <i>BVRM. PLUCKN.</i>	
195. 6. — — — — — d.	
* (ACYNTHA Guinenfis. aletris hyacin-	
thoides <i>LIN.</i> Aloe Guinenfis, <i>JAC-</i>	
<i>QVIN.</i> enum. stirp. Vindob. p. 308.	
Aletris Guinenfis, <i>JACQVIN.</i> Hort,	

Vindob.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

Vindob. Vol. I. 36. tab. 84. Fr. Caf.

MEDIKVS, Theodora speciosa. Manheim. 1786. 8. pag. 65.)

I. 75. a.

428. ALETRIS Zeylanica.

- — 74.

vuaria.

-

-

-

— 45. a.

Mexicana. Aloe ferrata maior vmbellifera

MVNT. tab. 192. aloidar. p. 13. Aloe Ame-ricana flore luteo *MORISON.* H. Oxf. II.p. 415. Tab. 22. Manguei. Ant. *REECH.* — 62.

429. YVCCA gloriosa. (indica, foliis aloes.

BAREL. pl. rar. T. 1194. v. *MEDIKVS.*

l. c.)

-

-

IV. 1024 a;

filamentosa. (Yucca foliis lanceolatis acumi-

minatis integerrimis, margine filamento-

fis. *TREW.* pl. select. Ehr. T. 37.) — 1022. d;draconis. *COMMELIN.* prael. t. 16. (fol. fer-rato *DILLEN.* H. Elth. T. 324.

I.

{ 64.

{ 52.

{ 53.

430. ALOE. Aloe. l'aloë. aloes.

(Cum de dispositione huius generis ma-

gna adhuc lis est inter botanicos, quos-

dam auctores commendatos habere ve-

limus conferendosque, inprimis F. C.

MEDIKVM, auctorem Theodoraе spe-

ciosae, cuius fragmentum de genere

aloes de meliore nota commendamus.

sect. II. p. 65. *THVNBERG*, diss. de aloëVpsal. 1785. 4. *MVRRAT*, opuscula.

Vol. II. Goettingae 1786. 8.)

perfoliata. (quam elongatam denominare iu-

bet *MVRRAT.*) *Sofoterische Aloe.* l'aloësoccotrin. L. m. m. 256. *BLACKW.* 229. I. { 43.333. Aloe vera, vulgaris *BAVH.*

{ 44.

- α , caulescens, foliis magis glaucis caulem
 amplexantibus, in mucronem obtusorem
 abeuntibus. *COMMELIN.* praelud. botan.
 T. 17. r. 44. — 46.
- γ , foliis glaucis latioribus vndique spinosis.
COMMELIN. T. 19. (Aloe mitriformis.
MEDIKVS.) — 49.
- δ , foliorum summitate vtrimque spinosa.
COMMELIN. T. 22. r. 45. — 48.
- ϵ , dorso integro spinoso. *COMMELIN.* T. 20. — 50.
- ζ , foliis glaucis brevioribus vtrimque spi-
 nosis. *COMMELIN.* T. 21. (Haec est: *CA-*
TEVALA arborescens, *MEDIK.* f. aloe ar-
 borescens. *MILLER.* nr. 3.) — 47.
- η , margine & dorso superiore spinoso, flore
 rubro. *COMMEL.* T. 24. — 71.
- λ , maculata, spinosa maior. *MVNT.* 79. (Aloe
 maculata. *MED.*) — 51.
- μ , macul. minor. *DILLEN.* Hort. Elth. 16. — 70.
- σ , humilis. *COMMEL.* T. 26. r. 46. (*CATE-*
VALA humilis. *MED.*) — 73. a.
- variegata. Papagai Aloe. — [68.
 69.
- disticha. Linguiformis, verucis albicantibus ab
 utraque parte. *COMMEL.* T. 9. (Aloe lingu-
 formis. *MED.*) — 57.
- β , var. carinata sessilis. *MILLER.* T. 19. fo-
 liis triquetris. (Aloe tristicha. *MED.*) — 58.
 car. sess. foliis verrucosis. *DILLEN.* H.
 Elth. f. 20. (Aloe verrucula. *MED.*) — 59.
- ν , caule & flore corallii colore. (Aloe verru-
 cosa. *MED.*) — 56.
- δ , folio

Genus.

Tom.Tab.Lit.

- δ, folio longissimo plicatili, flore rubro.
COMMEL. T. 3. (KUMARA disticha MED.) — 60.
 spiralis. folio paruo in acumen acutissimum
 abeunte. *DILLEN. f. 14. COMMEL. 32. (Me-*
dikus.) — — — — 72. b.
 retusa. folio breuissimo, crassissimo. *COM-*
MEL. TILL. hort. Pis. tab. 5. (CATEVALA
retusa MED.) — — — — 73. c.
 viscosa; triangularis, folio triangulari, vis-
 coso. *COMMEL. 31. (Aloe triangularis. MED.)* — 72. c.
 pumila. β, margaritifera minor. *DILLEN.*
f. 17. (Aloe margaritifera. MED.) — 54. a.
 γ, minima. *COMMEL. 43. (CATEVALA*
atrouiridis. MEDIK. Aloe afra minima,
atrouiridis, spinis herbaceis numerosis or-
nata. BOERH. ind. Pl. alt. P. II. p. 131. t. 131.) — — b.
 δ, arachnoidea. *COMMEL. 27. (CATEVALA*
arachnoidea. MED. Aloe Africana humi-
lis arachnoidea, COMMELINI.) — 73. d.
 431. AGAVE Americana. Amerikanische
 Aloe. aloe de l'Amerique. (agave scapo
 arboreo ramofo. *HALLER. stirp. Helu.*
T. II. 121. nr. 1249.) — — — — 42. a.
 variet. folio variegato. — — — — b.
 viui para. *COMMELIN. 15.* — — — — 63.
 virginica, ferox. *MUNT. 95?* — — — — 65.
 foetida? — — — — 66.
 433. HEMEROCALIS flava. Lilienasphod.

dil. — — — — I. 186.

varietas, minor. — — — — III. 651. a.

fulva (Lilium asphodel. *BAVH.*) — 651. b.

liliastrum. Tagblume. Lis de S. Brun. — 655. a.

d, Fl. incompleti.

435. ACORVS calamus; *a.* vulgaris. *Rals*
mus. jonc odorat. the sweet. rush.
L. m. m. 257. *BLACKW.* 466. I. 25. *b.*
b. verus Pharm. aromaticus. *Gemeiner Rals*
mus. Fig. auctoris est vitiosa ex *POMET.*
f. 93. cf. Hort. *Malab.* XI. 60. *RVMPH.* herb.
Amb. 72. *i.* - - II. 281. *d.*
437. IVNCVS effusus. *Bins.* jonc. III. 614. *e.*
filiformis. - - - - -
articulatus *a.* aquaticus. - - - 555. *b.*
b. filuaticus cum vtriculo. - - - *c.*
c. foliis nodosis. - - - *d.*
bufonius. - - - 556. *d.*
pilosus *a.* latifolius. - - - *k.*
b. angustifolius. - - - *h.*
niveus. - - - *i.*
446. PEPLIS portula. *Wasserportulak.* wa-
terpurflain. - - - 547. *a.*

Ord. II. DIGYNIA.

448. ORYZA sativa. *Rals.* ris. rice. *L. m. m.*
260. - - - III. 775. *f.*

Ord. III. TRIGYNIA.

457. COLCHICVM autumnale. *Wiesens*
Zeitlose. tüechien, colchique. meadow
saffron. *L. m. m.* 267. *BLACKW.* 566. II. 403. *a.*
varietas : *a.* flore albo & albo rubro. - - - *b. c.*
b. flore pleno rubro. - - - 404. *b. c.*
c. flore pleno albo. - - - *a.*
montanum. *Berg Z.* - - - *e.*
variegatum. - - - 403. *d.*
451. *RV-*

Genus.

Tom. Tab. Lit.

451. **RVMEX** patientia. Ampfer, unächte
Mönchscharbarber. patience. dock. lapa-
thum satium. *MVNT.* 199. *BLACKW.*
489. - - - - III. 624. b.
crispus. - - - - — 625. a.
maritimus. anthoxanthum J. *BAVH.* — — c.
obtusifolius. bulapathum. *PLIN. MVNT.* 204. — 623. d.
sanguineus. Rothe Grindwurz. patience
rouge. bloodwort. *L. m. m.* 261. *BLACKW.*
492. - - - - — 626. b.
aquaticus. herba britannica. Mangelwurz.
great water dock. *L. m. m.* 362. *BLACKW.*
490. - - - - — — a.
roseus, seu dubius? oxylapathum tubero-
sum Americanum. *MVNT.* 195. - — 624. a.
aculeatus. - - - - — 623. c.
acutus. - - - - — — e.
britannica. - - - - — 625. b.
bucephalophorus. acetosa ocymifolia. I. 20. a. b. c.
lunaria. - - - - — 19. c. d.
vesicarius. - - - - — — b.
scutatus. Spanische Saurampfer. oseille ron-
de ou franche. French sorrel. *L. m. m.* 264.
BLACKW. 306. - - - - — — a.
acetosa. Saurampfer. oseille, vinette. com-
mon sorrel. *L. m. m.* 266. *BLACKW.* 230. — 18. a.
varietas: montana maxima. - — — b.
acetosella. *BLACKW.* 307. - — 20. d.
varietas: folio integro. - — — e.

Ord. V. POLYGYNIA.

460. ALISMA plantago. Wasserwegerich.
 water plantain. - - - IV. 855. a. b.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

461. TRIENTALIS. europaea. Schirm:
 fraut. chickweed. - IV. 841. b.
 462. AESCVLVS hippocastanum. Ross:
 kastanie. marronier d'Inde, horse-chefnut. II. 342.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

466. TROPAEOLVM maius. Indiani:
 scher Kress, Kapuzinerlein. capucin. In-
 dian cress. (nasturtium indicum.) L. m. m.
 269. - - - III. 753. a. b.
 variet. flore pleno. - - - - c.
 minus. Kleines Peruanisches K. - - - d.

469. Oe-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

469. **OENOTHERA** biennis. Nachtfurge,
Esefskraut. herbe aux asnes. gros we-
derick. - - - — 688. b.
471. **EPILOBIVM** hirsutum, grandiflo-
rum. Uuholdenfraut. herbe de S. Antoi-
ne. rose-hay. - - - — 690. a.
angustifolium. - - - — 688. a.
palustre. - - - — 689. b.
montanum. - - - — — a.
tetragonum. - - - — [— c.
[690. c.
variet. flore albo. - - - — — b.
473. **AMYRIS** opobalsamum. beaume de
Meque. balsamum de Mecca. L. m. m.
512. *SCHREBER*. suppl. 7. Prosp. *AL-*
PIN. *POMET*. *LINNE* diss. de opobalsa-
mo. Vpsal. 1764. - - - I. 223.
elemifera. Elemi resina Ph. fig. aliena ex
POMET. f. 290. elaeagnum referens. L. m. m.
270. (Resinam elemi ex frutice amyr.
siluaticae colligi, falso putabatur, teste
JACQVINO, stirp. Amer. hist. pag. 55.) II. 476. c.
479. **IAMBOLIFERA** pedunculata. Jam:
belonen. fructu luteo. - - - III. 601. c.
fructu sanguineo. - - - — — b.
1258. **CHLORA** perfoliata. Blakstonia;
HVDSON. Fl. Angl. 146. Wiberfraut. Gelb
tausendgüldenfraut. - - - II. 348. d.
483. **VACCINIVM** myrtillus. Heidelbeeren.
myrtylle. bill. - berry, whortle- berry.
(myrtilli Ph.) L. m. m. 273. *BLACKW.*
563. (*CRAMER*. Forstn. T. 49. 1. 2

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- De varietate cum baccis. albis, v. *GME-*
LIN. Fl. Sibir. Tom. III. p. 137.) III. 744. a.
 vliginosum. (Fl. *DAN.* 231.) - IV. 1000. c.
 vitis idaea. (vitis idaea Ph.) Krohnß, Broms
 beeren. *L. m. m.* 274. (Fl. *DAN.* 40. baccis
 rubris.) - - - - b.
 oxycoccos. (oxycoccos Ph. Fl. *DAN.* 80.)
 Moosbeeren. canneberge. moor's berry.
BLACKW. 593. - - - a.
484. *ERICA* vulgaris. Heide. bruyere. heath
 or ling. flore pallido; rubro; albo. II. 481. a. b. c.
 tetralix. (bis per annum floret. Fl. *DAN.* 81.) - - d. e.
485. *DAPHNE* mezereum Seidelbast. me-
 zereon, ou bois gentil. spurge olive.
L. m. m. 275. *BLACKW.* 552. (Fl. *DAN.*
 268.) - - - III. 633. a. b. c. d
 cneorum. - - - IV. 975. b.
 dubium? thymelaea auctoris. *POMET.* f. 57.
 p. 83. *BLACKW.* 62. - - - a.
488. *STELLARIA* passerina. Vogelsknopf.
 (*JACQVIN.* icon plant. rar. 80.) III. 671. d.

Ordo III. TRIGYNIA.

495. *POLYGONVM* auiculare. Begtrif.
 trainasse, renouée. knotgrafs. *BLACKW.* IV. 823. h. i.
 315. latifolium et folio variegato. (-824. a. b. c. e
 bistorta. Watermurfes. bistorte. snacke-weed.
L. m. m. 495. *BLACKW.* 254. (Fl. *DAN.* 421.) I. 244. c.
 viviparum. small bistort. (Fl. *DAN.* 13.) - [- b.
 245. a. b.

perfi-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

perficaria. Flechtraut, Mäusenkraut. perficarie.			
arfe-smart. <i>BLACKW.</i> 118. (<i>HVDSON</i> Fl.	IV.	803. abc.	
Angl. 148. - - -		804. abc.	
amphibium. (Fl. <i>DAN.</i> 282.) -	—	830. d.	
hydropiper. Wasserpfeffer. poivre d'eau.			
<i>BACKW.</i> 119. - - -	—	803. d.	
orientale. Indischer B. -	—	805. a.	
chinense. Heidenborn. sarrasin grimpant. black			
bindweed. (<i>BVRM.</i> Ind. 90. t. 30. f. 3.) II.		500. e.	
fagopyrum. Buchweizen. sarrasin, blé noir.			
buckwheat, brank. - - -	— —	d.	

Ord. IV. TETRAGYNIA.

500. PARIS quadrifolia. Einbeeren. raisin de renard, pairiette. One-berry. *L. m. m.* 282. *BLACKW.* 286. - - IV. 799. a. b. c.
501. ADOXA moschatellina. Bisemhahnen-fuß. moschatel. (Fl. *DAN.* 94.) III. 737. b.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

ORDO I. MONOGYNIA.

503. LAVRVS cinamomum. Zimmet. la canelle fine. cinnamon. *L. m. m.* 283. *BLACKW.* 354. (*JACQVIN* select. stirp. American. histor. p. 59. Tab. 117. crescit non solum in India orientali, verum etiam in silvis montosis S. Mar-

tinicae

- tinicae insulae ad montem Calebasse, ac
 Februario et Martio floret. Cortex in-
 terior trunci, colore, odore, sapore at-
 que figura cinnamomum orientale exacte
 refert; discrimen solum obseruauit *JAC-*
QVIN in illius compage minus subtili,
 magisque sapore acri, quod vtrumque
 coeli et terrae rationi adtribuendum est.
 Occidentalis arbor tantum varietas esse
 videtur orientalis. Radix crassa, ramo-
 saque multum exsudat camphorae, cuius
 et sapore gaudet facultateque adstrin-
 gente. Arbusculae, minime vero semi-
 na transportari possunt.) II. 385.
- a, canella Indica. Zeylanscher Zimmet. — 386. a.
- b, malabathrum folium. - - III. 692. b.
- culilawan. Kulilaban. L. m. m. 286. ei. mant.
732. *RUMPH.* Amboin. 2. p. 65. t. 14. II. 447. a.
- caffia. L. m. m. 284. *BLACKW.* 319. -- 386. b.
- camphora. L. m. m. 285. *BLACKW.* 347. *Ram-*
fer. camphire. (Commel. H. I. t. 95.) Japa-
 nensis et Zeylanica. - - I. 165. a.b.c.
- nobilis. Forbeerbaum. le laurier, common bay-
 tree. L. m. m. 286. *BLACKW.* 175. (vulgaris III. 634. c.
 Laur. *BAUH.*) - - 635. a.b.c.
- indica. Indischer E. - - — 634. d.
- benzoin. Cf. *COMMERS.* l. 97. benjoin. Ben-
 jamin tree. - - I. 240. b.
520. *ANACARDIVM* occidentale. Ele-
 phantenlaub. anacarde. L. m. m. 290.
BLACKW. 369. *TOURNEFORT* acaju.
 T. 435. (*BROWN.* Jamaic. I. 226. *CA-*
TESB. car. 3. p. 9. t. 9. *RHEED.* Mal. 3. t. 54.
JACQVIN. fel. stirp. Americ. hist. p. 63.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

Tab. 121. Gallis vocatur: *Acajou*, vel *pommier d'Acajou*. Crescit in Caribaeis et vicina continente. Nux oleum habet causticum et venenatissimum; candela accensae proxime admota, ignes artificiosos pulchrosque imitatur. Nuclei ita praeparantur ab incolis, vt sine damno commedi possint, gratissimumque largiantur saporem. Potum illi quoque ex hisce nucleis conficiunt succolatae similem palatoque satis arridentem. Dantur varietates anacardii multae pro soli situsque discrimine.) Nux anacardii est

fig. b. t. 104.

-

-

I.

[104. b.
105. a.]

Ord. III. TRIGYNIA,

506. RHEVM rhaponticum. Rhabarber.

rubarbe. rhubarb. L. m. m. 291. BLACKW.

600. (Rheum palmatum habetur pro vero officinali, multumque hodie colitur in

Britannia.)

-

-

IV. 863. d.

barbarum, lanuginosum *MPNT.* (rhabarbarum?) — — b.

507. BVTOMVS vmbellatus. Wasserlilsch.

butome. water gladiole.

-

III. 614. f.



CLASSIS X. DECANDRIA.

ORDO I. MONOGYNIA.

a. Flor. polypetali irregulares.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

509. *ANAGYRIS foetida*. Stinfender Boh-
nenbaum. bois puant. stinking bean-tre-
foil. — — — 618. a.
africana coerulea. *BVRM.*? — — — b.
510. *CERCIS filiquastrum*. Judasbaum.
guainer. Judas-tree. — IV. 922. b.
512. *HYMENAEA courbaril*. anime gum-
mi Ph. Hülsenbaum. plan. gummi anime.
L. m. m. 295. *PLVKN.* T. 82. 3. (*JAC-*
QVIN. sel. stirp. Amer. hist. p. 63. T. 264.
f. 95. Jetaiba *PISO.* Bras. IV. c. 8. *BROWN.*
Jamaic. I. p. 221. Truncus emittit ex cor-
tice gummi pellucidum, flavesceus, in-
odorum. Reperitur arbor in silvis insu-
lae Martinicae.) — — I. 137. b. c.
POMET. p. 403. f. 300. Hymen. canca-
num descripsit, arborem ex qua anime
gummi stilare existimat. *WEINMANN*
figuram dat *POMETI* mutilatam. II. 295. c.
514. *CASSIA fistula*. Cassie. casse. pudding-
pipe tree. *L. m. m.* 296. *BLACKW.* 381.
(*COMMEL.* H. Amstelod. T. I. p. 215.
tab. 110. *RVMPH.* Amb. T. II. p. 83.
tab. 21. Prosp. *ALPIN.* Aegypt. p. 3
pag. 7. H *MALAB.* T. I. p. 37. tab. 21. II. [340. a.
[341. b.
Alexand.; Brasiliana, *POMET.* f. 221. — 340. b.

Mari-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

Marilandica. - - -

IV. 915. a.

Senna. Sennesblåter. fené. senna. *L. m. m.* 297.

(Senna Alexandrina et Italica Ph. prio-

rem depinxit *MORIS*. hist. pl. T. II. p. 201.

fect. 2. tab. 24. fig. 1. posteriorem idem

p. 200. f. 2. tab. 24. sect. 2. Salvador *SOLIVA*

disertacion sobre el sen de Espanna. Madrid.

1774. Prior etiam crescit in Arabia et Aegy-

pto superiori.) - - -

- - b.

515. POINCIANA pulcherrima. *Paradis*

blume. poinciade. (fleurs de Paradis) flo-

wer-fence. (*SLOANE* Jamaic. II. p. 49.*BROWM*. Jam. I. 225. *RUMPH.* Amb. IV.p. 53. t. 20. *BURM.* Zeylon. 79. *BREIN.*cent. 61. t. 22. *MERIAN.* Surin. p. 45.t. 45. *RHEED.* Mal. VI. p. 1. t. 1. Ex

floribus paratur in India occidentali infu-

sum theaeforme, ac, vti dicitur, feбри-

fugum. Semina commeduntur. Crescit

in Caribaeis.) - - -

I. 11. b.

516. CAESALPINIA vesicaria *L. m. m.*300. Santalum rubrum; ex *POMET.*

IV. 883. b. c.

1390. MYROXYLON peruviferum, *LIN.*suppl. 233. *L. m. m.* 654. *HERNANDEZ.*

p. 51. Perubianscher Balsam. baume de

Perou. - - -

I. 225. a.

517. GVILANDINA moringa. *L. m. m.*302. *BURM.* Zeylan. t. 75. Tamarindusflore rubro. *WEINM.* -

IV. 964. b.

Ben glans vnguentaria. moringa Zeyla-

nica *WEINM. BLACKW.* 386.

I. 240. a.

Lignum nephriticum. *Griesb. holz.* *L. m. m.*

302. bois nephritique. -

III. 754. a.

(Est nephriticum lignum & been nux
Ph. Prius: muringu Hort. *Mal.* morun-
ga, kellar, *RUMPH.* Amb. T. I. p. 184.
tab. 74. Crescit arbor in Malabaria, Zey-
lan, Aegypto. Posterior: glans vn-
guentaria Lat. *βαλανος μυρεψικη*
Graec. cf. *ALDINI* hort. Farnes. p. 72.
HEISTER. diss. de nuce been. Helmst.
1750. Crescit in insula Zeylan, et in
Arabia, Aethiopia, Aegypto.)

b. Fl. polypetali, regulares.

518. *GVAIACVM* officinale. Franzosenholz.

Guaiac. *L. m. m.* 303. *BLACKW.* 350. III. 569. a.
sanctum. *BLACKW.* 350. — — b.

(lignum sanctum, lignum indicum Ph.
BROWN. Jam. p. 225. *SEBA* thes. Vol. I.
p. 86. tab. 53. f. 2. *HUGH* Barb. p.
142. tab. 9. *SLOANE* Jamaic. Vol. II.
p. 133. tab. 222. f. 3 - 6. Patria est
Hispaniola, Brasilia, Jamaica, Barba-
doox.)

522. *DICTAMNVS* albus. fraxinelle, di-

ctame blanc. white dittany. *L. m. m.* 522.

BLACKW. 75. flore rubro et albo. II. 461. a. b.

(*MILLER.* T. 123. *JACQVIN.* Fl. Austr.
tab. 428. *REGNAULT.* *STÖRK*, lib. de
flammula iouis. fig. 2. Europa meridio-
nalis patria habetur.)

523. *RVTÄ* graueolens. Haute. *L. m. m.*

305. *BLACKW.* 7. — — IV. 875. c.

(rue des jardins. *REGNAULT.*)

chalepensis. — — — — d.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

524. **TOLVIFERA** balsamum. Tolu balsam.
baume de tolu. *L. m. m.* 306. *POMET.*
305. Dub. - - I. 225. b.
536. **MONOTROPA** hypopithys. Ohnblat.
lilas des Indes. - - III. 774. a.
527. **MELIA** azedarach. Zederach. faux sy-
comore. - - I. 217.
554. **PYROLA** rotundifolia. Wintergrün.
pirole. common wintergreen *L. m. m.* 333.
BLACKW. 594. (*Fl. DAN.* tab. 110.) IV. 841. e.
minor (*Fl. DAN.* 55.) - - - d.
secunda. (*Fl. DAN.* 402.) - - - c.
umbellata. - - - a.
uniflora. (*Fl. DAN.* 8.) - - - f.
546. **LEDUM** palustre. Rühroß. Mars-ci-
stus. *L. m. m.* 311. (*Rorismarinum* fil-
vestre *Ph. LIN.* diss. de ledo palu-
stri. *Vpsal.* 1775. *CAMER.* epit. p. 546.
Patria est Europa septentrionalis. Ante
aliquot annos, *BIÖRNLVND*, *ODHELIVS*
et *BRANDELIVS*, medici Suecici her-
bae et stipitum ledi huius decoctum con-
tra dysenteriam et diarrhoeam collau-
darunt in act. Soc. Reg. Suec. Vol. III.
Holm. edit. 1782.) - II. 392. c.
c. *Fl.* monopetali aequales.
547. **RHODODENDRON** villosum f. hir-
sutum. Alprose. rose-bay. - III. 756. d.
ferrugineum. - - - II. 392. b.
552. **ARBUTUS** vnedo. Erdbeerbaum. ar-
busier. strawberry tree. - I. 166. d.

595. **STYRAX** officinale. Storax. le storax. storax-tree. *L. m. m.* 316. (*MIL-
LER'S* fig. 260. *REGNAULT.*) IV. 953. a.
d. Fl. apetal.
542. **COPAIFERA** officinalis. Ropaiabalsam. baume de copau. ex *POMET.* 303. *L. m. m.* 317. Genuinam figuram v. apud *JACQUIN.* (sel. stirp. Amer. hist. p. 67. tab. 128. *MARGG.* Bras. Lib. III. c. 17. *PISO.* Bras. lib. IV. c. 4. crescit haec arbor frequens circa oppidum Tolu, non longe a Carthagena, promiscue cum arboribus, quae balsama Tolutanum, Peruvianum aliaqua stillant. Peruvianum enim, quod hic adponere haud superfluum erit, non in regno Peru, sed in sic dicta Terra firma occurrit et nascitur. copaifeiae patria est Tolu, hospitatur etiam in S. Martinica circa vicum Carbet.) I. 224. a. b.

Ord. II. DIGYNIA.

562. **SCLERANTHVS** perennis. Rnauel. renvuee. knawel de Pologne. (Fl. *DAN.* 563.) - - - IV. 825. f.
annuus. (Fl. *DAN.* 504.) - - - — — g.
degener. - - - III. 617. c.
558. **CHRYSPLENIVM** alternifolium. Nil fraut. faxifrage d'orée. faxifrage. (Fl. *DAN.* 366.) - - II. 380. a.
559. **SAXIFRAGA** cotyledon. Steinbrech. (cotyledon med. *BAUH.* Fl. *DAN.* 241.) faxifrage. . - - IV. 914. f.

varie-

Genus.					Tom. Tab. Lit.	
varietas : multiflora.	-	-	-	-	-	g.
punctata.	-	-	-	-	-	h.
geum.	-	-	-	-	-	e.
trydactylites. <i>BLACKW.</i> 212.	-	-	-	-	-	c.
granulata. <i>Weisser Steinbrech. saxifrage. stone-break. L. m. m.</i> 318. <i>BLACKW.</i> 56. (<i>Saxifraga alba</i> Ph. Fl. <i>DAN.</i> 514. <i>REGNAULT.</i>)	-	-	-	-	385.	a.
561. MITELLA diphylla. <i>Wilder Amerikanischer Sanikel. bastard American sanicle. II.</i>	-	-	-	-	430.	f.
563. GYPSOPHILA muralis. <i>Gypsstrauch. III.</i>	-	-	-	-	679.	b.
564. SAPONARIA officinalis. <i>Gemeines Seifenkraut. savoniere. fopewort. L. m. m.</i>	-	-	-	-	-	-
319. <i>BLACKW.</i> 113. (<i>Fl. DAN.</i> 543. <i>REGNAULT.</i>)	-	-	-	-	686.	c.
varietas : flore pleno.	-	-	-	-	-	d.
vaccaria.	-	-	-	-	-	684. a.
565 DIANTHVS caryophyllus. <i>Gartennelke. Pœillet. cloves, maiden-pink. L. m. m.</i>	-	-	-	-	-	-
320. <i>BLAKW.</i> 85. (<i>tunicae, f. caryophylli rubri</i> Ph. <i>REGNAULT.</i>)	-	-	-	-	II. { 326. c. d. 330. a. c. d.	-
varietas : a. maior.	-	-	-	-	-	326 a. b.
b. floribus plenis.	-	-	-	-	-	{ 332. a - d. 333. a - c. 334. a. b. 335. a - c. 336. c. 337. a - c.
c. bicolor.	-	-	-	-	-	{ 338. a - c. 339. a. b.
d. prolifer.	-	-	-	-	-	{ 340. b. 336. a. b.
e. petalorum margine integro, flore rosaceo.	-	-	-	-	-	341. c.
f. calice imbricato.	-	-	-	-	-	337. c.

Genus.	Tom.	Tab.	Lit.
deltoides, cum varietatibus. (Fl. DAN. 577.)	—	330.	b.e.f.
glaucus, flore pleno.	-	-	— g.
barbatus, cum varietatibus.	-	—	{ 327. b. e. 328. a. c.
carthusianorum, cum variet. Felsbneffe.	—	331.	c.d.e.
armeria. (Fl. DAN. 230.)	-	-	— f. g. i.
chinenfis.	-	-	— 329. a. b. e. f.
varietas: flore pleno.	-	-	— c. d.
superbus. (Fl. DAN. 578. JACQVIN. obs. 40.			
tab. 25.)	-	-	— 331. b.
fruticosus.	-	-	— 327. a.
plumarius. (BAVH. pin. 210.)	-	—	331. a.

Ordo III. TRIGYNIA.

566. CVCVBALVS bacciferus. Taubens			
fropf. berry-bearing, chikweed. (GME-			
LIN. act. Petropol. Vol. XIV. t. 17. f. 1.)	—	279.	a.
behen. Wildes Seifentraut. behen blanc. blad-			
der campion.	-	-	III. 681. e.
fabarius.	-	-	— 682. d.
otites (Fl. DAN. 518.)	-	-	— 678. b.
567. SILENE quinquevulnera. Schleimtych-			
nig	-	-	— 678. c.
lusitanica.	-	-	— 681. b.
anglica.	-	-	— c.
gallica.	-	-	— 678. d.
noctiflora.	-	-	— e.
bupleurifolia.	-	-	— f.
conoidea.	-	-	— 679. a.
gigantea.	-	-	— 682. a.
cretica.	-	-	— 683. e.
armeria. (Fl. DAN. 559.)	-	-	— a-d.

noctur-

Genus.	Tom.	Tab.	Lit.
nocturna.	—	686.	b.
nutans. (Fl. DAN. 242.)	—	—	a. d.
568. STELLARIA nemorum. Sternpsian			
3e. stellaire. (Fl. DAN. 271.)	I.	76.	a.
holostea. stellaire graminée.	III.	553.	i.
cerastoides.	I.	76.	d.
569. ARENARIA peploides. Sandkraut.			
trinervia. (Fl. DAN. 329.)	—	77.	a.
serpyllifolia, fig. vitiosa. v. FVCHS. hist. 23.	—	78.	d.
	—	—	g.

Ord. V. PENTAGYNIA.

578. COTYLEDON orbiculata. Nabelkraut.

navelwort. nombril de Venus. BLACKW.	II.	[433. b.
263. limbo folii purpureo. TOVRNEF.		434. a.
spuria. (MORIS. hist. III. p. 474. Tab. 7. f. 40.	—	433. a.
laciniata. MONT. 125.	—	434. b. c.
umbilicus.	IV.	914. h.

579. SEDUM telephium. Gette Henne.

l'orpin, la reprise. (telephium f. faba
crassa Ph. REGNAULT.) L. m. m. 321.

BLACKW. 191.

a. maximum album.	IV.	968. a. b.
b. purpureum.	—	967. d.
anacampseros.	—	— b. c.
cepaea.	—	912. c.
rupestre.	—	914. k.
album. Kleine weiße Hauswurzel. trique blan-		
che. BLACKW. 428. (Fl. DAN. 66.)	—	— a.
acre. Mauerpfeffer, Ragentraube. vermiculaire		
brulante. wallstone peper. L. m. m. 323.		
BLACKW. 237. (sedum minus f. vermi-		
culare Ph.)	—	— i.

582. **OXALIS** acetosella. Sauerflee. oxalide. wood sorrel. *L. m. m.* 524. *BLACKW.*
 308. (*REGNAULT. MILLER. Bucham.*
pfer.) - - - I. 20. f. g.
 varietas: flore purpureo. l'Alleluja. — 21. a. b.
 corniculata. - - - — — c.
583. **AGROSTEMMA** githago. Kornröslein. nielle des bleds. cockle. (*Fl. DAN.* III. [685. e.
 576.) - - - [686. a.
 coronaria. - - - — [677. d.
 [678. a.
 varietas: flore pleno. Rosenlychnis. coquelourde des jardiniers. rose-campions. — 677. e.
 coeli roaf. (*HERM. H. Lugd. B. tab. 393.*) — 685. d.
584. **LYCHNIS** chalcedonica. Jerusalemnelke. (flos Constantinopolitana.) — 677. a. b.
 varietas: flore pleno. - — — c.
 flos cuculi. (*Fl. DAN. 590.*) - — [679. c. d.
 [680. a.
 viscaria. - - - — [— e.
 [680. b. d.
 dioica: a. rubra. Marienröslein. - — 685. b. d.
 flore pleno. - - — 684. c.
 b. alba, foemina. Weisse, wilde Lychnis. lichen sauvage. wild white
 champion. - - — 682. c.
 mas. - - — — b.
 flore pleno. - - — 684. b.
585. **CERASTIVM** aruense. Hornkraut. oreille des fouris. mous-ear chickweed. I. 76. e. f. g.
 viscosum. - - - — — b.
 repens. l'argentine. - - - — 77. c. d. e.
 suffruticosum. - - - — 76. c.

Genus.

Tom. Tab, Lit.

586. SPERGVLA aruensis. Wilder Spars
 gel. (du HAMEL, cult, VI. p. 149. t. 1.) — 78. a, b.
 pentandra. — — — 77. f.
 nodosa. (Fl. DAN. 96.) — — — 78. f.

Ord. VI. DECAGYNIA.

588. PHYTOLACCA decandra. Kermes;
 beer, (Afrikanischer Nachtschatten). rai-
 fin d'Amerique, pork phylick. IV. 936. a.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

589. ASARVM europaeum. Haselwurzel.
 cabaret, oreille d'homme. afara bacca. L.
 m. m. 326. BLACKW. 383. (Fl. DAN. T. 633.) I. 181. c.
 598. CANELLA alba. (Winterana canella)
 L. m. m. 327. BLACKW. 206. PLVKN.
 81. I. — — — II. 341. b.
 603. PORTVLACCA oleracea, fatiua.
 Portulak, pourpier, purslane, L. m. m. 328.
 BLACKW. 287. (REGNAVLT.) IV. 828. d.
 filuestris. — — — 829. a.
 pilosa. — — — — c.
 anacampseros. — — — — b.

604. LY-

604. **LYTHRUM** salicaria. Blutkraut, ro-
ther Weiderich. salicaire. willow herb.
L. m. m. 329. *BLACKW.* 520. (lysim-
chia purpurea Ph. Fl. *DAN.* 671. *RE-*
GNAULT.) - - - I. 246. b.
thymifolia. - - - IV. 824. c.

Ord. II. DIGYNIA.

607. **AGRIMONIA** eupatoria. Odermenig,
Steinwurzel. aigremoine. agrimony. L.
m. m. 330. *BLACKW.* 21. (Fl. *DAN.* 583.
REGNAULT. MILLER.) - - I. 29. c.
varietas: flore albo. - - — — b.

Ord. III. TRIGYNIA.

608. **RESEDA** luteola. Streichkraut. gaude.
wild woat. *BLACKW.* 283. - III. 676. a.
lutea, Harakraut. - - IV. 863. a.
609. **EUPHORBIA** antiquorum. l'euphor-
be. *BLACKW.* 339. - II. 497. a.
esula Indica ex qua gummi gutta.
WEINM. - - III. 561. c.
officinarum. *BLACKW.* 340. - II. 494. a.
mammillaris. - - — — b.
cereiformis. - - - — 498. b.
neriifolia. - - - — 497. b.
caput medusae. - - — — c.
tithymaloides. (HERM. Parad. 234. t. 234.
COM. Hort. I. p. 31. t. 16. *PLUK.* Alm. — 498. a.
- - - 493. c.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

369. t. 230. f. 2. <i>DILL</i> . Elth. 383. t. 230.			
f. 372. <i>JACQVIN</i> stirp. Americ. hist. p. 74.			
t. 138. Plantae totius, referente <i>JAC-</i>			
<i>QVINO</i> , praecipue caulium saturatum deco-			
ctum a medicis Curaçauiensibus pro po-			
tu ordinario praescribitur lue venerea labo-			
rantibus. Eodem vtuntur Americanae in			
continente in menstruorum suppressione.			
Crescit in variis Caribaeis et vicina conti-			
nente, locis saxosis fruticosis, plerum-			
que a mari non adeo remotis. Floret Aprili,			
vsque ad Julium.)	-	-	— 493. d.
mauritanica.	-	-	— 492. b.
peplus.	-	-	— — e.
exigua. (Fl. <i>DAN</i> . 592.)	-	-	— 489. c.
lathyris. Springfórner, l'éparge. gardens			
purge. <i>L. m. m.</i> 332. <i>BLACKW.</i> 123.			— 490. a. b.
spinosa.	-	-	— 493. a.
apios.	-	-	— 487. g.
dulcis.	-	-	— — f.
paralias.	-	-	— — c.
helioscopia.	-	-	— 489. b.
terracina.	-	-	— 491. c.
orientalis.	-	-	— 489. c.
verrucosa.	-	-	— 488. a.
platyphyllos.	-	-	— 490. c.
esula. (<i>TABERN.</i> f. 541. <i>VAILLANT</i> Pa-			
ris. 192.)	-	-	— 489. a.
cyparissias. Wolfsmilch, tithymale des champs.			
<i>BLACKW.</i> 163.	-	-	— — b.
varietas degenerata.	-	-	— 491. d.
palustris. tithymale des marais, grande esule.			
<i>L. m. m.</i> 333.	-	-	— — a. b. e.
dendroides.	-	-	— 488. b.
Ord.			

Ord. V. DODECAGYNIA.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

612. *SEMPERVIVUM* tectorum. Hauswur:fel. grande joubarbe. hauseleek. *L. m. m.*334. *BLACKW.* 366. (sedum maius, f.semperuium maius *Ph. Fl. DAN.* 601.*REGNAULT.*)

feditorme.

arachnoideum.

arboreum.

IV. 913. a.

— — b.

— — d.

— 912. a. b.

C L A S S I S XII.

ICOSANDRIA.

Ordo I. MONOGYNIA.

613. *CACTVS* mammillaris. smaller melon-

thistle.

II. 474. b.

melocactus. Melonendistel melonthistle.

— — a.

tetragonus. Fäfelbistel. torch-thistle.

— 356. a.

hexagonus.

— 357.

pentagonus.

— 356. b.

grandiflorus.

— 354.

peruvianus.

— 355.

flagelliformis.

— 358. c.

Royeni.

— — b.

triangularis. (*Act. HELV. V.* p. 268. t. 2.*JACQVIN.* fel. ft. Americ. hist. p. 75. de-scripsit: *a.* aphyllum, ad magnam altitu-

dinem candentem, radicibus emissis se ad-

figen-

figentem, qui absque fulcro sustinere se non potest. Rupes umbras inuestit. Fructus inter omnes congeneres sapore est praestantissimus, cum dulcore acidulus, gratus, refrigerans. Crescit sine foliis in silvis insulae S. Martinicae montosis, et vocatur ab incolis *poirier de chardon*, f. pyrus cardui. *b.* foliosum, tab. 260. fig. 38. varietatem praecedentis. Fructum dat multo maiorem, nitide coccineum, foliolis vestitus fere integris. Pulpa candida est, subdulcis, fatua, edulis, referta seminibus atris nitidisque. Reperitur in insula S. Eustachii.) - - - - - a.

ficus indica. Indische Feige. raquette figuier

d'Inde. common Indian fig. - - - III. 766. b.

tuna. - - - - - 765. g.

curassauicus. pinpillow - - - - - c.

cochenillifer. cochineal - fig. - - - 766. a.

phyllanthus. - - - - - II. 507. d.

614. PHILADELPHVS coronarius. Wel-

scher Kronenjasmin. siringe. pipe tree,

mock - orange. - - - - - III. 602. g.

615. PSIDIVM guaiaua (pyriferum). Gua-

va. (BROWN. Jam. 238. SLOANE Jam.

II. 163. JACQUIN obs. II. t. 31.) - - - 561. b.

616. EVGENIA malaccensis. - - - 601. a. c.

617. MYRTVS communis. Myrten. myrte.

myrtle. (REGNAULT.) L. m. m. 335.

BLACKW. 114.

a. belgica. - - - - - 744. c.

b. romana. - - - - - d.

c. taren-

Genus.	Tom. Tab. Lit.		
<i>c. tarentina.</i>	-	-	— 745. b.
<i>d. italica.</i>	-	-	— — a. c.
<i>e. mucronata.</i>	-	-	— — d.
<i>f. folio variegato.</i>	-	-	— — e. f.
<i>g. flore pleno.</i>	-	-	— 744. e.
<i>pimenta. L. m. m. 337. BLACKW. 355. (amomum ; piper jamaicensis ; pimenta Ph. SLOANE Jam. T. II. p. 76. t. 191. f. I. BROWN. Jam. p. 247. REDI exper. circa var. res natur. p. 133.)</i>			
	-	-	II. 325. b.
<i>Zeylanica.</i>	-	-	III. 650. a.
618. PVNICA granatum. Granatäpfelbaum, Boluster. grenadier. pomgranate - tree. flores balauſtiorum. <i>L. m. m. 338. BLACKW. 145. (granatum ; malicorii vnde; cortex. du HAMEL traité des arbres. T. II. p. 193. 196. REGNAULT.)</i>			
	-	-	— 557. a. b.
<i>varietas: flore pleno. BLACKW. 97.</i>	-	-	— — c.
<i>nana.</i>	-	-	— — d.
619. AMYGDALVS communis. Gemeiner Mandelbaum. amandier. almond - tree. <i>L. m. m. 340. BLACKW. 105. (Habe-mus dulcem, amandier des Damas f. amand. à coque tendre. v. du HAMEL arbres fruit. T. I. p. 120. tab. 1. MATER. pomona Francon. T. I. tab. 5. et amaram, amandier à fruit amer. du HAMMEL. l. e. p. 123.)</i>			
	-	-	I. 101. c.
<i>nana. le petit amandier.</i>	-	-	— 102. a.
<i>varietas: a. flore pleno.</i>	-	-	— — c.
<i>b. frondosa.</i>	-	-	
<i>perfica. Pfersichbaum. pécher. peachtree. L. m. m. 339. BLACKW. 101. (perfica. Ph.</i>			

dn HA-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

du *HAMEL* arbr. fruit. T. II. p. 42. tab. 30.*MAYER*. pom. Franc. Vol. II. Tab. 3. 4.) III. 707. f. g. h.

varietas : a. minor. - - - e.

b. flore pleno. - - - d.

620. *PRVNVS* domestica. Zwetschen. prunier. plum-tree. L. m. m. 344. (gallica, damascena, brignolensia Ph. varietatum copiam v. in *MAYER*. pomana Franc. T. I. p. 110. sq. et du *HAMEL*. arbr. T. II. p. 65. sq.

a. communis. Gemeine Z. - IV. 835. a.

b. damascena. *BLACKW.* 305. - - - c.

c. cerea. - - - - - d.

d. acinaria. - - - - - 836. e.

e. cereola. - - - - - 835. e.

f. amygdalina oblonga. - - - - - b.

g. brignola. - - - - - 836. a.

h. myrobolanus. - - - - - f.

i. — dulcis delphinus fructu viridi. la daphine. - - - - - h.

insititia. a. coerulea. - - - - - b.

b. rubra. - - - - - d.

spinosa. Schwarzdorn, Schlehen. prunelier.

floe-tree, black-thorn. L. m. m. 345.

BLACKW. 494. (acacia nostr. f. prunus silvestris Ph. *REGNAULT*.) - - - I. 10. a.

padus. Traubentirschen, Elsebeerbaum. bois de

Lucie. birds-cherry. - - - II. 351. g.

laurocerasus. Lorbeerfirsche. laurier cerise. laur.

L. m. m. 341. *BLACKW.* 512. (laurocerasus Ph. *CLVSII* hist. pl. rar. p. 4. du *HAMEL* tr. des arbr. tab. 133. Arbor, circa

mare nigrum sponte crescens, Trapezunte

a. 1576, transmissa in alias regiones.) III. 636. a.

F

maha-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

mahaleb. mahaleb, le veritable bois de S. Lucie. - - -

II. 352. c.

cerasus. Kirschenbaum. cerisier. cherrytree.

L. m. m. 342. BLACKW. 425. 449. (ce-

rafi rubri acidi Ph. du HAMEL. arbr. fruit.

T. I. p. 153. sq. MVNCHHAUSEN Haus-

water. T. III. p. 338. sq. MATER pomon.

Franc. T. II. p. 1. sq.) - -

a. caproniana sativa rotunda rubra &

acida. - - - — 351. a.

b. flore pleno. - - - — 352. b.

c. austera. - - - — 351. c.

d. alba dulcia. - - - — e.

e. racemosa hortensis. - - - 352. d.

avium. Schwarze Kirschen le merisier. L. m. m.

343. (cerasi nigri Ph. REGNAULT. MATER.

I. c. T. II. p. 28. tab. 7. Grosse, schwarze

Waldkirsche.) - - - — 351. d.

duracina, carne crassa, dura. - - - f.

fructu cordato maiore. bigarella. - - - b.

armeniaca. Aprisosen. fructu maiore. III. 698. a. b.

a. minore fructu. Amarellen - - - c.

b. ex luteo rubescence. abricotier.

apricock - tree. - - - d.

Ord. II. DIGYNIA.

622. CRATAEGVS aria. L. m. m. 346.

(Fl. DAN. 302.) - - - III. 727. a.

torminalis. - - - — b.

azarolus. - - - 728. a.

oxyacantha. Hagedorn, Weissdorn. l'aubepin,

epine blanche. white dorn, haw - dorn.

BLACKW. 149. - - - 727. c.

Ord.

Ord. III. TRIGYNIA.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

624. *SORBUS aucuparia*. Sperberbaum,
Vogelbaum. forbier. quicken-tree. *L. m. m.*
347. *BLACKW.* 173. (*MILLER.* illustr.
syst. sex.) - - IV. 941. b.

Ord. IV. PENTAGYNIA.

625. *MESPILUS germanica*. Mispelbaum.
le neslier, meslier. medlar-tree *L. m. m.*
348. *BLACKW.* 154. (du *HAMEL.* l. c.
T. I. p. 327. tab. 2. et 3. descripsit le ne-
slier des bois et à gros fruit. *MAYER.* l. c.
T. II. p. 45. tab. I. 2. *REGNAULT.*) III. 728. b.
pyracantha. - - - I. 10. b.
cotoneaster. (*Fl. DAN.* 112.) - II. 514. e.
626. *PYRUS communis*, *a.* pyrafter. Ge-
meiner Birnbaum. poirier. pear-tree.
BLACKW. 453. - - IV. 842. a.
b. filuestris, fructu polyantho, maiore et
minore. *P.* petite sauvage. *MANG.*
pom. II. A. a. IV. 1. - - 844. f.
c. falerna. Bergamotbirnb. bergamotte. - 842. e.
d. pompeiana. - - - i.
e. fauonia moschatellina. poire mus-
quette, Grühbirnb. Muskatb. *MANG.*
II. Aa. aa? 38. - - 844. b.
f. moschatellina maiora. - - e.
g. voleria, libralia maiora. Grosse
Pfundbirn. minora. *MANG.* II. Bb. - 842. f.
bb. 117. - - 844. g.
h. arrostia. Bratbirn. - 842. b.

<i>i.</i> curtispindula aquosa. Wasserbirn.	—	—	c.
<i>k.</i> cydonia. Quitzenbirn. <i>MANG.</i> II.			
Aa. 36.	—	—	d.
<i>m.</i> oblonga angulosa. graue Sommer-			
birn. grise bonne. <i>MANG.</i> II. 71.	—	—	g.
<i>n.</i> pralina. Grauling.	—	—	h.
<i>o.</i> praecocia crocea. Pfalzbirn.	—	—	k.
<i>p.</i> trochapia. Hespardenbirn.	—	843.	b.
<i>q.</i> ferotina. Winterbirn. <i>MANG.</i> II.			
Cc. 128.	—	—	a.
<i>r.</i> rotunda maiora.	—	—	c.
<i>f.</i> sanguinea. Blutbirn. sanguinole.			
<i>MANG.</i> II. Cc. 122.	—	—	d.
<i>t.</i> sapida. Letschbirn.	—	—	f.
<i>v.</i> regelana succolenta. poire gris.	—	—	g.
<i>x.</i> superba oblonga. Kragelbirn.	—	—	h.
malus: <i>a.</i> siluestris. Wilder Apfelbaum, Holz-			
apfel. pommier. apple-tree. <i>L. m. m.</i> 349.			
<i>BLACKW.</i> 178. (poma Ph. speciatum siluestr.			
borsdorph. rubellianum. <i>MILLER. REG-</i>			
<i>NAVLT.</i> du <i>HAMEL.</i>) <i>MANG.</i> I. 192. III. 707. <i>a.</i>			
<i>b.</i> fructu rotundo rubro. Kleiner rōth-			
licher Holzapfel. <i>MANG.</i> I. 191.	—	—	b.
<i>c.</i> fr. rot. viridi. <i>MANG.</i> ib.	—	—	c.
<i>d.</i> paradisiaca. Paradiesapfel; pumila			
<i>f.</i> rubentia. pomme d'api. <i>MANG.</i>			
I. 31. Aa.	—	—	706. d.
<i>e.</i> apiola. Borsdorferapfel. fragrantia.			
curtispindula. <i>MANG.</i> I. 74. Aaa.	—	—	704. d.
<i>f.</i> rubentia. Rubinenapfel, Zwibelber-			
storferapfel. api grand. <i>BLACKW.</i>			
141. <i>MANG.</i> I. 31.	—	—	e.

- g. angulosa. Zapfapfel. pomme ta-
pone. Weißer Z. calville. *MANG.*
I. 139. Bbb. — — c.
h. dulcia. Süßling. *MANG.* I. 109. Bb. — — a. b.
i. crocina. Safranapfel, gestreifter
Zürcherapfel. *MANG.* I. 26. A. — 705. a.
k. praecocia. Johannisapfel. *MANG.*
I. 192. D. — — — b.
l. pulmonea. Volchapel. *MANG.* I. 29. — — c.
m. suauerubentia. Knöchleinapfel.
MANG. I. 74. — — — d.
n. vitromela. Glasapfel. *MANG.* I. 59. — — e.
o. carbonaria. Koblapfel, schwarzer
Forstderfer. *MANG.* I. A. 1. 3. — 706. a.
p. erythromela. Rother Backapfel.
MANG. I. Bb. 129. — — — b.
q. haematomela. Blutapfel. *MANG.*
I. Cc. 158. — — — c.
r. melapia. Musapfel. *MANG.* I. A. 30. — — e.
s. orbiculata. Breitling. *MANG.* I.
Aaa. 75. — — — f.
t. strangulatoria. Würgapfel. *MANG.*
D. 3. 191. — — — g.
cydonia. Quittenbaum. coignassier. L. m. m.
350. *BLACKW.* 137. (cydonii Ph. ex oppi-
do Cydone insul. Cretae arbor in Europam
translata est, du *HAMEL* tr. des arbr. fruit.
p. 206. t. 83. *REGNAULT.*) — — 703. b.
varietas: oblonga. — IV. 842. d.
fructu cornuto. *MUNT.* t. 6. III. 703. c.
628. MESEMBRYANTHEMVM cry-
stallinum. Eistraut, Zaserblume. diamand
ficoides. figmarigold. — II. 507. c.

Genus:			Tom. Tab. Lit.
neapolitanum (nodiflorum.)	-	-	505. e.
geniculiflorum.	-	-	506. a.
villosum.	-	-	— b.
hispidum.	-	-	505. g.
barbatum.	-	-	506. c.
varietas: maius.	-	-	507. b.
vncinatum diacanthos.	-	-	508. a.
triacanthos.	-	-	— c.
micans.	-	-	505. a.
deltoides.	-	-	— d.
bicolorum.	-	-	— b.
aureum.	-	-	— f.
acinaciforme.	-	-	506. d.
linguiforme.	-	-	— e.
loreum.	-	-	505. c.
dolabriforme.	-	-	507. a.
difforme.	-	-	508. b.

629. AIZOON canariense. Kanar. Zimmer

grün. - - - III. 616. a.

630. SPIRAEA falicifolia. Spierstaude. IV. 947. a.

hypericifolia. - - - [— b.

aruncus. Geißbart. - - - [III. 590. c.

filipendula, Rother Steinbrech. filipendula. I. 229. b.

dropwort. L. m. m. 351. BLACKW. 467.

(filipendula, f. saxifraga rubra, Spierstaude.

Ph. Fl. DAN. t. 635. REGNAULT.) II. 509. c.

vlmaria. la reine des prés, meadow-sweet.

L. m. m. 352. BLACKW. 465. (vlmaria Ph.

Fl. DAN. t. 547. REGNAULT.) - IV. 1018. a.

Ord. V. POLYGYNIA.

631. ROSA canina. Hefenrose, Hundrose,
rose sauvage. wild rose. L. m. m. 355.

BLACKW.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- BLACKW.* 8. (rosae filuestr. f. caninae
flores, conobatos fructus Ph.) — 871. b.
cum fructu cynobatos et nido insecti be-
deguar. Hagebuten und Schlafapfel. — — c.
eglanteria, *a.* lutea simplex. — — 870. c.
b. flore pleno. — — — b. •
c. bicolor, *JACQ.* H. Vind. I. t. r. — 868. c.
spinosissima, rosier à fleur blanche. *L. m. m.*
266. *BLACKW.* 73. (Fl. *DAN.* 398.) — 869. d.
sempervirens. — — — 870. a.
centifolia; rubra multiplex. Rothe Rose. ro-
sier de province. red rose. *L. m. m.* 253.
BLACKW. 78. 82. (rosa damascena; pal-
lida Ph.) — — — d.
gallica. (rosa rubra Ph. *BLACKW.* 82.) — 896. a. c.
a. varicolor. — — — { — b.
868. d.
b. prolifera. — — — 871. d.
alba, flore pleno. — — — 868. b.
632. *RVBVS* idaeus. Himbeerent. fremboi-
sier. raspberry, hindberry. *L. m. m.* 357.
BLACKW. 289. (du *HAMEL.* arbr. fruit.
T. II. p. 232 tab. 9. p. 253. tab. I.) IV. 873. c.
variet: *a.* fructu albo. — — — d.
b. folio variegato. — — — 874. a.
fruticosus. Brombeerstrauch. ronce. bram-
ble. *BLACKW.* 45. — — — c.
odoratus. Wohlriechender Himbeerstrauch. — — — b.
633. *FRAGARIA* vesca. Erdbeeren. le frai-
sier. strawberry. *L. m. m.* 360. *BLACKW.*
77. (*REGNAULT.* du *HAMEL* arbr.
T. I. p. 224. fraisiier commun. du *CHES-*
NE. hist. nat. des fraisiiers. — II. 514. c.
varietas; chilonensis. — — — d.

634. *POTENTILLA anserina*. Gänserich,Silberkraut. *argentine*. silverweed. *L.**m. m.* 361. *BLACKW.* 6. (*anserina**v. argentina* *Ph. Fl. DAN.* t. 544. *RE-**GNAULT.*)

- - - 1. 142. b.

fruticosa. shrub cinquefoil. - - - IV. 801. a.*rupestris*. - - - - - 848. c.*supina*. (*GMELIN. itin. I. p. 149. t. 27. f. 2.*) - - - e.*recta*. - - - - - - - a.*argen. a.* - - - - - - - d.*alba*. - - - - - - - b.*verna*. (*Fl. DAN. I. 114.*) - - - 847. b.*reptans*. Fünffingerkraut. quintefeuille. cin-quefoil. *L. m. m.* 362. *BLACKW.* 454.*pentaphyllum* *Ph. Kriechender Grünsing.**REGNAULT.*)

- - - - - c.

635. *TORMENTILLA erecta*. Blutwurz-gel. tormentil. septfoil, tormentil. *L.**m. m.* 363. *BLACKW.* 445. (Roth oderRuhrwurzel. *Fl. DAN. tab. 589. RE-**CNAULT.*)

- - - - - 977. c.

636. *CEVM urbanum*. Merzwurzel, Ab-

biss. benoite; recife; galiote. herbe ben-

net. *L. m. m.* 364. *BLACKW.* 253.(*caryophyllata* *Ph. Garoffel, Nelken oder**Benedictswurzel. Fl. DAN. t. 672. RE-**GNAULT.*)

- - - - - II. 323. b.

varietas: a. flore maiore. - - - 322. b.*b. folio variegato.* - - - 323. a.*riuale*. Wasserbenedictswurzel. *L. m. m.* 365.(*caryophyllata aquatica* *C. BAVH. Wassers-**garoffel. Fl. DAN. 722. Nostrates radice in**pulvere pro cortice Peru. contra febres*

Genus.

Tom. Tab. Lit.

intermitentes fausto euentu vti solent; nosmet ipsi saepius geum hoc riuale, contra febres intermittentes tertianas, datis antea vomitoriis, efficax reperimus; quamuis, quod reticendum non est, interdum et expectationi parum satisfecit.)

637. COMARVM palustre. Jünfclat. co-
maret. - - - - - IV. 847. d.

CLASSIS XIII.
POLYANDRIA.

ORDO I. MONOGYNIA.

1. Tetrapetali.

648. PAPAVER rhoeas. Korn oder Klappers

rose. coquelicot; ponceau, red poppy.

L. m. m. 369. *BLACK W.* 2. 560. (rheas

f. papauer erraticum, Ph. — — 791. a.

var. *a.* flore minore. - - - 788. c.

b, fl. marginibus albis. - - - [788. a.
[789. g.

6. fl. pleno albo margine. - — { 790. c.e.
788. e.
787. a.e.

d. fl. pleno albo. - - - 787. c.

margine rubro. — [789. f.
[790. b.

rubro. - - - 789. d.

e. fl. incarnato simplici et pleno. — [790. d.
[789. h.

f. fl. miniaceo pleno. - - - 789. c.

g. fl. miniac. variegato pleno. — 791. b.

F 5

h. d.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

644. *ACTAEA* spicata. Gemeines Schwarz-
fraut. herbe de S. Christophe. bane ber-
ries. *L. m. m.* 367. *BLACKW.* 565. (*Fl.*
DAN 498.) - - - - II. 380. b.

650. *CAMBOGIA* gutta? Gummigutt. gum-
migamba. *BLACKW.* 392. *L. m. m.* 392.
WEINM. ex *POMET.* p. 364. f. 275. euphor-
biae fruticosae aculeatae speciem refert.
Fig. autem *BLACKWELLIANA* ex hort.
Malabar. (van *RHEEDE* I. p. 41. t. 24.)
desumpta et *caddam - pulli* Malabaro-
rum, *Cambogia* *L.* est. Ex variis plan-
tis et arboribus succum lacteum funden-
tibus, haec gummi - resina colligitur. v.
acta *MOGVNT.* p. 68. - - III. 561. c.

669. *CARYOPHYLLVS* aromaticus, Ge-
würznägelein. geroslier. clove - tree.
L. m. m. 376. *BLACKW.* 338. *MVNT.*
245. (antophylli *Ph. RUMPH.* Amboin.
Vol. II. p. 1. tab. 1 - 3. *HOVTTVTN.* na-
tuurl. hist. Vol. II. P. 3. p. 44. tab. 12.
fig. 1. *SONNERAT*, voyage à la nou-
velle Guinée. à Paris. 1776. 4. p. 196.
tab. 119. Distinguendus verus ab arbo-
re siluestri, le faux geroslier, cuius idem
SONNERAT meminit, l. c. p. 197.
t. 120.) - - - - II. 324.

varietas: antophylli et caryophyllus re-
gius Rönigenägelein. *MVNT.* I. - - 325. a.

673. *CISTVS* villosus. Cistenröschén. rock-
rose. *BLACKW.* 197. - - - 391. a.
saluifolius. - - - - 390. b.
monspeliensis. - - - - 391. b.

crispos.

Genus.	Tom.	Tab.	Lit
<i>crispus.</i>	—	392.	a.
<i>falicifolius.</i>	—	390.	a.
<i>helianthemum.</i> (Fl. <i>DAN.</i> 101.) Sonnenrös;			
<i>Gen.</i> Fleur du soleil. little sunflower.	—	—	c.
<i>apenninus.</i>	—	—	d.
<i>guttatus.</i>	—	—	c.

660. *TILIA* europaea. Lindenbaum. tilleuil.
 linden-tree, lime-tree. *L. m. m.* 374.
BLACKW. 469. (Fl. *DAN.* 533. *REGNAULT.*) — — — IV. 976. a. c.

2. Fl. hexapetali.

668. *THEA* bohea. Theestrauch. thé. thea-
 plant; thee. *L. m. m.* 375. *BLACKW.*
 351. 352. (*LINN.* amoen. acad. VII.
 p. 239. t. 4.) — — — 972. c.
viridis. — — — — — d.

3. Fl. decapetali.

655. *BIXA* orellana. Orleanbaum. roucouyer;
 roucou. arnotta. *L. m. m.* 373. (*orleana*
terra Ph. BROWN. JAM. p. 254. *COM-*
MEL. hort. Amstelod. T. I. p. 65. f. 33.
vrucu PISO. h. nat. Ind. p. 133. *vruca,*
arnotto SLOANE Jam. T. II. tab. 181. f. 1.
galuga f. pigmentaria RVMPH. Amb.
 T. II. p. 79. tab. 19. *Manillensibus au-*
dit atchioté. SONNERAT nouv. Guinée.
p. 29. tab. 13. elegantifs. et accuratifs.
figura est. REGNAULT.) — — — III. 772. a.

4. Fl. polypetali.

653. *NYMPHAEA* alba. Weiße Seebiume.
 nenufar blanc. water-lily. *L. m. m.*
 372. *BLACKW.* 498. a. b. 499. — — — 761. a. b.
lutea. gelbe Seebiume. BLACKW. 497. — — — e.

Ord.

Ord. II. DIGYNIA.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

678. PAEONIA officinalis. Pfingstrose, Gicht:

rose. pivoine. peony. <i>L. m. m.</i> 378.	IV. 776.
<i>a. foemina. BLACKW.</i> - - -	777. b.
flore pleno rubro. - - -	779. a.
fl. pleno variegato. - - -	— b.
<i>b. mascula. BLACKW.</i> 245. - - -	[776. b. 778. b.
flore albo. - - -	776. a.
fl. incarnato. - - -	[— b. 777. a.
fl. pleno. - - -	778. a.

Ordo III. TRIGYNIA.

681. DELPHINIVM consolida. Rittersporn.

pie d'alouette. larkspur. <i>L. m. m.</i> 379.	
<i>BLACKW.</i> 26. (consolida regalis f. calcatrippa Ph. Verchenflaue. Fl. <i>DAN.</i> 683. <i>REGNAULT.</i>) - - -	II. 408. a.
varietas: flore rubro. - - -	411. d.
<i>aiacis. delphinette royale.</i> - - -	409. d.
<i>a. flore coeruleo simplici et pleno.</i> - - -	408. b.
<i>b. fl. albo simplici et pleno.</i> - - -	409. b.c.
<i>c. fl. rubro simpl. et pleno.</i> - - -	[410. abc. 411. a.
<i>d. fl. saturato purpureo simplici.</i> - - -	411. b.
<i>e. fl. purpureo striato.</i> - - -	408. c.
<i>f. fl. cinereo punctato.</i> - - -	— d.
<i>g. fl. virescente pleno.</i> - - -	409. a.
<i>laticaulis monstrosa.</i> - - -	411. c.
<i>staphisagria. Läusekraut.</i> l'herbe aux poux.	
fiaves agre. <i>L. m. m.</i> 380. <i>BLACKW.</i> 265.	
(<i>staphis agria Ph. REGNAULT.</i>)	IV. 949. a.

682. ACO-

682. **ACONITVM** napellus. Blauer Eisenhut, aconit. blue monkshood. *L. m. m.* 381. *BLACKW.* 561. (napellum Ph. Sturm; hut. *JACQVIN.* fl. Austr. tab. 381. *J. MILLER.* *REGNAULT.* le napel. *STOERK.* de aconito etc. tab. 3.) — I. 22. a.
 commarum. — — — — 21. d.
 anthora. l'anthora. wholesome wolfsbane. *L. m. m.* 382. *BLACKW.* 582. (anthora Ph. *JACQVIN.* Fl. Austr. t. 382. *MILLER.* t. 12. *REGNAULT.*) — — — — 22. b.
 lycoctonum. Gelber Eisenhut; Wolfstod; Welfemurzel. tue-loup yellow wolfs bane. — (23. b.
BLACKW. 563. — — — — (24. a. b.
 varietas: floribus pallidioribus. — 24. c.
 pyrenaicum. — — — — 23. a.

Ord. V. PENTAGYNIA.

684. **AQVILEGIA** vulgaris. Aigley, colombine; l'ancolie. *L. m. m.* 384. *BLACKW.* 409. (Fl. *DAN.* 695. *REGNAULT.* *J. MILLER.* I.) 160.
 varietas: 1. filuestris subpurpurea. — 161. a.
 2. fl. coeruleo oris luteis sibirica. — 160. a.
 3. hortensis simplex rubra et incarnata. — (160. c.
 coerulea. — — — — 162. b.
 alba. — — — — (161. b.
 — — — — (162. a.
 variegata. — — — — 163. b. c.
 stellata fl. simplici albo. — 164. c.
 fl. multiplici purpureo et incarnato. — — d.
 4. inuerso nectario multipli-
 ci coe-

Genus.

Tom. Tab. Lit

ci coeruleo, albo, rubro, { 162. c.
 purpureo - fusco. - - { 163. a.
 { 164. a, b.

685. *NIGELLA*. stativa. Nardensaame. nille. fennel flower. L. m. m. 385.

BLACKW. 559. (*MILLER.* 187. f. 1.

REGNAULT.) - - III. 757. b.

damascena. Schwarzer Kummel; Schabab. flore albo et coeruleo. - - c. d.

hispanica. *BLACKW.* 558. fl. albo et coeruleo. - { - e.
 { 758. b.

orientalis. Gelber G. - - - 758. a.

Ord. VII. POLYGYNIA.

688. *DILLENIA* indica? Doeriana *WEINM.*

(*RUMPH.* Amb. II. t. 46?) - II. 468.

611. *ILLICIVM* anisatum. Sternanis. anisum stellatum. somo, vulgo skimmi,

KAEMPFER. amoen. exot. t. 881. (anisum sinense, semen badian. Ph. *CLVS.*

hist. pl. rar. lib. VI. c. 25. Arbor cre-

scit in China, Japonia et insulis Philippinis, detecta etiam in Florida species pa-

rum ab hac diuersa. V. *ELLIS* in phi-

los. transact. Vol. 60. p. 524. tab. 12.

STORK descript. of East-Florida. p. 17.) I. 138. b.

anisilignum. *POMET.* p. 150. anisum Moluc-

canum. Camelan. *VALENT.* Amboin. III.

arbor plane ab illa diuersa. - - III. 649. b.

689. *LILIODENDRON* tulipifera. Tulpen-IV. { 997. b.
 { 998. .

bau n. tulip-tree. - -

693. *ANEMONE* coronaria. Anemone. ane-

mone. wind-flower. - - I. 124-125.
 variet.

Genus.

Tab. Tom. Lit.

variet. 1. flore simplici carneo.	- -	-	{121. d. 123. d.
variegato.	- -	-	{122. a. 124. b.
purpureo-nigricante.		-	{123. b. 128. b.
2. flore femipieno.	-	-	125. a.b.
pleno rubro.	-	-	{119. abc. 120. bcd.
albo.	-	-	123. a.
ex albo et rubro variegato.		-	{121. abc. 122. a. b. 124. a. b. 125. abc. 120. abc. 125. d.
violaceo.	-	-	
3. degener flore viridi.	-	-	122. d.
hortensis. Gartenanemone.	-	-	{127. b. 128. c.
palmata.	- - -	-	{126. c. 127. a.c. 128. a.
filicifris. Wilde, Waldanemone; wildes Wind- röslein. l'anemone sauvage.	-	-	118.
nemorosa. Weiße Waldanemone. wood ane- mone. (Fl. DAN. 549.)	- -	IV.	856. abc.
variet. flore rubro simplici et pleno.		- -	i.k.m.
ranunculoides. (Fl. DAN. 142.)	- -	- -	d.g.h.
variet. foliis variegatis.	- - -	- -	e. f.
pulsatilla. Rükenschelle. coquelourbe.		-	839. c.
variet. rubra; viridis limbo rubro.		- -	b. d.
pratensis.	- - -	- -	a e.f.
patens.	- - -	-	838. d.
hepatica. Leberblume; Edelheberfraut. l'hepati- que des jardins. noble liverwort. L. m. m.			
388. BLACKW. 207.			

a. flore

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- a. flore coeruleo, albo, purpureo, incarnato.* - - - - III. 570. abce.
- b. flore pleno coeruleo purpureo.* - - - - d. f.
696. CLEMATIS erecta. L. m. m. 391.
(flammula Jouis Ph. JACQVIN Fl. Austr.
tab. 291. STOERCK de flam. Jouis. tab. 1.) II. 394. a.
vitalba. Gemeine weiße Waldrebe. herbe aux
gueux; clematide. viorna; climber. - - 393.
viticella, flore simplici et pleno. - - 398. b. d.
integrifolia, blue climber. - - - - a.
cirrhosa. - - - - - - c.
697. THALICTRUM foetidum. Wiesen-
raute. pigamon. meadow rue. - IV. 971. c.
flauum; et speciosum flauum. - - { - a.
- - 970. a.
simplex. (Fl. Dan. 244.) - - 969. d.
lucidum. - - - - 971. b.
cornuti. - - - - 854. b.
minus. (SEGV. ver. 476. t. 11.) - - 970. c. d. e.
angustifolium. - - - - 971. d.
aquilegifolium. - - - - 970. b.
698. ADONIS vernalis. Frühlingsadonis.
BLACKW. 504. - - I. 28. a.
aestivalis *a. flore phoeniceo.* - - 27. d.
b. flore carneo: pheasants-eye. - - 28. d
c. flore citrino. - - - - b. e.
auctumnalis, flore atrorubente, cum varietatibus. - - 27. bce f.
699. RANUNCULUS. Hahnenfuß. renou-
cle; grenouillette. buttercups; crow-
flower. - - - -
flammula. (Fl. DAN. 575. flammula Ph.) IV. 854. d. e.
lingua. - - - - - - c.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

amplexicaulis.	-	-	-	—	856. l.
ficaria. Kleine Schmalbenwurzel; Feigwurzengraut. P'eclairette; petite scrofulaire. pilewort. <i>L. m. m.</i> 392. <i>BLACKW.</i> 51. (chelidonium minus <i>Ph. Fl. DAN.</i> 499.)				II.	366. b.
a. flore multiplici.	-	-	-	—	c.
b. degener.	-	-	-	—	d.
auricomus.	-	-	-	IV.	857. a.
sceleratus. renonce des marais. <i>BLACKW.</i> 259. (ranunculus palustris <i>Ph. Fl. DAN.</i> 571. <i>REGNAULT.</i>)				—	853. d.
varietas: monstrosa, laticaulis.	-	-	-	—	e.
illyricus.	-	-	-	—	852. g.
aconitifolius; varietas: flore pleno.	-	-	-	—	857. d.
asiaticus, cum varietatibus.	-	-	-	[I. 126. c. IV. 849-852.	
a. flore semipleno.	-	-	-	—	849. a.
b. fl. pleno, albo.	-	-	-	—	{ — d. 850. a. 851. c.
c. fl. pleno rubro.	-	-	-	—	{ 849. c. 852. abc.
d. fl. pleno flauo.	-	-	-	—	{ 849. b. 850. b. 852. e. f.
e. fl. pleno variegato.	-	-	-	—	{ 850. c. e. 851. b.
f. fl. pleno roseo.	-	-	-	—	{ 851. a. 852. d.
g. pleno purpureo-violaceo.	-	-	-	—	850. d.
bulbosus. (<i>Fl. DAN.</i> 551. <i>J. MILLER.</i>)				—	858. c.
repens. <i>BLACKW.</i> 31.	-	-	-	—	857. b.
polyanthemos.	-	-	-	—	858. a. b.
platanifolius. (<i>Fl. DAN.</i> III.)	-	-	-	—	857. c.

acris.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- acris. (ranunculus pratensis Ph. *Feldbahnen*
fuß.) — — — — f.
varietas: flore pleno. — — — e.
lanuginosus. (Fl. *DAN.* 397.) — — 858. d.
muricatus. (palustris echinatus C. *BAVH.*) — 854. a.
hederaceus. (Fl. *DAN.* 321.) — — 853. a.
aquatilis; peucedani folio. renoncle d'eau.
(Fl. *DAN.* 376.) varietas: laciniis pendulis. — [806. c.
853. c.]
700. *TROLLIUS* europaeus. Buterblume.
globe - flower. *BLACKW.* 505 - 508.
(Fl. *DAN.* 133.) — — II. 569. d.
702. *HELLEBORUS* niger. Niesswurz,
• Christblume. ellebore noir. black helle-
bore. L. m. m. 393. *BLACKW.* 509 -
512. (melampodium Ph. *SCHMIDEL.*
icon. plant. et anal. part. Tab. VI. p. 26.
JACQVIN. Fl. Austr. tab. 201. Vol. 3.
p. 1. *REGNAULT.*) — — III. 569. c.
viridis. Schwarze Niesswurz mit grünen Blu-
men. (*JACQVIN.* l. c. tab. 106. Vol. 2. p. 4.
REGNAULT. l'ellebore à fleur verte.) — — b.
foetidus. Stinkende Niesswurz. pied de grif-
fon. bears foot. L. m. m. 394. *BLACKW.* 57.
(helleborastrum Ph. helleboraster maximus;
GESNER et *LOBEL.* p. 679. *REGNAULT.*) — — a.
hiemalis. Gelbes Wolfskraut. winter aco-
nite. *BLACKW.* 576. — — — c.
703. *CALTHA* palustris. Schmalz, Des-
terblume. fouci d'eau. marsh marigold. II. 285. d.
varietas: flore pleno. — — — e.



C L A S S I S XIV.

DIDYNAMIA.

ORDO I. GYMNOSPERMIA.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

2. Calyce subquinquefido.

705. **AIVGA** reptans, flore coeruleo. *Srie*
chendes Heilfraut. Gänsef. bugle. — 407. a.
 variet. flore rubro; carneo; albo. - — — def.
pyramidalis. L. m. m. 395. BLACKW. 64. (con-
solida media f. bugula Ph. Fl. DAN. 185.) — — b. c.
706. **TEVCRIVM** fruticans. *Staudichter*
Gamander. germandrée en arbre, tree
germander. (DILLEN. elth t. 284. f. 366.) IV. 969. c.
latifolium. - - - - - — — b.
botrys. - - - - - II. 361. g.
chamaepitys. Schlagkraut. l'ivette. ground-
pine. L. m. m. 396 (chamaepitys Ph. Fl.
DAN. 733. REGNAULT.) - - - 365. a.
marum. L. m. m. 398. BLACKW. 47. (marum
verum s. syriacum Ph. LINNE diss. de ma-
ro. RIVIN. monop. irreg. tab. 23. REG-
NAULT.) - - - III. 702. c.
scorodonia. BLACKW. 9. (Fl. DAN. 485.) (IV. 907. b.
 (II. 399. g.)
scordium. Lachenknoblauch. le scordium; ger-
mandrée aquatique. water germander. L.
m. m. 399. BLACKW. 475. (scordium Ph.
Fl. DAN. 592. REGNAULT.) - IV. 907. a.
chamaedrys. Gamander. chenette; la petite
chêne. garmander. L. m. m. 400. BLACKW.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

180. (Fl. DAN. 448. REGNAULT. chamaedrys Ph.) a. fl. purpureo - carneo. II. 361. b. e.
 b. fl. albo et albescente. — — — c. d.
 c. fol. verrucosis. Veronica chamaedrys? — — — f.
 montanum. Bergpolei. mountain - poley.
 BLACKW. 456. — — — IV. 822. f.
 polium. Gelber Polei. Yellow poley. L. m.
 m. 401. BLACKW. 419. — — — e.
707. SATVREIA hortensis. Gartensaturei.
 la farriette. savoury. (REGNAULT.) — 385. e.
 montana. Bergsaturei. BLACKW. 318. — — d.
709. HYSSOPVS officinalis. Jsep. l'hysope. L. m. m. 403. BLACKW. 296. (JACQVIN. Fl. Austr. 254. REGNAULT.) flore coeruleo. — — — III. 591. e.
 flore albo et rubro. — — — — d. f.
 nepetoides. (JACQVIN Hort. Vind. 69.) — 725. e.
710. NEPETA cataria. Katzenmünze. catatre.
 catmint; nep. L. m. m. 404. BLACKW. 455. (Fl. DAN. t. 583. REGNAULT.) — 724. e.
 italica. Kleine Katzenmünze. — — — — d.
 tuberosa. — — — — — b.
711. LAVANDULA spica. Lavendel, Spise.
 la lavande femelle. lavande. L. m. m. 405. BLACKW. 294. 295. (GARIDEL plantes d'Aix. tab. 60. Hort. Roman. T. III. t. 72. REGNAULT.)
 a. angustifolia (quae efficacior habetur). — — — 632. c.
 b. latifolia fl. coeruleo & albo. — — — d. c.
 multifida; fl. coeruleo & albo. — — —

Genus.	Tom. Tab. Lit.
stoechas. Arabischer Lavendel. stoechas. <i>L. m. m.</i>	
406. <i>BLACKW.</i> 241. (<i>REGNAULT.</i>)	IV. 950. a. b.
dentata. - - -	— — c.
712. <i>SIDERITIS</i> cretica. Gliederfraut. cra-	
pau dine. iron - wort. - -	IV. 830. d.
hyssopifolia. - - -	— 919. a.
713. <i>MENTHA</i> crispa. Krausemünze. men-	
the frische. mint. <i>L. m. m.</i> 409. <i>BLACKW.</i>	
290. (<i>RIVIN.</i> monop. irreg. t. 50.)	III. 724. c.
silvestris. Wilde Münze. mentha stre. curked-	
mint; horse - mint. <i>L. m. m.</i> 408. <i>BLACKW.</i>	
292. (Fl. <i>DAN.</i> t. 484.) - -	— — d.
aquatica. Wassermünze. menthe aquatique. wa-	
ter - mint. <i>BLACKW.</i> 32. - -	— — b.
fatua. - - -	— — a.
viridis. - - -	— 725. a.
arvensis. Kleine Ackermünze. <i>BLACKW.</i> 131.	
(Fl. <i>DAN.</i> 512.) - - -	IV. 838. a.
Planta Tab. 280. T. II. depicta, varietas videtur melissae.	
ceruina. <i>BLACKW.</i> 304. - -	— — b.
pulegium. Pölei. le pouliot. penny - royal.	
<i>L. m. m.</i> 411. <i>BLACKW.</i> 225. (pulegium	
Ph. <i>REGNAULT.</i>) - - -	— — c.
714. <i>GLECOMA</i> hederacea. Erdepheu,	
Gundermann. le lierre terrestre. ground-	
ivy. <i>L. m. m.</i> 412. <i>BLACKW.</i> 225. (he-	
dera terrestris Ph. <i>REGNAULT.</i>)	III. 564. b. c. d.
716. <i>LAMIVM</i> album. Taube Nessel. l'or-	
tier blanche. white dead nettle; archan-	
gel. <i>L. m. m.</i> 413. <i>BLACKW.</i> 33. (Fl.	
<i>DAN.</i> 523. <i>REGNAULT.</i>) - -	— 621. d.

a. variet.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

a. variet. flore purpureo. *BLACKW.*182. - - - — 529. *a.**b.* folio variegato. - — 621. *e.*purpureum, Rothe Nessel. *BLACKW.* 182. *I.* — 529. *d.*amplexicaule. - - - — — *b.*oruala. - - - — 622. *c. d.*laeuigatum. - - - — — *e.*717 *GALEOPSIS* *ladanum.* Razengesicht,

kleine Hanfnessel. hemp - nettle. flore

purpureo, albo. - - — 621. *a. b. c.*tetrahit; flore rubro, maiore. - *II.* 301. *a.*varietas: *a.* fl. albo, pallido, variegato. { — 299. *a.*
— 300. *b. c.*
{ *III.* 712. *b.**b.* fl. luteo, labio purpureo. *II.* 300. *a.**c.* rubra, minor, fol. rotundioribus. - - — 301. *b.**galeobdolon.* Gelbe taube Nessel. l'ortie morte à fleur jaune; *galeopsejaune.* yellow nettle hemp. - - - *III.* 622. *a. b.*718. *BETONICA* *officinalis.* Bethonie. beto-toine. betony. *L. m. m.* 414. *BLACKW.*46. (Fl. *DAN.* 726. *REGNAVL.*) *I.* 243. *b.*varietas: *a.* flore albo. - — — *a.**b.* degener morbosa. - — — *c.**c.* hirsuta. - — — *d.*719. *STACHYS* *filuatica.* Bienensaug, grosse

sinkende taube Nessel. stachide du bois.

hedge - nettle. *L. m. m.* 415. *BLACKW.*34. - - - - - *IV.* 948. *a.**palustris.* - - - - - — — *b.**germanica.* Deutsche Rosspolei. epi fleuri*BLACKW.* 273. - - - — 947. *d.**cretica.* - - - — 948. *c.*

Genus.

Tab. Tom. Lit.

annua.	-	•	•	•	-	-	—	919. b.
recta.	-	-	-	-	-	-	—	c. d.

720. **BALLOTA** nigra. Schwarzer Andorn,
Ballote. marrube noir; ballote. stinking
hore-hound. *BLACKW.* 136. flore pur-
pureo et albo. - - - III. 711. b. c.

721 **MARRVBIVM** vulgare. Andorn. mar-
rubier blanc. white hore-hound. *L. m. m.*
416. *BLACKW.* 136. (marrubium al-
bum Ph. *REGNAULT.*) - - - 710. a.

candidissimum. - • - - { III. 709. c.
710. d.
II. 462. b.

peregrinum. - • - - III. 709. d.

supinum. - - - - - 710. c.

hispanicum. - - - - - — — b.

africanum. (*PLUKN.* 242. t. 306. fig. 2.) — — c.

acetubulosum. - - - - - II. 462. c.

722. **LEONVRVS** cardiaca. Herzgespan.
agripaume; cardiaque. motherwort. *L. m.*
m. 417. *BLACKW.* 171. (Fl. *DAN.* t.
727. *REGNAULT.* Cardiaca Ph.) — 307. a.

marrubiastrum. Böhmischer Löwenschwanz. III. 709. c.

723. **PHLOMIS** leonurus. Löwenschwanz.
lions-tail. - - - — 640. a.

fruticosa. bouillon sauvage; fange en arbre.

Jerusalem sage. - - - IV. 380. c.

purpurea. - - - - - III. 711. a.

lychnitis. - - - - - IV. 947. c.

724. **MALVCELLA** laevis. Herzkraut.
melisse de Moluques; la Moluque. III. 720. c.
spinosa. - - - — — b.

b. calice bilabiato.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

725. **CLINOPODIVM** vulgare. *Birbel-*
 doff. grand basilic sauvage. great wild -
 basil. - - - II. 399. b. c. d. h.
726. **ORIGANVM** vulgare. *Grosser Wohl-*
 gemut; *Doffen.* l'origan sauvage; ma-
 joraine des champs. wild majoran. *L.*
m. m. 420. *BLACKW.* 280. (*Fl. DAN.*
 638. *Hort. ROMAN. T. III. tab. 75. RE-*
GNAVL.) - - - III. 772. c. f.
heracleoticum. - - - — — b.
dictamnus. *Kretischer Diptam.* le dictame de
 Crete, dittany of Crete. *L. m. m.* 418.
BLACKW. 462. (*dictamnus creticus Ph.*
REGNAVL.) - - - II. 462. a.
sipyleum. - - - III. 772. e.
creticum. *L. m. m.* 419. - — 773. c.
finyrnaeum. - - - — 772. d.
maru. - - - — 691. b.
maiorana. *Majoran.* marjolaine. sweet ma-
 joran. *L. m. m.* 421. *BLACKW.* 319. (*ma-*
iorana. Ph. REGNAVL.) - — — c.
727. **THYMVS** vulgaris. *Thymian.* thyme
 commun. tyme. *L. m. m.* 423. *BLACKW.*
 211. (*REGNAVL.*) - - - IV. 975. d. e. f.
serpyllum. *Quendel,* wilder Thymian. fer-
 polet, mother of tyme. *L. m. m.* 422.
BLACKW. 418. (*REGNAVL.*) - — 916. c. e. g. h.
varietas: a, flore albo. - — — f.
b, foliis variegatis. - — — d.
acinos. *Steinpolei,* basilic sauvage. - II. 399. a.
alpinus? - - - — — e.
mastichina. - - - III. 712. d.
tragoriganum. - - - IV. 978. d.

Genus.

Tab. Tom. Lit.

- cephalotus. - - - - - 975. c.
728. MELISSA officinalis. Herzkraut, Melisse, Bienenkraut. melisse, citronelle. balm-gentle. *L. m. m.* 424. *BLACKW.*
27. (melissa citrina Ph. *REGNAULT.*) III. 719. a.
- grandiflora. Bergmünze. *BLACKW.* 166. — [280. c.
281. a.
- calamintha. Feldmünze, Kalaminte. le calamint. common. calamint. *L. m. m.* 425. *BLACKW.*
167. (calamintha montana, Bergmünze Ph. calamentha *RIVIN.* irreg. monop. tab.
46. In Anglia substituitur melissa nepeta pro [280. d.e.
vsu medico) - - - - - [281. b.c.
- nepeta. - - - - - 280. b.
729. DRACOCEPHALVM virginianum. Virginischer Drachenschpf. dragon's head. — [464. d.
470. f.
- canariense. *L. m. m.* 426. (experimenti causa olim *LINNE* melissam canariensem illius loco proposuit.) - - - - - 470. g.
- austriacum. - - - - - III. 591. c.
- ruyschianum. (Fl. *DAN.* 121.) - II. 365. b.
- canescens. - - - - - III. 719. b.
- moldauicum. Türkische Melisse. melisse de Moldaue. *L. m. m.* 427. *BLACKW.* 551. flore coeruleo. (melissa turcica Ph.) - — — d. c.
- varietas: foliis variegatis. - — 720. a.
731. MELITTIS melissophyllum. Immens blat; falsche Melisse. melisse des bois. bastard balm. (melissophyllum Ph. *JACQVIN.* Fl. Austr. t. 26. *REGNAULT.* J. *MILLER.*) - - - - - d.
732. OCYVM basilicum. Basilie. le basilic. basil. *BLACKW.* 104. *L. m. m.* 428. [762. a-e.g.
(basilicum Ph. *REGNAULT.*) - — [763. a-d.
a. viride,

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|
| <i>a. viride.</i> | - | - | - | - | 763. d. |
| <i>b. maximum caryophyllatum, rubrum.</i> | - | - | - | - | 762. e. |
| <i>c. crispum.</i> | - | - | - | - | b. |
| <i>d. bullatum.</i> | - | - | - | - | a. |
| <i>e. maculatum.</i> | - | - | - | - | 763. a. |
| <i>monachorum.</i> | - | - | - | - | 762. f. |
| <i>minimum.</i> | - | - | - | - | 763. e. |
734. SCVTELLARIA galericulata. Helm-
fraut. la centauree bleue; la toge.
willowherb; skull-cap. BLACKW. 516.
(tertianaria Ph. et J. BAVH. hist. plant. [II. 499. b. ?
T. III. p. 2. pag. 435. Fl. DAN. 637.] — [IV. 909. d.]
735. PRVNELLA vulgaris. Braunheil,
Brunelle. la brunelle. selfhead. L. m. m.
429. BLACKW. 24. (REGNAULT,) I. 268. a.
grandiflora. - - - - - b.
varietas: angustifolia - - - - - c.
laciniata, flore rubro et albo. - - - - - d. e.

Ord. II. ANGIOSPERMA.

1. Calyce bifido.

779. OROBANCHE maior. Commerwur-
zel. broom rape. - - - - - III. 774. b. c.
laevis. - - - - - d.
ramosa. - - - - - e.

793. ACANTHVS mollis. Bärenklaue.
acanthé, blanc - urfine. bear's - breech.
BLACKW. 89. - - - - - I. 13. a.
spinosus? l' acanthé sauvage. - - - - - b.

2. Calyce quadrifido.

740. RHINANTHVS crista galli. Hahnen-
kamm; gelbes Häusekraut. cock's comb;
yellow rattle. - - - - - IV. 800. c.
varietas: folio variegato, - - - - - b.
741. EV-

741. *EUPHRASIA officinalis*. Augentrost.Peuphraise. eyebright. *L. m. m.* 436.*BLACKW.* 427. (*REGNAULT.*) II. 499. a.

odontitis. Rother H. red eye-bright. — — c.

lutea. — — — — d.

742. *MELAMPYRUM arvense*. Rühweiz

gen. cow-wheat. — — III. 716. a.

cristatum, flore albo et rubro. — — c. d.

nemorosum. (*Fl. DAN.* 305.) — — b.fluaticum. (*Fl. DAN.* 145.) — 717. a.745. *LANTANA camara*, flore coccineo.

American viburnum. — — IV. 1007. d.

varietas, flore flavo. — — b.

odorata. — — — — c.

aculeata. (patria America meridion.) — { — a.
1006. f.

3. Calyce quinquesido.

746. *PEDICULARIS palustris*. Häusekraut,Rodel. pediculaire. lousewort. *L. m. m.*

431. — — — — — 800. d.

750. *ANTIRRHINUM maius*. Halsnase.muse de veau. muzzle of calf; the greater snap dragon. I. { 144.
145.

varietas: a. flore pallido, ore rubro. — 144. b.

b. flore albo, ore luteo. — 145. a.

c. flore rubente, rictu cinereo. — 144. a.

d. flore rubente, rictu flavo. — 145. b.

orontium. flore rubro, albo, carneo. — 143. a. b. c.

bellidifolium. — — — III. 664. d. c.

asarina. — — — I. 169.

cymbalaria. Zimbalkraut. cimbalaire. ivy leaved toad flax. — — — III. 665. a.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

elatine. (Fl. DAN. 426.) BLACKW. 170. II. 476. b.
 spurium. Gelber Ehrenpreis. la velvotte fem-

melle. - - - - - — — a.

triphylum. - - - - - III. 666. k.

trionithophorum. - - - - - — — e.

monspefulanum. - - - - - — — f.
 665 b.

bipunctatum. - - - - - — — c.

purpureum. - - - - - — 666. c.

pelisserianum. - - - - - — — g.

linaria. Gelbes Leinfrant. lin sauvage, lineaire.

common yellow toad-flax. L. m. m. 432. — [665. f.

BLACKW. 835. (linaria Ph. REGNAULT.) — [666. b.

supinum. - - - - - — — h.

saxatile. - - - - - — — i.

minus. (Fl. DAN. 502.) - — 665. d.

dalmaticum. - - - - - — 666. e.

genitifolium. - - - - - — 665. e.

varietas: flore pallido lineis violaceis. — 664. e.

chalepense. (RIVIN. irreg. mon. 80. f. 2.) — 666. a.

756. SCROPHULARIA nodosa. Brauns

wurzel. scrofulaire. figwort. L. m. m.

434. BLACKW. 87. (scroph. vulgaris Ph.

RIVIN. irreg. mon. t. 107.) - IV. 908. a.

aquatica. betoine d'eau, herbe du siege. L.

m. m. 435. BLACKW. 86. (betonica aqua-

tica Ph. Fl. DAN. 507. REGNAULT, Hort.

ROM. T. II. t. 89.) - - - — — b.

scorodonia. - - - - - — — c. d.

vernalis. (Fl. DAN. 411.) - — 909. a.

trifoliata. - - - - - — — b. c.

758. DIGITALIS purpurea. Fingerhutfrant.

digitale. foxglove. BLACKW. 16. (Fl.

DAN. t. 74. REGNAULT. Nouam de-

scriptio-

scriptionem et delineationem plantae nuperrime dedit : Dr. Will. *WITHERING*, account of the foxglove. Birmingham.

1785. 8. multaue de illius egregio usu — [463. c.
contra hydropem differuit.) — [464. a. c.

varietas: flore albo. — — — 463. b.

lutea. — — — — — a.

ambigua. — — — — — d.

ferruginea. — — — — 464. b.

759. *BIGNONIA* radicans. Rother Jasmin.

Trompetenblume. jasmin de Virginie. trumpet-flower. — — — III. 530. c.

762. *CRESCENTIA* guanabanus. Kürbſen,

Flaschenbaum. *MUNT.* t. 24. fig. aliena.

LINNEI crescentia ab hac prorsus differt,

quam *WEINMANNUS* ex *MINTINGIO*

exhibuit, cuius habitus cucurbitinam plantam refert. Figura desumpta videtur ex

BONTII hist. natur. Ind. Orient. opere

posthumo in *Pisonis* hist. Indiae vtriusque.

Amstelod 1658. fol. p. 156. qui

quanambanum Africanum nominat. (cf.

JACQVIN sel. stirp. Americ. hist. 86.

BROWN. Jamaic. 1. - 3. p. 65. *SLOANE*

Jam. II. p. 172. *PLUKN.* alm. 124 t. 171.

f. 2. *PLUM.* g. 23. f. 109. Gallis dicitur:

crescentia cuiete, calebassier f. cucurbitifera.) — — — — 561. a.

782. *SESAMVM* indicum. Sesamfrut. oily

grain. *Lam.m.* 437. (confundi non debet

cum orientali, utroque in Arabia et Aegy-

pto culto, quorum semina oleum largiun-

tur, ad domesticum usum constitutum.

v. *FORSKÆL* Fl. Aegypt. Arab. p. 113.) IV. 918. a.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

1237. **AVICENNIA** tomentosa. anacardium orientale Ph. an Semecarpus Avicennia L. suppl. 182? vel Bontia germinans? (*JACQVIN*. fel. stirp. Amer. hist. p. 88. tab. 261. f. 46. *BROWN*. Jam. I. p. 263. Donatia *LOEFL*. Hispan. 193. Mangle *SLOAN*. Jam. I. p. 61. Oepata *RHEED*. Hort. Malab. IV. p. 95. t. 45. Neutiquam fructus huius arboris esse anacardii Ph. nuces, vti praefestinatum *CAMMELLVS* es *LINNEVS* existimaverunt, *JACQVIN* l. c. ait. Crescit in Caribaeis et vicina continente.) - I. 104.
790. **VITEX** agnus castus. Reuschbaum. l'agnus castus. chast - tree. L. m. m. 438. *BLACKW*. 139. (agnus castus Ph. *RE-GNAULT*. du *HAMEL* traité des arbres, T. II. t. 105.) - - - 30. b. c.
4. Flor. polypetalo.
795. **MELIANTHVS** maior. Honigblume.
melianthe.. honey - flower. - III. 717. c.
minor. - - - - - b.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

Ordo I. SILICVLOSAE.

a. Silicula apice emarginata.

798. **ANASTATICA** syriaca. Jerichorose.
rose de Jericho. - - - IV. 974. c.
801. LE:

801. **LEPIDIVM** sativum. Gartenkresse.
 cresson. garden cresses. *L. m. m.* 441.
BLACKW. 23. (nasturtium hortense Ph.
REGNAULT.) - - - III. 751. b.
 latifolium. Pfefferkraut. passerage. pepperwort.
BLACKW. 448. (Fl. *DAN.* 557.) - - - 641. a.
 rudérale. (Fl. *DAN.* 184.) - - - IV. 973. e.
 virginianum. - - - III. 752. d. f.
 iberis. *BLACKW.* 312. - - - IV. 973. d.
802. **THLASPI** aruense. Beseakraut. thlaspi.
L. m. m. 442. *BLACKW.* 68. - - - b.
 campestre. Baurensenf. thlaspi à larges filiques.
 country mustard. *BLACKW.* 407. - - - 974. h.
 perfoliatum. - - - - - d.
 bursa pastoris. Taschenkraut. tabouret; bourse
 à berger. shepherd's-burs. *L. m. m.* 443.
BLACKW. 5. (bursa pastoris Ph. Fl. *DAN.*
 729. *REGNAULT.*) - - - I. 274. b. d. g.
804. **IBERIS** semperuirens. iberiette. IV. 973. c.
 umbellata, flore rubro, purpureo, albo. - - - 974. e. f. g.
 amara. - - - - - 973. a.
 nudicaulis. (Fl. *DAN.* 323.) - - - I. 274. c.
 pinnata. - - - - - e.
805. **COCHLEARIA** officinalis. Köffelkraut.
 herbe aux cuillers. scurvy grass. *L. m. m.*
 445. *BLACKW.* 227. (cochlearia hor-
 tensis Ph. Fl. *DAN.* 100. *REGNAULT.*) II. 401. a.
 armoracia. Meerrettig. grand raifort sauvage.
 horse radish. *BLACKW.* 415. (raphanus
 rusticus s. armoracia Ph. *REGNAULT.*) I. 170. a.
 coronopus. ambrosiette. swine's cress. (II. 430. g.
BLACKW. 120. (Fl. *DAN.* 202.) (III. 752. e.
 glastifolia. - - - - - (II. 401. b.
 (III. 641. b.
 805. **ALYS-**

Genus.

Tom. Tab. Lit.

805. *ALYSSVM montanum*. Schilbbsesen:
 fraut. alisse de montagne. madwort. IV. 974. a.
 calycinum. - - - - - — 973. f.
808. *BISCVTELLA auriculata*. Doppels:
 schilb. buckler-mustard. - - - - - — 974. b.
 semperuirens. - - - - - III. 644. d. e.
 b. *Silicula integra, nec apice emarginata.*
796. *MYAGRVM paniculatum*. (Fl. *DAN.*
 204.) - - - - - IV. 918. b.
 fatium. Feindotter, kleiner Delsaamen. batard
 myagrvm. gold of pleasure. - - - - - — 862. c.
800. *DRABA verna*. Hungerblume. whit-
 low-grafs. - - - - - I. 274. a. f.
809. *LVNARIA annua*. Mondfraut, Sil-
 berblatt. grande lunaire. lunary, moon-
 wort. - - - - - III. 645. a. d.
 rediuiua; flore rubro. - - - - - — — c.

Ord. II. SILIQVOSA.

1. Calyx clausus, foliolis longitudinaliter conniuentibus. 3

811. *DENTARIA bulbifera*. Zahnkraut.
 dentaire. coralwort; toothwort. (Fl.
DAN. 361.) - - - - - II. 460. c.
 enneaphylla. - - - - - — — d.
814. *ERYSIMVM officinale*. Hederich, Weg-
 senf; gelbes Eisenkraut. velar; tortelle.
 hedge mustard. *L. m. m.* 450. *BLACKW.*
 28. (*REGNAVL.* Fl. *DAN.* 560.) — 487. a.
 barbaraea. Barbarakraut. herbe de S. Barbe.
 winter cressies; rocket. (*REGNAVL.*) I. 230. b.
 cheiranthoides. - - - - - III. 645. b.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

alliaria. Knoblauchkraut. alliaire. *L. m. m.*451. *BLACKW.* 372. (alliaria Ph. *REGNAULT.*) - - - I. 37. b. c.815. CHEIRANTHVS cheiri. Geyfoie, gelbe Veiel. giroflée jaune. wallflower. *L. m. m.* 852. *BLACKW.* 179. (cheiri Ph. *REGNAULT.*) - - - III. 646. c.

varietas: a. flore maximo. - - - a.

b. flore pleno. - - - b. d.

annuus; ruber, albus. - - - 642. e.

incanus; flore simplici. Straßburger Nelke.

girofler. *BLACKW.* 181. - - - d. g. h.

varietas: 1. flore pleno, albo. - - - 644. a. b.

2. flore coccineo, rubro, purpur. - - - 643. a. b. e.

3. flore mixto. - - - c. d.

erysimoides. (Fl. *DAN.* 229.) - - - 644. f.

817. HESPERIS tristis. Nachtwiole. mo-

untain rocket. - - - 571. a.

africana. - - - 644. c.

matronalis. Matronenblume, Pfingstviole. ju-

lienne. garden - rocket. - - - 571. b.

a. flore simplici albo - purpureo. - - - 572. b.

b. flore pleno albo, purpur. virescente. - - - 571. c.

572. a. c.

818. ARABIS alpina. Gänsefraut. bastard

tower - mustard. (Fl. *DAN.* 62.) IV. 918. c.

thaliana. - - - II. 470. c. e.

pendula. - - - a.

turrata. Thurnsenf. tower - mustard. - - - d.

820. BRASSICA orientalis. - - - I. 267. a.

II. 470. b.

campestris. Feldsohl. - - - I. 265. b.

arvensis. - - - III. 623. a. b.

napus

Genus.

Tom. Tab. Lit.

napus. *Stedkrube*. navet. cole-seed. *BLACKW.*224. 410. (*REGNAULT.*) - - - 746. a.
rapa; a. sativa rotunda. Rübe. rave. turnep.*BLACKW.* 231. - - - IV. 859. b.

b. sativa oblonga. - - - - a.

oleracea. Rüchensohl. chou. cabbage. I. 265. a.

a. viridis. Grüner Kohl. chou blond. - 260.

b. viridis cum venis rubris. chou rouge. - 259. a.

c. folio variegato. - - - 265. c.

d. capitata alba. Weißer Kopfsohl, Rabbis.

chou pomme, blanc. - - - 257.

e. capitata rubra. Rother K. chou pom-
me rouge. - - - 258.f. sabauda. Savoier Wirsing. chou
frisé blanc. - - - 261.g. fabellica, f. fimbriata. - - 262. a.
varietas: folio variegato. - - b.

h. botrytis. Blumensohl. chou fleur. IV. 911.

i. napobrassica. chou navet. - I. 263.

l. napo tuberosa. - - - 266. b.

m. caulorapa. Kohlrabe. - - 264.

eruca. Rause. roquette des jardins. rochet.

BLACKW. 242 (*REGNAULT.*) - IV. 862. a.822- *RAPHANVS* sativus; albus oblon-gus maior et minor. Rettich. raifort. { 860. a.e.
horseradish. L. m. m. 822. *BLACKW.* 81. - { 861. b.varietas: rotundus maior et minor. { 860. b.
Monatrettich. - - - { 861. a.

2. calyx hians, foliolis superne distantibus.

812 *CARDAMINE* pratensis. Wiesentresse,Gauchblume. cresson des Prés; cardami-
ne. ladies smok; cuckowflower. L. m.m. 447. *BLACKW.* 223. (*REGNAULT.*) III. 752. b. c.

813. *SISYMBRIVM nasturtium*. Brunnens
kresse. cresson de fontaine. water kresses.
L. m. m. 448. *BLACKW.* 260. (nastur-
tium aquaticum *Ph. Fl. DAN.* 690) {II. 483. a.
{III. 751. a.
- silvestre. (*Fl. DAN.* 409?) - {— — c.
{II. 482. a.
- amphibium, terrestre et aquaticum. — — c. b.
- sophia. Sophienkraut, Vesemkraut. sophie,
thalietre de fontaine. flix-weed. *BLACKW.*
440. (*Fl. DAN.* 528.) - - IV. 941. a.
altissimum. - - - - II. 447. b.
arenosum. - - - - III. 752. a.
819. *TVRRITIS glabra* Thurnsens. tower-
mustard. - - - I. 267. b.
821. *SINAPIS nigra*. Schwarzer Senf. se-
nevé, moutarde. common mustard. *L.*
m. m. 923. b. *BLACKW.* 446. (*RE-*
GNAVLT.) - - IV. 923. b.
- alba. Weisser Senf. moutarde blanche.
BLACKW. 29. - - - — 922. c.
- pyrenaica. - - - — 923. c.
- iuncea. - - - — 922. d.
- erucoides. - - - — — e.
- aruensis. - - - — 923. a.
824. *ISATIS tinctoria*. Waid. pastel, gue-
de. woad. *BLACKW.* 246. (*EBEL Ab-*
handlung vom teutschen Indigo. SCHRÖ-
BER.) - - - III. 614. a.
826. *CLEOME pentaphylla*. Stachelsenf.
(*JACQVIN. H. Vindob.* 24.) IV. 924. a.
violacea. - - - — — b.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

Ordo II. DECANDRIA.

Genus.	Tom.	Tab.	Lit.
832. GERANIVM Storchenschnabel. gerai-			
ne, bec de grüe. cranes bill. -	III.	535-545.	
fulgidum. - - - -	—	536.	a.
inquinans. - - - -	—	538.	a.
acetosum. - - - -	—	539.	e.
carnosum; glycirrhizaefolio <i>BVRM.</i>	—	—	d.
gibbosum? - - - -	—	—	a.
peltatum. - - - -	—	—	c.
zonale. - - - -	—	537.	a.
varietas: folio variegato. -	—	536.	b.
capitatum. - - - -	—	—	c.
vitifolium. - - - -	—	537.	b.c.d.
alchimilloides. - - - -	—	540.	f.
alceoides. - - - -	—	—	g.
odoratissimum. - - - -	—	538.	c.
grossularoides. - - - -	—	—	d.
cordiandrifolium. - - - -	—	539.	b.
myrrhifolium; flore magno. - -	—	540.	h.
prolificum. - - - -	—	541.	b.
auritum; longifolium. - - - -	—	—	c.
lobatum; pinnatifidum. - - - -	—	542.	a.
triste (noctuolens). - - - -	—	538.	b.
		541.	a.
anemones folio angustiore. <i>BVRM.</i>	—	535.	f.
folio latiore. <i>BVRM.</i> -	—	—	g.
cicutarium. bec de grüe ordinaire.	—	544.	c.
varietas: pimpinellæ folio. -	—	—	d.

Genus.					Tom.	Tab.	Lit.
romanum.	-	-	-	-	—	540.	b.
argenteum.	-	-	-	-	—	543.	d.
maritimum.	-	-	-	-	—	540.	a.
tuberosum.	-	-	-	-	—	—	d.
gruinum.	-	-	-	-	III.	544.	b.
ciconium.	-	-	-	-	—	—	a.
filuaticum. (Fl. <i>DAN.</i> 124.)					—	{ 540.	c.
						{ 543.	a.
palustre.					—	{ 540.	e.
						{ 543.	c.
fstriatum.					—	543.	f.
pratense. Gottesgnadenkraut. flore carneo,							
albo, variegato.					—	542.	b.d.e.
bohemicum.					—	543.	e.
robertianum. Ruprechtskraut. herbe à Robert.							
herbe Robert. <i>BLACKW.</i> 480. (Fl. <i>DAN.</i>					—	{ 544.	e.
694. <i>REGNAULT.</i>)						{ 545.	a.
dissectum. Daubensfuß. pied de pigeon.					—	545.	c.d.
rotundifolium. <i>BLACKW.</i> 56.					—	—	b.
fanguineum. Blutwurzel. bec de grüe sangui-							
naire. bloody cranesbill.					—	542.	c.
varietas : flore ftriato.					—	543.	b.

Ord. V. POLYANDRIA.

837. *SIDA* abutilon. gelbe Eibisch. guimau-
 ve jaune. Indian mallow. - I. 82. b.
 rhombifolia. - - - III. 616. g.
839. *ALTHAEA* officinalis Eibisch. gui-
 mauve. marsh mallow. *L. m. m.* 461.
BLACKW. 90. (Heilkraut. Fl. *DAN.* 530.
REGNAULT.) - - - I. 79. a.
 cannabina. - - - — 35. b.

'840. AL-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

840. *ALCEA* rosea. Gaert, Stodrose. la
rose tremiere. hollyhock. *L. m. n.* 462.
BLACKW. 54. (*malua arborea* Ph. *Herbst*;
rose. *MILLER REGNAULT.*)

varietas: a. flore simplici rubro.	III.	695.	a. c.
b. fl. simplici incarnato.	—	694.	c. e.
c. fl. rubro semipieno.	-	—	693. c.
d. fl. pleno albo.	-	—	694. a. b.
e. fl. pleno flauo.	-	—	695. d. e.
f. fl. pleno rubro et purpureo.	—	695.	b. c.
ficifolia.	-	-	— 694. c. f.

841. *MALVA* rotundifolia. la mauve. mal-
low. *L. m. m.* 463. *BLACKW.* 22. (Fl.
DAN. 721.)

filuestris. (<i>Wilder Eibisch</i> . <i>malua vulgaris</i> Ph. <i>REGNAULT.</i>)	-	-	— 697. b.
capensis; virgata.	-	-	— 692. c.
varietas: flore maiore.	-	1.	83. a.
bryonifolia.	-	-	— c.
crispa. mauve frisée.	-	III.	696. a.
mauritanica.	-	-	— b.
alcea. <i>Sigmarskraut</i> . mauve sauvage, alcée.	[I.	34. a. b.
vervain mallow. <i>BLACKW.</i> 309.		IV.	697. b.
varietas: flore albo, simplici, pleno.	I.	33.	c.
moschata. flore simplici et pleno.	-	—	— a. b.

842. *LAVATERA* olbia. - - - 35. c.
triloba. - - - 80. a.
trimestris; flore rubro et albo. - III. 697. d.
varietas: foliis subcordatis. - - 693. a.

843. *MALOPE* malacoides. - I. 35. a.

845. *GOSSYPIUM* herbaceum *Baumwols-*
lenstrauch. cotton. cottonbush. *L. m. m.*

Genus.

Tom. Tab. Lit.

464. *BLACKW.* 357. (*RVMPH.* Amboin. T. IV. p. 33. t. 12. Vtriusque Indiae et archipelagi Graeciae planta.) III. 551. f.
 barbadense. - - - - - = - e.
- 846 *HIBISCVS* syriacus. *Pappelbaum.* Sy-
 rian mallow. flore rubro et albo. I. 81. a. b. c.
 palustris. - - - - - - 80. b.
 rosa sinensis. - - - - - III. 693. b.
 mutabilis. - - - - - I. 34. c.
 sabdariffa. - - - - - III. 617. b.
 manihot. - - - - - - - a.
- abelmoschus. *Moschus saame.* ambrette, graine
 musquée. musk-seed. *L. m. m.* 465. (abelmo-
 schus. Ph. granum moschatum *RVMPH.* Am-
 boin. T. IV. p. 38. tab. 15. Quigombo prior f.
 alcea muscata *PISO* Ind. lib. IV. c. 45. p. 210.
 Frutex vtriusque Indiae, et Aegyptiae) I. 82. a.
 trionum. *Betterrose.* (Africa, vt et Italia, pa-
 tria est.) - - - - - - 36. b.
1344. *GORDONIA* lasianthus. (*ELLIS. CA-
 TESBT.* Yucca Brasil. manioc a qui-
 busdam vocata; cuius diuersae dantur
 species, quarum acida et dulcis notissi-
 ma est. Radix ab incolis Guianae yuc-
 cae dulcis commeditur; amara contra
 venenosa habetur. v. Salv. *GILI* saggio
 di flora naturale - de regni Spagnuole di
 terra ferma nell'America meridion. Ro-
 ma 1782. 8.) - - - - - IV. 1023. b.



CLAS-

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

Ordo II. HEXANDRIA.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

849. FVMARIA bulbosa. Hohlwurzel. pied de geline, fumeterre bulbeuse. great. hollow-root. <i>L. m. m.</i> 466. <i>BLACKW.</i>				
534 (aristolochia fabacea <i>Ph. Fl. DAN.</i>	II.	520. c. d.		
605. <i>REGNAULT.</i>) flore rubro et albo.		521. b.		
varietas: radice solida.	- - -	520. e.		
		521. a.		
semperuirens.	- - -	520. a.		
lutea.	- - -			b.
officinalis. Erdrauch, Daubentropsf. fumeterre. fumitory. <i>L. m. m.</i> 467. <i>BLACKW.</i> 227.				
(<i>REGNAULT.</i>)	- - -	519. c. e.		
clauiculata.	- - -	521. d.		
spicata.	- - -	519. d.		
vesicaria.	- - -	521. c.		

Ord. III. OCTANDRIA.

850. POLYGALA amara. Kreuzblume, Milchfraut. polygale. milk-vetch. (<i>COLLIN.</i> observ. T. II. p. 203. <i>VAILLANT.</i>				
Botan. Paris. 161. nr. 3. tab. 31. f. 2.) IV. 823. c.				
varietas: flore albo et rubro.	- - -			a. b.
vulgaris. (<i>Fl. DAN.</i> 516.)	- - -			e.
varietas: flore albo et rubro.	- - -			d. f.
bracteolata.	- - -			g.
chamaebuxus.	- - -	III. 361.		a.

Ord. IV. DECANDRIA.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

a stamina omnia connexa.

1286. ABRVS precatorius. Indianische ro:
the Erbsen. pois rouge, d'Inde. Angola
seeds. - - - IV. 819. a.
855. ERYTHRINA corallodendrum. Ro:
rallenbaum, coral-tree. - II. 425.
858. SPARTIVM iunceum. Spanischer Genst.
genêt d'Espagne. Spanish broom. III. 532. b.
varietas: flore pleno. - - - c.
monospermum. Einsamiger G. - - - a.
scoparium. Psriemenfraut. genêt sauvage, ou
à balais. common broom. BLACKW. 244.
(Fl. DAN. 313.) - - - 352. f.
scorpius. Scorpionenpsriemenfraut. - - 533. f.
859. GENISTA canariensis. Ginster. genêt.
broom. (rhodium lignum Ph. COM-
MEL, Hort. T. II. p. 103. tab. 52.) - - h.
sagittalis. Erdspsrieme. - - - 532. g.
tinctoria. Färbende Psrieme. genêt des teintu-
riers ou l'herbe à teintures. dier's weed,
greenweed. L. m. m. 471. - - 533. k.
anglica. - - - i.
860. ASPALATHVS genistoides. spar-
tium Africanum flore purpureo incar-
nato BURM. - - - 532. d.
albeps. genista laricis folio BURM. - - 533. e.
881. VLEX. europaeus, maior. Stechpsrie:
men, Hecksamen. genêt epineux; jone
marin. furze; gorze. - - - c.
minor. - - - d.
capensis. - - - 532. e.
861. AMOR-

Genus.

Tom. Tab. Lit

861. *AMORPHA fruticosa*. Unform. ba-
stard indigo. (patria est America.) — 547. c.
862. *CROTALARIA iuncea*. Klapperschotte. II. 439. b.
laburnifolia. (*BVRM.* Zeylan. 82. t. 35.) — — c.
863. *ONONIS aruensis*. Haubehel. ar-
réte - boeuf; bougrande. rest-harrow.
L. m. m. 472. *BLACKW.* 301. (resta
bouis Ph. praecipue illa quae spinis est
instructa. *REGNAULT.*) — — I. 140. a.
varietas: 1. flore rubro, albo. — — 141. b.
2. folio variegato. — — 142. b.
3. spinosa flore rubro, albo. — 141. a. c.
natrix. — — — — — 139.
864. *ANTHYLLIS vulneraria*. Wundkraut.
vulnenaire. lady's finger. — — 142. c.
tetraphylla. — — — — — [IV. 980. f.
[I. 142. d.
barba Jouis. Silberbusch. — — — — 230. a.
cretica. — — — — — III. 533. b.
876. *ARACHIS hypogaea*. Amerikanische Erd-
nuss. Parachide. earth or ground nut.
(Reperitur in regnis Peru, Brasilia et
in Surinam.) — — — — 759. a.
865. *LUPINVS albus*. Königsstab; wilde
Bohnen. lupin. lupines. *BLACKW.* 864. — 674. a.
hi. satus. — — — — — — c.
varius. — — — — — — b.
angustifolius. — — — — — — d.
luteus. — — — — — —
- b. stigma pubescens (nec priorum notae).
866. *PHASEOLVS vulgaris*. türkische Boh-
nen, Haseln. haricot. kidney beans.
L. m. m. 474. — — — — IV. 808. b.

varie-

Genus.	Tom.	Tab.	Lit.
varietates feminum	-	-	— 807. c.
coccineus.	-	-	— 808. a.
legumine variegato, <i>WEINM.</i>	-	-	— 807. d.
caracalla.	-	-	— 808. d.

867. DOLICHOS lablab. Egyptische Fasoln.

lablab. kidney bean.	-	-	— 809. d.
max.	-	-	— 808. c.

vrens; semen. Suratishe Fasoln. phaseole de Surate. stinking beans; cowitch. (*JACQUIN* sel. stirp. Americ. hist. p. 100. t. 189. *BROWN*. Jam. I. 295. *PLUM.* Americ. 92. t. 107. *SLOANE*. Jam. I. 178. Mucuna. *MARCGR.* Brasil. l. c. 10. Legumen septem pollicare fetis vrentibus rigidisque tegitur. femina Gallis ob similitudinem vocantur : yeux bourrique s. oculi asinini. Crescit in Caribaeorum filuis.) — 809. b. c.

870. PISVM aruense. Erbsen. pois. common

white pease. a. flore albo.	-	— 817. b.
b. flore purpureo.	-	— 817. c.
maritimum. (Fl. <i>DAN.</i> 338)	-	— 818. b.
fatium Zuckererbsen; Riesen. <i>BLACKW.</i> 83.	—	[— a. 817. d.
varietas, sine cortice duriore.	-	— 819. b.
ochrus.	-	III. 629, c.

871. OROBVS vernus. Walderve, Wife. bit-

ter vetch. <i>BLACKW.</i> 208.	-	— 775. a.
tuberosus. Knottige W.	-	— — d.
niger. Schwarze W.	-	— — b. c. e.

872. LATHYRVS aphaea. Gelbe Wife,

Platerbse. vesse sauvage. yellow vetch-	—	631. d.
ling.	-	IV. 1009. a.

latifo-

Genus.

Tom. Ta. b. Lit.

latifolius, flore rubro, albo. Breitblättrige,				
rothe Wisse.	-	-	-	III. 628. a. b.
heterophyllus.	-	-	-	— — c.
filuestris. (Fl. DAN. 525.)	-	-	-	— — d.
cicera.	-	-	-	— 630. a.
fatuus. Zahme Platterbse. chickling vetch.	-	-	-	— — e.
amphicarpus.	-	-	-	— — b.
annuus, Semmer P.	-	-	-	— — d.
articulatus.	-	-	-	— — c.
odoratus. Wohlriechende P.	-	-	-	— 629. b.
tingitanus.	-	-	-	— — a.
tuberosus. Erdnuß.	-	-	-	{ — — d.
				IV. 1008. c ?
pratensis; cum varietatibus. Wiesen, Plat-				
erbse. (Fl. DAN. 527.)	-	-	-	III. 631. a. b. c.
873. VICIA pisiformis. Wisse. vesse. vetch.	I.	198.	a.	
cracca. Vogel W.	-	-	-	II. 436. a.
filuatica. Wald W. (Fl. DAN. 277.)	—	—	d.	
bengalensis. Bengalische W.	-	—	{ — c.	
			437. a.	
biennis.	-	-	-	— 436. b.
fatiua. Gemeine W. common tare. (Fl.				
DAN. 522.)	-	-	-	IV. 1010. a. b.
onobrychioides.	-	-	-	II. 437. c.
sepium; folio variegato. Zaunwisse.	-	—	— b.	
faba; maior et minor. Große und kleine				
Bohnen, fêve de marais bean. BLACKW.				
19. (Faba Ph. REGNAULT.)	—	—	500. a. b.	
narbonensis.	-	-	-	IV. 1008. d.
880. COLVTEA arborescens. Blasenbaum,				
falscher Senetbaum. baguenaudier à ves-				
sie; faux-séné. bastard séné.	II.	406.	b.	
frutescens.	-	-	-	— — a.

c. legumen vniloculare polyspermum (nec priorum).

874. **ERVUM** lens. Linse. lentile. lentils
 tare. *L. m. m.* 474. (lens *Ph. RIVIN.* [II. 484. a.
Fl. irr. tetrap. t. 35. Fl. DAN. 95.) [III. 637. a.
tetraspermum. - - - - [— — b.
 [IV. 1009. d.
hirsutum. - - - - — 1009. b.
monanthos. - - - - III. 636. b.
ernilia. Wahre Erbe. Pers. bitter vetch. *L. m. m.*
 479. *BLACKW.* 208. (*RIVIN.* *Fl. irreg. te-* [II. 380. d.
trap. t. 61.) - - - - [IV. 1008. b.
875. **CICER** arietinum. Richern. pois chiches.
 whit, red, and black chiches, or chick-
 peas. *L. m. m.* 480. *BLACKW.* 557.
 (*REGNAULT. CLEWBERG* diff. de variis
 frumentor. et leguminum speciebus V.
T. Vpsal. 1760. Jo. GESNER diff. phy- — [380. c.
 togr. sacr. spec. P. II. p. 10.) [437. d.
877. **CYTISVS** laburnum. Bohnenbaum. au-
 bours, ebenier des Alpes, cytise. bean
 trefoil tree. - - - I. [108. a. b.
 [109.
varietas: folio variegato. - - — 107. e.
nigricans; et folio variegato. Schwärzlicher
Geißflee. - - - II. 456. a. b.
varietas: laticaulis. - - — 457. a.
fessifolius. Baumichter Dreyblatt. - — 457. c.
hirsutus. - - - — 457. c.
austriacus. (*JACQUIN. Fl. Austr. t. 21.*) — 456. d.
879. **ROBINIA** pseudacacia. Unächter Scho-
 roden. robinie. bastard acacia. I. 11. b.
889. **INDIGOFFERA** tinctoria. Indig. in-
 digo bleu. blue indigo, *L. m. m.* 482.
BLACKW. 596. - - - III. 605. b.

Genus.	Tom. Tab. Lit.
coluteoides <i>WEINMANN.</i>	— — a.
longifolia eiusdem.	— — c.
890. <i>GALEGA officinalis</i> ; flore coeruleo.	
Geißraute. le rue de chevre, galega.	
goats - rue. <i>L. m. m.</i> 528. (<i>MILLER</i> fig.	
of plants. t. 137. <i>REGNAULT.</i>)	III. 528. a.
varietas, flore albo.	— — b.
897. <i>LOTUS maritimus</i> <i>Schottenslee.</i>	— 673. c.
tetragonolobus. Viereckiger <i>S. Walzenkraut</i> ;	
Spargelerbse. winged pea.	— 672. e.
varietas, folio variegato.	— 673. a.
edulis.	— — d.
hirsutus.	— 672. d.
iacobaeus.	— — b.
dorycnium. Gefingerte <i>S.</i>	II. 469. e.
corniculatus. Kleingehörnter <i>S. trefle</i> sau-	
vage jaune.	III. 673. b.
varietas: flore maiore luteo splendente.	IV. 980. g.
ornithopodioides.	II. 514. a.
898. <i>TRIGONELLA vthenica</i> . <i>Trigonelle.</i>	III. 672. c.
polycerata.	— 514. b.
foenum graecum. Bockshorn. fenugrec.	
<i>L. m. m.</i> 487. <i>BLACKW.</i> 384. (foenum-	
graecum 1 h. <i>REGNAULT.</i>)	— 513. d.
863. <i>GLYCINE apios</i> . Süßholzwurzel. knor-	
red-rooted liquorice vetch.	I. 149.
d. legumina submonosperma (nec priorum).	
882. <i>GLYCIRHIZA glabra</i> . Süßholz. re-	
glisse. liquorice. <i>L. m. m.</i> 481. <i>BLACKW.</i>	
495. (liquiritia Ph. <i>REGNAULT.</i> Vberior	
plantae descriptio legitur in <i>PALLAS</i>	
Reisen durch das Russische Reich. 1. B.	III. [547. e. b.
498. <i>S. n.</i> 120.)	548. a. b.
	echinata.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- echinata. Stachelichtes Süßholz. reglisse fausse.
(JACQVIN. H. Vindob. t. 95.) — 547. d.
894. PSORALEA pinnata. Warzenflee. trefle
sentant. stinking trefoil. — — — 533. g.
896. TRIFOLIUM melilotus officinalis.
Steinflee. melilot. L. m. m. 435. BLACKW.
80. (melilotus Ph. REGNAULT.) — 718. b. c.
melil. indica. melilot d'Inde. — — — g.
melil. italica. melilot d'Italie. — — — a.
melil. coerulea. Zigerkraut, Sibengezeit.
lotien odorant. BLACKW. 284. — — — f.
repens. Kriechender Flee. faux baume de Peru.
sweet trefoil. L. m. m. 486. — IV. 980. c. e.
rubens. — — — — b.
pratense. Wiesenflee, Fleischkraut. trefle. com-
mon trefle. BLACKW. 20. — — — d.
arvense. BLACKW. 450. — [— 979. b.
III. 548. c.
montanum. Hasen, Bergflee. pied de lievre.
hare-foot. — — — IV. 979. c.
stellatum. — — — — d.
alpestre. — — — — 980. a.
agrarium. — — — III. 718. d.
e. legumen subbiloculare.
891. PHACA australis. Knollenkraut. bastard
milk-vetch. astragaloides alpina TILL. h.
PIS. 141. — — — I. 199. a.
892. ASTRAGALUS tragacantha. Tragant.
tragacant, gomme adragant. goat's
thorn. L. m. m. 484. BLACKW. 264.
(tragacantha Ph. du HAMEL traité des
arbres. T. II. p. 343. REGNAULT.) IV. 977. e.
tragacanthoides. barbe renard. small goats-
thorn. — — — — d.
hamo-

Genus.	Tom.	Tab.	Lit.
hamofus.	I.	199.	b.
glycyphyllus. Wildes! Süßholz. regliffe fau- vage, astragale. liquorice vetch.	—	197.	a. b.
893. BISERRVLA pelecinus. Sägefraut.	—	198.	b.
f. legumen subarticulatum.			
883. CORONILLA emerus. Scorpions:			
fenne. fené batard; baguenaudier des jardiniers.	II.	430.	e.
glauca.	—	—	c.
varia. Kronwige; Peltschen.	—	—	a.
cretica.	—	—	b.
coronata.	—	405.	c.
885. HIPPOCREPIS vnifiliquosa. Huſeis			
ſenflee. fer de cheval. horſe - ſhoe vetch.	—	—	d.
multifiliquosa.	—	504.	d.
comosa.	—	430.	d.
884. ORNITHOPVS perpusillus. Vogelfuß.			
pied d'oifeau. birds - foot.	III.	773.	f.
ſcorpionides.	{ IV.	968.	d.
	{ II.	303.	a.
886. SCORPIVRVS vermiculata. Wurms			
förmiges Skorpionkraut. caterpillar.	—	295.	b.
ſulcata.	—	—	a.
887. HEDYSARVM alhagi. Mannaflee.			
alhagi.	III.	709.	b.
canadenſe. Süßflee.	—	564.	f.
coronarium, flore rubro et albo. Beil, Schild:			
fraut. hedyſaron. hony - ſuckle.	—	565.	b.
flexuoſum.	—	—	c.
onobrychis. Stachelheu, türkiſcher Klee. eſpar-			
ſette St. foin; cock's - head.	—	—	a.
argenteum trifoliatum BVRM. an caneſcens?			
moon - trifoil.	—	564.	e.
gangaeticum.	IV.	1020.	d.
I			
		899.	ME.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

899. **MEDICAGO** arborea. Baumartiger

Schneckenflee. lucerne. medick fodder. II. 457. d.

fatiua. — — — — — 513. c.

falcata. Gelber Sichel-schneckenflee. (Fl. DAN.

233.) — — — — — 501. b.c.

lupulina. — — — — — III. 718. e.

polymorpha. a. orbicularis. Wahrer Schnecken-

flee. — — — — — II. 401. c.

b. scutellata. — — — — — d.

c. intertexta. — — — — — f.

d. rigidula. — — — — — e.

e. turbinata rugosa. — — — — — 404. a.

f. minima? (cf. Fl. DAN. 211.) — — — — — f.

g. ciliaris. — — — — — d.

h. muricata. — — — — — c.

i. hirsuta. — — — — — e.

l. laciniata. — — — — — b.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

ORDO I. PENTANDRIA.

900. **THEOBROMA** cacao. Kakaobaum.

cacaoier. cacao-tree. L. m. m. 488.

BLACKW. 373. (JACQVIN. sel. stirp.

Americ. hist. p. 104. BROWN Jam. III. 306.

SLOANE Jam. II. p. 15. tab. 160. CA-

TESBT Carol. III. p. 6. tab. 6. MERIAN.

p. 26. tab. 26. 63. PLUKN. Alm. 40. tab. 268.

Genus.

Tab. Tom. Lit.

f. 3. *HOVITVTN* natuurl. hist. P. II. sect. 3.
 p. 186. tab. 14. *REGNAULT. SONNE-
 RAT* voyage à la nouv. Guinée. p. 101.
 tab. 61. 82. et aux Indes orient. Vol. II.
 Dantur binae huius arboris varietates
 in India occidentali, quarum alia voca-
 tur cacao du pays, quae in Martinica
 est, alia cacao de Cayenne, quae ex
 Cayenna allata est olim. Fructuum col-
 lectionem Julio et Decembri habent in-
 colae. In Caribaeis arbor multum crescit.) II. [277.
 278.

Ordo III. ICOSANDRIA.

901. *CITRVS* medica. a. fructu minore.
 Zitronenbaum. citronier. citron - tree.
 L. m. m. 498. *BLACKW.* 361. (*RE-
 GNAULT. FERRARIO* hesperides. Ro-
 mae, 1646. p. 191. citri malum Ph.) III. 701. b
 varietas: fructu magno. - - - d.
 fr. corniculato. - - - c.
 fr. corn. maximo. - - 702. a.
 b. limon. Limonenbaum. limonier.
 lemon-tree. *BLACKW.* 362. - - b.
 aurantium. Pomeranzenbaum. orangier. oran-
 ge-tree. *BLACKW.* 349. (aurantia Ph. Da-
 tur: a, malus aurantia maior, cuius ico-
 nem habet *REGNAULT* et *FERRARIO*
 l. c. 369. 377. et b, citrus aurant. Sinensis,
 f. dulcis; *FERRARIO* l. c. p. 427. *VOLKA-
 MER* hesperid. Norimb. p. 194.) - - 700. b.
 varietas: a, angustifolia. - - - c.
 b. degener. - - - d.
 c. striis argenteis. - - - a.
 d. nanum. - - - e.

varietates : ambiguae.

—	{ 701. a.
	{ 702. c.
	{ 703. a.

Ord. IV. POLYANDRIA.

902. *HYPERICVM* perforatum. Johan-
nisfraut, Herenfraut. millepertuis. S.
Johns-wort. *L. m. m.* 492. *BLACKW.*

15. (*MILLER.*)

quadrangulare.

humifusum. (*Fl. DAN.* 141.)

montanum. (*Fl. DAN.* 173. elegantissimum
BAVH.)

hirsutum.

pulchrum. (*Fl. DAN.* 75.)

crispum.

balearicum.

ascyron. Hartheu. l'ascirum. S. Peter's-wort.

(*GMELIN.* Sibir. IV. p. 178. t. 69.)

varietas : flore punctato.

androsaemum. Mannsblut. toute - laine.

BLACKW. 94.

olympicum.

hircinum.

— 591. a.

— 590. e.

—	{ — d.
	{ 589. lb.

— — d.

— 590. g.

— — f.

— 589. a.

— 744. b.

— 589. e.

— 590. a.

— 589. f.

— — c.

— 590. b.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

Ord. I. POLYGAMIA AEQUALIS.

1. Semiflosculosi TOVRNEFORT. corollis ligulatis omnibus.

904. *GEROPOGON* glabrum.

II. 381. f.

905. TRA-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

905. **TRAGOPOGON** pratense. Habermarf,
gelber Bocksbart. barbe de bouc. yellow
goats beard. *L. m. m.* 493. (barba hirci.
Ph. HILL'S veget. syst. T. III. t. 113.) IV. 978. a.
porrifolium. Habermurzel, brauner Bocksbart.
cercifi commun. goat's beard. (Praefertur iusto
pratensi et scorzonera dulcior est.) - - - - - c.
906. **SCORZONERA** humilis. Scorzonere,
Schlangenmord. scorfonere. scorzonera,
vipergrafs. *L. m. m.* 494. *BLACKW.* 406.
(*BVXBAVM.* cent. II. t. 21.) - IV. 978. b.
hispanica. Spanische S. - - - 907. c.
graminifolia. - - - - - f.
angustifolia. - - - - - e.
laciniata. - - - - - d.
907. **PICRIS** echiioides. - - III. 573. e.
hieracioides. Große Gänsedistel. cichorée
jaune; the greater hawkweed. - - 576. e.
908. **SONCHVS** palustris. - - IV. 939. c.
oleraceus. Gänsedistel, Hasenkohl. laitron
doux. sowthistle. *BLACKW.* 130. -
a. laevis latifolius. - - - 940. a.c.
b. angustifolius laciniatus. - - - b.
c. asper laciniatus. laitron epineux. { 938. e.
BLACKW. 30. - - - { 939. b.
d. asper non laciniatus. - - - a.
909. **LACTVCA** sativa. Salat, Latic. laitue.
garden lettuce. *L. m. m.* 495. III. { 618. f.
BLACKW. 88. - - - { 619. b.
varietas: 1. crispa. Krauser S. headed letice. - 618. g.
2. romana. - - - 619. a.
3. maculata. - - - c.
4. rubra. - - - 620. a.

virosa. Bilder Pottich. laitue sauvage. *L. m. m.*

496. (H. J. COLLIN, lactucae siluestris contra hydropem vires. Viennae. 1780. 8.

cum icone.) — — — — c.

scariola. Leberdistel. laitue sauvage avec une tige epineuse. — — — — d.

perennis. Heidelatich. chondrille. gum - fucory. — — — — b.

912. LEONTODON taraxacum. Pfaffenröhrlein, Mönchstopf. pifs en lit; dent de lion. dandelion. *L. m. m.* 497. (taraxacum Ph. Fl. DAN. 574) — IV. 966. a.

varietas: folio tenuissimo. — — — — d.

auctumnale. — — — — III. 573. g.

hirtum. — — — — — 574. g.

hispidum. — — — — — 573. h.

hastile- — — — — — 576. b.

913. HIERACIVM pilosella. Mausöhrlein.

piloselle; oreille de rat. common mouse-

ear. *L. m. m.* 498. BLACKW. 365. pi-

losella f. auricula muris Ph.) I. 206. a.

dubium. — — — — — b.

praemorsum. — — — — — c.

aurantiacum. Gölben Lungenkraut. pulmo-

naire des Francois. French - lungwort.

BLACKW. 538. — — — — III. 576. a.

murorum; a. siluaticum, laciniatum minns

pilosum. — — — — 575. a.

b. hirsutum, folio longiore. — — c.e.

c. fol. rotundiore; ab infectis laesum myophorum. — — — b.

d. maculatum. — — — 574. h.

paludosum. — — — — — c.

fabaudum. — — — — — a.

umbellatum. — — — — 576. d.

pyre-

Genus.		Tom. Tab. Lit.	
pyrenaicum.	- - - -	- -	c.
cymosum.	- - - -	- 574.	d.
914. CREPIS barbata. hawkweed.	- - - -	- 573.	b. c.
rubra.	- - - -	- -	a.
tectorum. (Fl. DAN. 501.)	- - - -	- 572.	d.
virens.	- - - -	- 574.	f.
biennis.	- - - -	- -	e.
916. HYOSERIS radiata.	- - - -	- 576.	f.
hedypnois.	- - - -	- 573.	d.
919 LAPSANA communis. (Fl. DAN. 500.) nipple-wort.	- - - -	IV. 938.	a. b.
920. CATANANCHE coerulea. Afterbeger wart.	- - - -	- 917.	c.
921 CICHORIVM intybus. 1. flore coeruleo. Wilder Wegwart. chicorée sauvage. wild succory. L. m. m. 499. BLACKW. 177. 183.	- - - -	II. 381.	a.
2. flore albo.	- - - -	- -	b.
3. flore carneo.	- - - -	- -	c.
endiua. Endivie. L. m. m. 500. BLACKW. 378. (endiua Ph)	- - - -	- 477.	a.
varietas: folio crispo.	- - - -	- -	b.
922. SCOLYMVS maculatus. the golden thistle.	- - - -	IV. 906.	b.
2. Capitati.	- - - -	- -	-
923 ARCTIVM lappa, Grosse Klette. bardane, glouteron. burdock. L. m. m. 501. BLACKW. 117. (MILLER.)	- - - -	I. 232.	-
varietas: capitulis tomentosis.	- - - -	- 231.	a.
folio serrato.	- - - -	- -	b.
924 SERRATVLA tinctoria. Scharfens frant. farrette. saw-wort.	- - - -	IV. 917.	a.
varietas: folio magis serrato.	- - - -	- -	b.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- aruenfis. Feigwarzenthistel. chardon hemorroïdal. way - thistle. - - - II. 309. a.
- 925 CARDVVS lanceolatus; flore rubro, { 311. a.
albo. - - - - - { 310. b.
- nutans. - - - - - — — a.
- crispus. - - - - - — 316. b.
- acanthoides; flore rubro, albo. - — 315. c.d.
- palustris. - - - - - — 313. b.
- cafabonae. - - - - - I. 14. a.
- marianus. Marienthistel. cardon Marie. ladies thistle. *L. m. m. 502. BLACKW. 79.* (carduus Mariae Ph.) - - - II. 313. a.
- eriophorus; flore rubro, albo. (*MILLER.*) — 317. b.c.
- acaulis; et varietas folio variegato. — 319. a.b.
- 926 CNICVS oleraceus. Krauttraut, blessed thistle. - - - — 465. b.
- variatus: folio dissecto. - - - — — c.
- centauroides. - - - - - — 347. a.
927. ONOPORDVM acanthium. Wollenthistel. epine blanche. cotton thistle. (carduus tomentosus Ph. *HILL'S* veget. syst. T. IV. t. 12.) - - - — 307. b.
- illyricum. - - - - - — 308. a.
928. CYNARA scolymus. Artischoke. l'artichaud; artichoke. *BLACKW. 458.* — 388.
- cardunculus. Spanische Artischoke. cardon d'Espagne. cardoon - thistle. - — 387.
929. CARLINA acaulis. Eberwurzel. carline, cameleon blanc. carline - thistle. *L. m. m. 503. BLACKW. 532.* (cardopatia Ph.) - - - II. 318. a.c.
- vulgaris. - - - - - — 308. c.
- Africana chrysanthemos *BVRM. ex PLVKN.* 154. 6. - - - — 318. b.
930. ATRA-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

930. *ATRACTYLIS fruticosa*? Spindelkraut.distaff-thistle. *BLACKW.* 468. III. 594.931. *CARTHAMVS tinctorius*. Wilder Saß

fran. cartame, saßfran bastard. bastard

saßfron. *L. m. m.* 504. (*RVMPH.* Am-boin. T. V. p. 215. tab. 79. Hort. *ET**SIETT.* T. III. f. 1.) - II. 320. a. b.

carduncellus? - - - 311. b.

lanatus. Feldsaßfran. cardon benit des Parisiens. - 308. b.

coeruleus, - - - 400. a.

3, Discoidei.

932. *BIDENS tripartita*. Gelber Wasserdoß.

l'eupatoire aquatique. water hemp agri-

moay. *BLACKW.* 519. - - - 376. b.

cernua: a angustifolia; an coreopsis bidens? - 375. d.

b. latifolia. - - - - e.

933. *CACALIA Kleinia*. Kleinie. foreign

colts foot. - - - 276.

ficoides. - - - IV. 915. c.

935. *EVPATORIVM cannabinum*. Hanß

odermennig. l'eupatoire. hemp-agrimony.

L. m. m. 506. *BLACKW.* 110. flore rub-

ro et albo. - - - II. 496. a. b.

vrticaefolium, - - - - d.

purpureum. - - - 495. c.

939. *CHRYSOCOMA linofyris*. Goldhaar.

goldylocks. - - - III. 664. a.

varietas: austriaca. - - - - b.

940 *TARCHONANTHVS camphoratus*.

African flea-bane. - - - II. 476. d.

943. *ATHANASIA genistifolia*. - III. 598. e.942. *SANTOLINA chamaecyparissus*. Gar-

tencypresse. aurone femelle. garde-robe.

BLACKW. 346. abrotanum foemina Ph. I. 4. c.

varie-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

varietas: <i>a. ericaefolio.</i>	-	-	-	6.	b.
<i>b. flore maiore.</i>	-	-	-	5.	a.
<i>c. villosa, flore albo W.</i>	-	-	-	-	b.
<i>rosmarinifolia.</i>	-	-	-	-	{ 4. d. 6. a.

Ordo II. POLYGAMIA SUPERFLVA.

a. Discoidei.

944. **TANACETVM** vulgare. Rheinfarn,
 Wurmfraut. tanaise. common tanfy.
L. m. m. 508. BLACKW. 464. - IV, 965. c.
 varietas: foliis crispis. - - - 966. a.
 balsamita. Frauenfraut. menthe coq. costmary.
L. m. m. 509. BLACKW. 98. - - - b.
945. **ARTEMISIA** vulgaris, Beifuß. ar-
 moise. mug - wort. *L. m. m. 515.*
BLACKW. 431. (Ex foliis tufis tritis-
 que Japonenses moxam parare solent.) I. 170. b.
 varietas: rubra et folio variegato. - - 171. b.a.
- abrotanum. Stabwurzel. aurone male. sou-
 therwood. *L. m. m. 510. BLACKW. 555.*
 (abrotanum mas Ph.) - - - 4. a.
 arborefcens. - - - - 8. a.
 campestris. - - - - 4. b.
- ablinthium. Vermuth. la grande absinthe.
 common wormwood. *L. m. m. 514.*
BLACKW. 17. (ablinthium vulgare Ph.) - 7. a.
 varietas: latifolia infipida. - - - 9. b.
- pontica. Römischer W. la petite absinthe. Ro-
 man wormwood. *L. m. m. 511. BLACKW.*
537. (ablinthium ponticum S. Romanum
 Ph.) - - - - a.
- iudaica. *L. m. m. 512.* (fantonicum, vnde
 semina sancta s. contra) - - II, 368. f.

Acueru-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

coerulescens.	-	-	-	I.	9.	c.d.
dracunculus. Kaiserkratz. estragon. tarragon.	{II. 471. a.					
BLACKW. 116.	-	-	-	I.	8.	b.

946. GNAPHALIVM stoechas. Rhein:

blume. stoechas citrin.	-	-	-	III.	549.	a.c.d.
orientale.-	-	-	-	-	550.	d.g.
arenarium, Pimmortelle. goldy-locks. L. m.						
m 516. BLACKW. 438. 524. (stoechas citrina Ph.)	-	-	-	-	551.	a.
rutilans.	-	-	-	-	550.	c.
luteo album.	-	-	-	-	548.	d.
foetidum.	-	-	-	-	[476. f.	
					550. f.	
margaritaceum.	-	-	-	-	549.	b.
dioicum. a. mas, flore rotundiore. Ragenfuz.						
pied de chat. mountain cat's food, or cud-wet. L. m. m. 517. (pes cati. f. hispidula Ph.)	-	-	-	-	551.	b.d.
b. foemina. flore longiore.	-	-	-	-	-	c.
fluaticum? (Fl. DAN. 254.)	-	-	-	-	549.	d.
vliginosum.	-	-	-	-	550.	b.

947. XERANTHEMVM annum. Stroh:

blume. xerantheme ou grande immortelle. everlasting. a. flore albo simplici.	I.	148.	b.
b. flore albo, rubro pleno.	-	IV.	1021.d.e.
c. prolifera, varietas.	-	-	c.

949 BACCHARIVS iuaefolia. plough-man's spike-nard.

II. 422. a.

950. CONYZA squarrosa. Dürrenzel. Conife ou herbe aux puces. flea-bane.

BLACKW. 102. - - - 423. b.

b. Radiati.

951. ERIGERON acre. Altmannskraut.

groundfel.	-	-	-	-	422.	c.d.
canadense.	-	-	-	-	-	b.

952. TVS.

952. *TVSSILAGO* farfara. Huftatich, Roff-
 huf. pied. d'ane, tuſſilage. colts - foot.
L. m. m. 518. *BLACKW.* 204. (*Fl. DAN.*
 595. farfara Ph.) - - IV. 999. b.
 petasites. Peſtilenzwurzel. petasite ou herbe
 aux teigneux. butter - burr. *L. m. m.* 519.
BLACKW. 222. (petasites Ph.) - — 805. b.
953. *SENECIO* vulgaris. Kreuzkraut. sene-
 con. groundfel, or fimſon. *BLACKW.*
 132. (*Fl. DAN.* 513.) - — 915. d.
 erucifolius. - - - III. 599. d.
 elegans. - - - — 596. c.
 abrotanifolius. - - - I. { 7. c.
 29. a.
- Jacobaea*. Jakobskraut, Jakobssblume. Jacobée,
 herbe de S. Jacques. seggrum. - III. 597. a.
 varietas: flore albo. - — 600. a. b.
 filuaticus. - - - — 599. a.
 paludosus. (*Fl. DAN.* 385.) - — — b.
 sarracenicus. Heidniſch Wundkraut. - { — — c.
 IV. 1012. e.
 ilicifolius? - - - III. 596. a.
954. *ASTER* amellus. Sternkraut. oeil de
 Chriſt; l'aster. ſtar - wort. *BLACKW.*
 109. - - - I. { 193. b.
 194. a.
 tardiflorus. - - - — 187. b.
 divaricatus. - - - — 188. a.
 mutabilis. (*f. nouae Angliae?*) - — 195. b.
 puniceus. - - - — 190. b.
 nouae Angliae. - - - — — a.
 cordifolius. - - - — 187. a.
 noui Belgii. - - - — 189. a.
 annuus. (*Fl. DAN.* 486. Paradenſiſch St.) — 194. b.
 linifolius; an acris? - - — 191. b.

962. **BELLIS** perennis. Kleine Massliebe.
 petite marguerite. common daisy. *L.m.m.*
 526. *BLACKW.* 200. (*Fl. DAN.* 503. *bellis*
minor Ph.) *a.* filuestris. - - I. 236. a. b. c.
b. hortensis; flore pleno, - [236. d.
 rubro. *BLACKW.* 530. [237. a. b.
c. — flore pleno, fistuloso. — 237. c. d.
d. — flore prolifero. — 236. e. f
964. **TAGETES** erecta. Samtblume. Afri-
 can marigold. *a.* flore citrino. - IV. 962. a. b.
b. flore aureo. - — 961. d.
c. flore pleno vario. — [960. c. b. d.
 [961. c.
d. flore fistuloso simpli-
 ci et pleno. — 961. b. a.
- patula. minor lutea; lutea maculis rufis.* — [962. d.
 [963. f.
- varietas: a. rufa.* - - — [962. c.
 [963. a.
- b. flore vario pleno.* - — [962. e. f.
 [963. a. c. d.
966. **CHRYSANTHEMUM** leucanthemum. Grosse Massliebe, Bucherblume.
 grande marguerite. ox-eye daisy.
BLACKW. 42. (*bellis maior Ph.*) I. 238. c.
varietas: a. floris radio, floribus fistulosis. — — d.
b. caule villis canescente. - — — b.
- corymbosum.* - - - [— 239. a.
 [II. 364. b.
- segetum. Gelbe Kornmassliebe. marguerite dorée.*
corn-marigold. - - - II. 377. d.
- myconis.* - - - — — [c.
- coronarium. a. flore simplici luteo sulphureo:* — [377. e.
 [379. a. d.
b. albo, medio-albo. - II. 378. b.
c. flore pleno, luteo, albo. — [379. b. c.
 [378. c. d.
- flosculosum.* - - - I. 239. b.
967. **MAT.**

Genus.]

Tom. Ta. b. Lit.

- 967 **MATRICARIA** parthenium. Mutterz
 fraut. matricaire. feverfew. *L. m. m.*
 527. *BLACKW.* 192. (parthenium Ph.) III. 713. a.
 varietas: a. flore pleno. - - - - b.
 b. flore fistuloso. - - - - c.
 chamomilla. Kamillen. chamomille commune.
 wild camomill. *L. m. m.* 528. *BLACKW.*
 298. (chamomilla vulgaris Ph.) - II. 362. d.
- 968 **COTVLA** coronopifolia. Saugenblume.
 mayweed. (Fl. *DAN.* 341.) - I. 237. e.
 turbinata; flore pallido, luteo. - - II. 362. b. c.
- 970 **ANTHEMIS** cota. - - I. 239. c.
 pyrethrum. *L. m. m.* 531. *BLACKW.* 390.
 (pyrethrum Ph. *MILLER* t. 38.) IV. 840. d.
 frutescens. - - - - c.
 nobilis. Aechte, römische Kamille. chamomille
 Romaine. sweet-scented camomill. *L. m. m.*
 529. *BLACKW.* 526. (chamomilla Romana,
 f. nobilis Ph.) - - - II. 363. b. c.
 varietas: flore pleno et semipleno. - - d. e.
 aruensis. - - - - a.
- cotula. Kröten, Hundsbill. chamomille pu-
 ante; maroute. may-weed. *L. m. m.* 530.
BLACKW. 67. (cotula foetida Ph.) - 364. a.
- tinctoria. Rindsaug. oeil de boeuf. com-
 mon ox-eye. *BLACKW.* 438. - II. 378. a.
- 971 **ACHILLEA** santolina. - - III. 730. c.
 ageratum. Wohlriechender Bertram. l'empatoire
 de Mesue. maudlin. *L. m. m.* 532. *BLACKW.*
 300. (ageratum Ph. *MILLER* t. 10.) II. 1496. c.
 tomentosa - - - - III. 729. f.
 pubescens. - - - - - g.
 clauennae. - - - - I. 7. b.
- ptarmica. Niesskraut; weißer, spizer Rheinfarn.

l'her-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- l'herbe à eternuer, speez - wort; bastard pel-
litory. *L. m. m.* 533. *BLACKW.* 276.
(ptarmica Ph.) - - - IV. 837. b.
magna. - - - III. 730. a.
millefolium. Schaafgarbe. mille feuille. mil-
foil; yarrow. *L. m. m.* 534. *BLACKW.* 18.
(millefolium Ph.) 1. vulgare album. — 729. d.
2. flore purpureo. — { — e.
730. b.
975. VERBESINA alata. - - II. 370. b.
1287. SPILANTHVS acmella. acmelle.
Zevlanish hemp - agrimony. *L. m. m.* 505.
BLACKW. 518. (acmella Ph. *BREYN.*
prodr. append p. 48 *RVMPH.* Amboin.
T. VI. tab. 6. Crescit in insula Zey-
lan et Ternate.) - - — 495. b.
977. BVPHTHALMVM spinosum. Rindse
aug. ox-eye. - - - — { 377. a.
424. a.
I. 192. a.
grandiflorum. - - - — 192. b.
barbarum. afteroides Americana nodosa; ex
MYNT. t. 119, an ficta? - - — 196. a.

Ord. III. POLYGAMIA FRVSTRANEA.

979. HELIANTHVS annuus. Sonnens
blume. le soleil. sun - flower; turn - fol.
a. flore simplici maximo. - - III. 371.
b. flore minore. - - — 373. b.
c. flore pleno maximo. - - — { 372.
374.
indicus. - - - — 373. a.
giganteus. (altissimus?) - - I. 191. a.
tuberosus. Artischofenerdapsel; Judianische Zu-
ferwurzel. taupinambour. - - II. 375. a.
980. RVD.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

980. RVDBECKIA laciniata. dwarf sun				
flower.	-	-	-	469. a.
984. CENTAVREA acrupina. flore rubro, albo.	-			368. ad. e.
moschata. Bisamblume. amberboi				
a. flore rubro, albo.	-	-	-	450. a. b.
b. flore flauo.	-	-	-	- c.
centaureum. Großes Tausendgüldenfraut. la				
grande centaurée. great centory. BLACKW. 93.	-			347. b.
phrygia. (Fl. DAN. 520.)	-	-	III.	592. c.
nigra.	-	-	IV.	887. a.
femperuirens.	-	-	III.	592. b.
montana. flore coeruleo, albo. BLACKW. 68.	-			449. b. c.
cyanus. a. segetum. Gemeine Kornblume. flo-				
re coeruleo. bluet. blue bottle. L. m. m.				
535. BLACKW. 270.	-	-	-	451. f.
b. hortensis, flore simplici albo.	-			- a. c. e.
flore simplici rubro.	-			[- d.
				452. a. c.
flore simplici vario.	-			[451. b.
				452. b. d.
ragulina.	-	-	-	594. b.
spinosa?	-	-	-	- a.
iacea. Flockblume. jacée de Prés. knap- weed.				
flore rubro albo. (Fl. DAN. 519.)	-			593. a. d.
foliis ferratis.	-	-	-	- b.
splendens.	-	-	IV.	949. c.
fenchifolia.	-	-	III.	592. c.
benedicta, Kardobenedicte. chardon benit. holy-				
thistle. L. m. m. 537. BLACKW. 476. (car-				
duus benedictus Ph.)	-	-	II.	309. b.
eriophora.	-	-	I.	189. b.
centauroides.	-	-	III.	592. d.
calcitrapa. Sterndistel. chardon étoilé; chausse-				
trape. star - thistle. L. m. m. 538. flore ru-				

Genus.

Tom. Tab. Lit.

bro. (calcitrapa Ph. *COLUMN.* phytobas.

85. t. 24. *HILL'S* veget. syst. T. IV. t. 17.) II. 317. a.
 flore albo. - - - - 316. c.

Ord. IV. POLYGAMIA NECESSARIA.

990. CALENDULA officinalis. Ringelblus

me. fouci. marigold. *L. m. m.* 539. — { 282. c. e.
BLACKW. 106. - - - - { 285. b. c.
 varietas: a flore pleno, semipleno, luteo, — { 283. a-e.
 aureo. - - - - { 284. a.
 b. prolifera. - - - - 284. b.
 aruenfis. - - - - — { 282. d.
 — { 284. c.
 — { 285. a. b.
 pluuiialis. - - - - — 282. a.
 hybrida. - - - - — — b.

991. ARCTOTIS calendulacea. Bärenohr. III. 594. c.

992. OSTEOSPERMUM spinosum. Bein

saame. hard seeded chrysanthemum. II. 370. a.
 moniliferum. *BVRM.* Afr. t. 61. - — 369.

993. OTHONNA pectinata. - III. 597. b.
 parviflora. - - - - — 596. b.

995. FILAGO germanica. Ruhrkraut, Fas-
 denkraut. l'herbe à cotton. common
 cudweed. - - - - — 549. e. f.

aruenfis. - - - - — 550. a.
 leontopoides? - - - - II. 291. e.

996. MICROPUS supinus. Salzblume. ba-
 stard cudweed. - - - - III. 550. e.

Ord. V. POLYGAMIA SEGREGATA.

999. ECHINOPS sphaerocephalus. Fugel

distel, la boulette; echinope. glove thistle. II. 314. a.
 varie-

Genus.			Tom. Tab. Lit.
varietas: flore rubro.	-	-	— 315. a.
ritro.	-	-	— 314. b.

Ord. VI. MONOGAMIA.

1006. LOBELIA cardinalis. Kardinalblu:

me. rampions; cardinal-flower.	—	512. a. b.
verietas: folio variegato.	-	— c.

1007. VIOLA odorata. Wohlriechendes Veil:

den. violette; violier. violet. *L. m. m.*

540. *BLACKW.* 55. (Fl. *DAN.* 309. *RE-GNAULT.*) - - -

IV. 1011. d.

varietas: 1. flore albo, carneo, cinericeo. — — c. e. f.

2. flore pleno. - - - g.

canina. - - - h.

montana. - - - i.

tricolor. Dreifaltigkeitsblume. *BLACKW.* 44.

(Herba plantae specificum istud a *STRACKIO* euulgatum est, inter nostrates contra crustam sic dictam lacteam infantum satis notum. cf. Carol. *STRACK* diss. de crusta lactea infantum eiusdemque specifico remedio. Francofurt, ad Moen. 1779. 8.)

a. hortensis. - - - III. 595. a. h. i.

b. aruensis bicolor. - - - — b-g.

c. lutea grandiflora - - - — k. l.

ipecacuanha? Brechwurzel. *L. m. m.* 541. (ipe-

cacuanha Ph. Conferantur *PISO. BARRERE*

hist. nat. de la France equinox. p. 113.

POUPPE DESPORTES malad. de Domin-

gue. T. III. p. 6. *VANDELLI* fasc. 1771.

AVBLET hist. d. plant. de la Guiane Franç.

T. II. p. 808. t. 318. *LINNE* diss. de viola

ipecac. Vpsal. 1774.) - - - III. 606. a.

barbara. surrecta pinguiculae facie. *BVRM.*

cx *PLVKN.* 234 - - - IV. 1011. k.

1008. *IMPATIENS* balsamina. Springsae-
men, Balsamine; balsamine. *BLACKW.*
583. a. flore simplici rubro. - I. 218. a.b.
b. flore purpureo, albo, pallido,
variegato. - - [219. a.b.
220. a.b.
c. flore pleno, versicolore, mixto. - [221.
222.
noli - tangere. Gelbe Balsamine. balsamine
jaune. quick in the hand; touch me not. III. 603. b.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

Ordo I. DIANDRIA.

1009. *ORCHIS* bifolia. Weisse Stendelmur-
zel. l'orchide. butter fly orchis. *L. m. m.*
543. *BLACKW.* 588. - - -- 771. c.
morio. femal orchis. *L. m. m.* 544. (Fl.
DAN. 457.) flore carneo, purpureo, pal-
lido. - - - - - 769. c.d.e.
flore albo. - - - - - b.
militaris - - - - - 767. b.
varietas : magna galea fusca. - - 768. a.c.
mascula. *BLACKW.* 53? (Fl. *DAN.* 457.) - 769. f.
vstulata. (Fl. *DAN.* 103.) - - 771. b.
latifolia. *BLACKW.* 405. (Fl. *DAN.* 266.) - - a.
maculata. - - - - - 770. c.d.
odoratissima; flore rubro et albo. - - a.
1010. *SATYRIVM* repens. flore albo. - 771. e.
1011. *OPHRYS* nidus avis. Vogelnest. nid
d'oiseau. bird's-nest. - - 767. a.
spira-

Genus.	Tom.	Tab.	Lit.
spiralis. triple ladies traces. (Fl. <i>DAN.</i> 387.)	—	771.	d.
ouata. Zweiblatt. double feuille. twyblade. (Fl. <i>DAN.</i> 137.)	—	769.	a.
insectifera; fucum referens, maxima Cretica.	—	767.	c.
minor Cretica.	—	771.	f.
araneam referens.	—	—	g.
1012. SERAPIAS latifolia. helleborine. ba- stard hellebore. (Fl. <i>DAN.</i> 267.)	—	568.	a.
longifolia; palustris.	—	567.	d.
grandiflora; flore rubro et albo. (Fl. <i>DAN.</i> 506.)	—	—	b.c.
rubra. (Fl. <i>DAN.</i> 345.)	—	568.	b.
dubia. Orchis palmata <i>WEINM.</i>	—	770.	b.
1015. CYPRIPEDIVM calceolus. Frauen- schu. sabot; foulier de nôtre dame. la- dies slipper. (<i>MILLER.</i> 242.)	—	567.	a.
1016. EPIDENDRVM vanilla. Vanille, va- nille. <i>L. m. m.</i> 545. <i>BLACKW.</i> 590. <i>IV.</i> 1002.	—	—	c.
africanum lychnidis flore. <i>BVRM.</i> ex <i>PLVKN.</i>	—	—	—
174. 4.	—	II.	479. a.

Ord. II. TRIANDRIA.

1017. SISYRINCHIVM bermudinum. Schweinsrüffelblume. maior et minor. <i>III.</i> 613.	d.c.
--	------

Ord IV. PENTANDRIA.

1021. PASSIFLORA coerulea. Passions- blume. fleur de passion. passion flower. (Habitat in Brassilia; Virginia; Jamaica. Granadilla <i>TOURNEFORT.</i>)	—	[395. 346.]	a.
incarnata. (Peru.)	—	397.	b.
varietas: flore viridi. Hort. <i>OXON.</i> sect. 1. tab. I. fig. 9.	—	396.	b.
	L 3		mur-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

murucua. an punctata?	-	-	—	412. a.
pedata.	-	-	—	397. a.
normalis. contrayerua. (<i>BROWN</i> . Jamaic. 328.				
n. II.)	-	-	—	412. b.
dubia, flore campanulato. <i>SVNT</i> . t. 164.				
foetida.	-	-	—	397. c.

Ord. V. HEXANDRIA.

1022. ARISTOLOCHIA pistolochia.	IV.	817. a.
rotunda. <i>Osterlucei</i> . aristoloche ronde. birth-		
wort. <i>L. m. m.</i> 547. <i>BLACKW.</i> 256. - I.		168. a.
longa. aristoloche longue. <i>L. m. m.</i> 548. <i>BLAK.</i>		{ 167. b.
257. (<i>MILLER</i> t. 51. f. 2.)	-	{ 168. c.
clematitis. Gemeine <i>D.</i> aristoloche clematite.		
<i>L. m. m.</i> 549. <i>BLACKW.</i> 255. (aristolo-		{ 167. a.
chia vulgaris f. tenuis Ph. <i>REGNAULT.</i>)	—	{ 168. b.
serpentaria. Schlangennurzel. <i>L. m. m.</i> 546.		
(serpentaria Virginiana Ph. <i>CATESBY</i> nat.		
hist. of Carolina. T. I. p. 29. t. 29.)	IV.	916. b.

Ord. VII. DODECANDRIA.

1232. CYTINVS hypocistis. hipociste. para-		
fita in cisto.	-	II. 391. c.

Ord. VIII. POLYANDRIA.

1028. ARVM maculatum. Arontsurzel. le		
pied de veau. cuckow-pintel; wake-		
robin. <i>L. m. m.</i> 551. <i>BLACKW.</i> 220. (Fl.		
<i>DAN.</i> 505.)	-	I. 173. a.
varietas: minus cum fructu.	-	172. a.c.
minus:	-	— b.
		dracun-

Genus.	Tom.	Tab.	Lit.
dracunculus. Schlangentraut. serpentaire. dragon - wort. - - -	II.	472.	b.
colocasia. Egyptische A. colocasia. (<i>CATESBY</i> Carol. II. tab. 45.) - - -	I.	173.	b.
arifarum. Mönchskappe. (<i>BARRERE</i> . 573.) —		176.	a
seguinum. <i>PLUM.</i> T. 51. 60. (<i>JACQUIN</i> fel. stirp. Americ. hist. p. 117. t. 229. <i>BROWN</i> . Jamaic. I. p. 331. <i>MILLER</i> . ic. t. 295. Succo venenato, acerrimo, cutim inflammante, haec planta scatet, ideoque cum aninga <i>PISONIS</i> eadem esse nequit. Odorem spirat teterrimum. Caulis in frustula transuersim sectus ad confectionem lixiui illius acerrimi adhiberi solet, quo in succi saccharini depuratione vtuntur. Crescit in pratis humidis Caribaeorum.) - —		177.	
1029. <i>DRACONTIVM</i> polyphyllum ? Zehrwurzel. serpentaire. dragon.	I.	176.	b.
1030. <i>CALLA</i> aethiopica. Aethiopische Aronswurzel. - - -	—	174.	
varietas : spatha duplici. - - -	—	175.	
palustris. (Fl. <i>DAN.</i> 422.) - - -	II.	472.	a.
1032. <i>ZOSTERA</i> marina. Seegrass. algue. grafs - wrack. (Fl. <i>DAN.</i> 15.) -	III.	670.	h.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

Ordo II. DIANDRIA.

1038. *LEMNA* trifulca. Wasserlinse. lentille d'eau. duk's - meat. - - III. 637. d.

Genus.

gibba.

Tom. Tab. Lit.
— — f.

Ord. III. TRIANDRIA.

1040. *TYPHA* latifolia. Kolbe. mase. reed-
mace. — — — IV. 977. a.
1041. *SPARGANIVM* erectum. Igelfolbe.
bur-reed. — — — 942. a.
ramosum. — — — — b.
1042. *ZEA* mays. Türkischer Weizen. mays;
bled de Turquie. Indian wheat. *BLACKW.*
547. a. b. Flores masculi. — — II. 518. a.e.
fructus lutei, rufi. — — — — b.d.
1043. *COIX* lacrima. Hiobsthänen. la lar-
me de Job. Job's-tears. — — III. 618. e.
1046. *CAREX* arenaria. Niedgras. cype— 552. b.
roide. carex. (Fl. *DAN.* 425.) — 553. c.
canescens. (Fl. *DAN.* 285.) — — 556. c.
distans. — — — — 555. f.
paniculata. — — — — 552. b.
leporina. — — — — 552. i.
acuta. — — — — 553. k.
montana — — — — — g.
1050. *PHYLANTHVS* emblica. Bläters
terblume. Myrobolane. *L. m. m.* 553.
BLACKW. 400. — — — 741. a.
a. indica. *BLACKW.* 401. 4. — — 742. b.
b. bellirica. *L. m. m.* 650. *BLACKW.* 401.
1. Act. *MOGVNT.* 58. — — — 740. b.
c. citrina. *BLACKW.* 401. 3. — — 742. a.
d. chebulae. *BLACKW.* 401. 2. — — 741. b.

Ord. IV.

Ord. IV. TETRANDRIA.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

1052. **BETULA** alba. Birkenbaum. la bouleau. birch-tree. *L. m. m.* 554. *BLACKW.*
 240. (*CRAMER* Forstwesen. Taf. 10) I. 244. a.
 alnus. Erlenbaum. l'aune; vergne. alder-tree.
 rotundifolia viridis. (*CRAMER* l. c. 12.) — 40. b.
 varietas: incana. - - - — 41.
1053. **BUXUS** sempervirens. Buchbaum. le buis. box-tree. *BLACKW.* 193. a. arborescens. - - - — 275. a.
 b. suffruticosa rotundifolia foliis pictis. - - - — — b.
 c. folio acutiore, limbo argenteo, aureo. - - - — — c. d.
1054. **URTICA** pilulifera. Römische Brennessel. l'ortie Romaine. Roman-nettle.
L. m. m. 556. *BLACKW.* 321. - IV. 1019. d.
 Dodartii. - - - - - — — c.
 dioica. Grosse U. grande ortie. common stinging nettle. - - - — 1020. a. b.
 vrens. Gemeine U. folio variegato. - — — c.
1055. **MORUS** nigra. Maulbeerbaum. mulrier noir. mulberry-tree. *L. m. m.* 558.
BLACKW. 126. - - - III. 735. b.
 alba. - - - - - — — a.

Ord. V. PENTANDRIA.

1056. **XANTHVM** strumarium. Kleines Stettenkraut. petit glouteron. louse-bur.
L. m. m. 559. *BLACKW.* 444. - IV. 1021. a.
 spinosum. - - - - - — — c.

1058. **PARTHENIVM** hysterophorus.
 Mennblume. bastard fever-few. III. 713. b.
1060. **AMARANTHVS** tricolor. *Jadis*
 scher Amarant. amaranthe. amarant. ex
 rubro, luteus, viridis. - - I. 93.
 varietas: lutea et viridis. - - — 95.
 melancholicus. - - - — 94.
 tristis. - - - — 88. b.c.
 liuidus. bléte rouge. - - — a.
 blitum. *Kleiner Meier.* petite blite. small-blite. — 252. a.
 polygonoides. - - - — { 99. a.
 252. b.
 hypochondriacus. *BLACKW.* 317. - — 91.
 hybridus. - - - — 90.
 caudatus. - - - — 89.
 spinosus. (*RUMPH.* Amboin. V. t. 83.) — 252. c.

Ord. VIII. POLYANDRIA.

1067. **SAGITTARIA** sagittifolia. *Pfeil:*
 fraut. la flechiere. arrow-head. (Fl.
DAN. 172.) maior. - - IV. 876. b.
 angustifolia. - - - — c.
1069. **POTERIVM** sanguisorba. *Kleine Bis*
 bernel. pimprenelle. burnet. *L. m. m.*
 560. *BLACKW.* 413. (*pimpinella italica*
Ph.) - - - — 810. a.b.c.
 hybridum. - - - — d.
1070. **QUERCVS** robur. *Eichenbaum.* che-
 ne. oak. *L. m. m.* 562. *BLACKW.* 487.
GLEICHEN Abbild. t. 29. cum excrescen-
 tiis ex punctura cynipidis exortis.) — 845. a.
 Gallarum plurimae varietates. - — 846.
 puber.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- suber. Korkbaum, Pantoffelholzbaum. liege.
 cork-tree. *L.m.m.* 561. *BLACKW.* 193. (sub-
 ber Ph. du *HAMEL*. arbres. T. II. tab. 80.) — 954. a.
 varietas: angustifolia non serrata. C. B. — — b.
 coccifera. Rarnesbeerbaum. chêne des grai-
 nes, d'ecarlata. scarlet oak. *BLACKW.* 186. III. 603. a.
 zegilops. Ziegenbart; Eiche. cerre. bitter-oak. IV. 845. b.
 varietas: cum galla villosa. — — 847.
- 1071. IVGLANS** regia. Nussbaum. le no-
 yer. walnut-tree. *L.m.m.* 563. *BLACKW.*
 247. (*CRAMER* Forstwesen. t. 22.) III. 759. b.
 varietas: fructu maximo. — — — c.
- 1072. FAGVS** filuatica. Buchbaum. hêtre;
 fayard. beech-tree. *BLACKW.* 330.
 (Gleichen, Neuest. d. Pflanz. Taf. 17.) II. 501. a.
 castanea; vulgaris, filuestris. Kastanienbaum.
 chataigner. chesnut tree. (*MILLERS* fig.
 t. 84.) — — — 343. b.
 varietas: sativa. — — — a.
- 1073. CARPINVS** betulus. Hagenbüche. char-
 me. hornbeech-tree. — — — 319. c.
 eiusdem folia morbosa. — — — IV. 976. b.
- 1074. CORYLVS** auellana; filuestris. Has-
 elnussbusch. le noisetier. haselnut-tree.
BLACKW. 293. — — — II. 431. d.
 varietas: sativa, fructu oblongo; nucleo albo. — — a.
 sativa; fructu rotundo, maximo; nucleo
 albo, rubro. — — — — c. b.
- 1075. PLATANVS** orientalis. Morgenlän-
 discher Ahornbaum. platane d'orient. pla-
 ne-tree. — — — I. 15. b.
- 1076. LIQVIDAMBAR** styraciflua. Am-
 berbaum. liquidambar. sweet-gum;

storax-

storax - tree. *L. m. m.* 1567. *BLACKW.*

485. (*styrax liquida* Ph. *CATESBY* nat.

hist. of Carolina. T. II. tab. 62. Crescit

in Virginia, Carolina, Mexico.)

IV. 953. b.

Ord. IX. MONADELPHIA.

1077. PINVS filuestris. Fichtenbaum. pin

sauvage. firr-tree. *BLACKW.* 293. (*SCHÖL-*

LENBACH Abbild. 1-4. Taf.) - I. 3. b.

varietas: montana. - - - 2. b.

pineae. Zöhmer Fichtenbaum. pin. pine - tree.

BLACKW. 189. (pineae Ph. du *ROT* Baum;

zücht. T. II. p. 39.) - - IV. 813. b.c.

cembra. (Zirbelbaum) Arvennussbaum. cem-

bro. (*BREYN.* eph. nat. cur. cent. VII.

tab. I. *BRÜCKMANN* epist. itin. 89.) - - a.

cedrus; quoad fructum, non folia. Ceders

baum. cedre du liban. *POMET.* f. 105. p.

141. (*TREIV.* T. I-4.) - - II. 346. b.

abies. Nothor Tannenbaum. la pesse; faux

sapin. pitch-tree. *BLACKW.* 203. (*SCHÖL-*

LENBACH. t. 9-16. Fl. *DAN.* 193.)

I. { 1. b.d.

{ 2. c.

{ 3. a.

picea. Tannenbaum, weisse Tanne. sapin. silver-

firr; yew - leaved firr. *BLACKW.* 198.

(*SCHÖLLENBACH* 5-8. vnde: terebinthi-

na communis.) - - - I. a.c.

- - - 2. a.

larix. Lerchenbaum. melese. lark-tree. *BLACKW.*

477. (vnde terebinthina Veneta. *SCHÖL-*

LENBACH. 17-21.) - - - III. 627. b.

orientalis. - - - - - c.

1078. THUYA occidentalis. Lebensbaum.

arbre de vie; thuya de Canada. tree of

life. *BLACKW.* 210. (arbor vitae Ph.

du *HAMEL.* arbr. T. II. tab. 90.) I. 166. b.

1079. CV-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

1079. *CYPRESSVS* semperuirens. Cypressenbaum. le cyprès. cypres-tree. *L. m. m.*
 572. *BLACKW.* 127. foemina cum fructu. — — — — II. 448. a.
 mas cum floribus masculis. — — — — b.
1083. *CROTON* tinctorium. Färbepflanze, Sonnenwende. tournesol.; heliotrope. turn-sole. *L. m. m.* 575. — — — — II. 566. e.
 cascarilla. *L. m. m.* 573. *BLACKW.* 577.
CATESBY Carol. II. 46. fig. *WEINMANN.*
 ex *POMET.* f. 114. non respondet. — — — — 302.
 laciferum. *L. m. m.* 577. fig. c. exhibet bacillum generis laccae incrustatum fig. d. plantam alienam, quae haematoxylum refert. Iconem veram v. in *BVRM.* Zeylan. t. 91. cf. Act. *MOGVNT.* 90. — — — — III. 618. c.d.
1084. *IATROPHA* gossypifolia. Brechnuss. noix de Barbades. Barbadoes - nut. IV, 867. b.
 manihot. Brotmürzel, manihot. — — — — 1023. a.
1085. *RICINVS* communis. Wunderbaum. ricin; palme de Christ. Mexico - seed. *L. m. m.* 579. *BLACKW.* 148. (palma Christi Ph. vnde oleum illud vfitatissimum ricini laudatum a multis, v. g. *CANVANE*; *ODIER*; *VIEVSSEVX*; *LEAKE*; *BONELLI.* Cum icone *HVNGER-BYHLER* diff. Friburg. Brisg. 1780.) — — — — 866. a.b.
 varietas: minor. — — — — — c.
 maximus, ruber. — — — — 867. a.

Ord. X. SYNGENESIA.

1090. *MOMORDICA*. balsamina. Balsamapfel; pommé de merveille. *BLACKW.* 539. III. 735. b.
 charan-

charantia.	-	-	-	-	-	-	a.
elaterium. <i>Eselſfürbiß.</i> concomb. sauvage.							
wild cucumber. <i>L. m. m.</i> 580. <i>BLACKW.</i>							
108 (<i>cucumer asinus</i> Ph. <i>REGNAULT.</i>) II.							440. b.
091. CVCVRBITA lagenaria. <i>Flaschens-</i>							
<i>fürbiß</i> calebasse. long gourd. <i>L. m. m.</i> 581.							
<i>BLACKW.</i> 522. (<i>RVMPH.</i> Amb. V. t. 144.)						III. 271. b.	
						II. { 442. a. d.	
						{ 443. a.	
						{ 444. a.	
1. oblonga teres bicubitalis. <i>Brüggelfürbiß.</i>							445. b.
2. collo longiore, incuruo, retortae for-							
mis.	-	-	-	-	-		442. c.
3. matraciformis.	-	-	-	-	-		443. b.
4. oblonga, maculosa maior	-	-	-	-	-		f.
5. oblonga, striata et maculosa minor.							c.
verrucosa; oblonga maior et minor.	-	-	-	-	-		d. e.
varietas: sphaerica.	-	-	-	-	-		446. f. g.
ouifera; pyriformis.	-	-	-	-	-		c.
varietas: aurantii forma.	-	-	-	-	-		d. e.
melo pepo; striata.	-	-	-	-	-		a.
varietas: maculata.	-	-	-	-	-		b.
pepo.	-	-	-	-	-		442. b.
varietas: fructu striato variegato.							{ 444. b.
							{ 445. a.
1092. CVCVMIS sativus. <i>Rufumer.</i> con-							
comb. ordinaire. cucumber. <i>L. m. m.</i>							
585. <i>BLACKW.</i> 4.	-	-	-	-	-		441. b.
anguria. <i>Wassermelone.</i> melon d'eau. citrul.							
<i>BLACKW.</i> 157.	-	-	-	-	-		a.
melo. flavus. <i>Melone.</i> melon. <i>L. m. m.</i> 584.							
<i>BLACKW.</i> 329.	-	-	-	-	-		{ 721. a.
							{ 723. b.
varietas: a. viridis, reticulatus.	-	-	-	-	-		722. a. b.
b. viridis, maculatus et striatus.							723. a.
c. viridis, subangulosus.	-	-	-	-	-		c.

Genus.

Tab. Tom. Lit.

1093. BRYONIA	alba.	Weisse Zaunröbe.					
	brioine;	coulevrée, white bryony.	L.				
	m m.	586. BLACKW.	37. 533. (RE-				
	GNAVLT.)	- - - -	1.	269.	a.		
	laciniosa,	- - - -	—	270.	b.		
	africana.	- - - -	—	269.	b.		
	dubia; bryonioides	PLVKN. 152. I. coeru-					
	lea fideritidis folio	BVRM. - - -	—	270.	a.		

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

Ordo I. MONANDRIA.

1430. PANDANVS	odoratissima.	LIN.					
	suppl. 424. MVNT.	t. 135. THUNBERG.					
	div. p. 16.	- - - -	I.	140.	c.		

Ord. II. DIANDRIA.

1098. SALIX	amygdalina.	- -	IV.	877.	a.		
	vitellina.	- - - -	—	—	c.		
	alba. Weidenbaum.	faule blanc. comon wil-					
	low; falow-tree.	L. m. m. 489. BLACKW.					
	327.	- - - -	—	878.	a.		
	viminalis. Rork,	Bandweidenbaum.	- -	—	877.	b.	
	varietas: morbosa	capitulo squamoso.					
	Weidenrose.	- - - -	—	878.	d.		
	helix; foemina.	- - - -	—	—	b.		
	phylicifolia.	- - - -	—	—	e.		
	purpurea.	- - - -	—	—	c.		

Ord.

Ord. III. TETRANDRIA.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

1105. *VISCUM* album. Mistel. le guy. mis-
fel. *L. m. m.* 588. *BLACKW.* 184. - IV. 1013. b.
1106. *HIPPOPHAE* rhamnoides. Sand-
dorn. fallow-thorn. (Fl. *DAN.* 265.) III. 764. d.

Ord. IV. PENTANDRIA.

1108. *PISTACIA* trifolia, vera. *L. m. m.*
590. *BLACKW.* 461. (du *HAMEL* ar-
bres. T. II. p. 212.) - - IV. 816. a.
terebinthus. Terpentinbaum. terebinthe, pista-
chier sauvage. terpentin - tree. *L. m. m.*
591. *BLACKW.* 478. (terebinthina cypria
Ph. du *HAMEL* arbres. T. II. t. 87.) - 969. a.
lentiscus. Mastixbaum. lentisque; mastiche.
mastick - tree. *L. m. m.* 592. *BLACKW.* 195.
(mastix; lentiscus Ph. du *HAMEL* T. I. t.
136. *TOURNEFORT* voyage du Levant.
T. II. lettr. 9.) - - III. 638. a.
1112. *SPINACIA* oleracea. Spinat; Bis-
netsch. epinars. spinache. *L. m. m.* 593.
BLACKW. 49. - - - IV. 946. a.
1115. *CANNABIS* sativa. Hanf. chanvre.
hemp. *L. m. m.* 594. *BLACKW.* 322. II. 299. a.
1116. *HUMULUS* lupulus. Hopfen. hou-
blon. mas et foemina. *BLACKW.* 536.
a. b. - - - - III. 675. a. b.
1120. *SMILAX* sarsaparilla. *L. m. m.* 598.
BLACKW. 393. (salsaparilla; Zarsa Ph.
PLUCK. phytogr. t. III. f. 2. *REGNAULT.*
la falsepareille.) - - IV. 885.
china

Genus.

Tom. Tab. Lit.

china. Chinawurzel. esquine. chinaroot. *L. m.*

m. 597. *BLACKW.* 433. (china Ph. *KAEMPF.*

amoen. t. 782. *RVMPH.* Amboin. auct. p. 72.

t. 30. *S. G. Smelins Reise durch Russland.*

Th. 3. Taf. 6. *S.* 32. Vocatur a Sinensibus

Laengfantao.) - - -

II. 367. b.

Ord. VI. OCTANDRIA.

1123. POPVLVS alba. Weisser Pappelbaum.

peuplier blanc; abele. white poplar.

BLACKW. 548. - -

IV. 826. a.

tremula. Espenbaum. - -

— — b.

varietas: lybica. - -

— 827 a.

morbosa. - -

— — c.

nigra. Schwarzer Pappelbaum. peuplier noir.

black - poplar. *L. m. m.* 599. *BLACKW.* 248. — — b.

1124. RHODIOLA rosea. Rosenwurzel l'or-

pin - rose. rose - wort. *L. m. m.* 601.

BLACKW. 586. (rhodia Ph. Rhodifer:

wurzel. Fl. *DAN.* 183.) - - *IV.* 968. c.

Ord. IX. ENNEANDRIA.

1125. MERCVRIALIS perennis. Hundsz:

föhl. mercuriale sauvage; chou de chien.

dog's mercury. mas. (Fl. *DAN.* 400.) *III.* 726. b. c.

foemina. - - - — — a.

annua. Bingelfraut. mercuriale. French-mer-

cury. *L. m. m.* 602. *BLACKW.* 162. mas. — — d. e. g.

foemina. - - - — — f.

1126. HYDROCHARIS morsus ranae.

Froschbiss. la morraine. frog - bit. - — 761. a.

Ord. X. DECANDRIA.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- 1127. CARICA** papaya. Papayabaum. papaye. papaw. (*RUMPH.* H. Amboin. I. t. 50. *HUGH.* Barbado. 181. t. 14. 15. *TREW.* t. 7.) - - IV. 797. a. b.

Ord. XI. DODECANDRIA.

- 1132. DATISCA** cannabina. Streichfraut. bastard hemp. - - - III. 676. b.
- 1131. MENISPERMUM** canadense. Mondsaamen. - - - - 675. c.
- coccus. *L. m. m.* 603. *BLACKW.* 389. II. 400. b.
- 1133. CLIFFORTIA** ilicifolia. Kliffort e. III. 533. a.

Ord. XIV. MONADELPHIA.

- 1134. JUNIPERUS** communis Gemeiner Wachholder. genevrier. juniper - tree. *L. m. m.* 605. *BLACKW.* 187. (*SCHÜLENBACH.* Abbild. 22.) - III. 615. e.
- oxycedrus; ex *POMET.* f. 105. - - II. 346. c.
- lycia. *L. m. m.* 606. (olibanum; thus Ph. du *HAMEL* arbres. T. I. p. 140.) Ex iunipero lycia olibanum f. resina thus provenire dicitur; alii amyridis speciei tribuunt. *WEINMANNI* arbor thurifera ab utraque arbore multum differt. cf. *POMET.* 399. f. 298. III. 615. c. d.
- fabina. Ebenbaum. fabine; favinier. favin. *L. m. m.* 604. *BLACKW.* 214. (fabina Ph. du *HAMEL* arbres. T. II. t. 63.) IV. 876. a.

bermu

Genus.			Tom. Tab. Lit.
bermudiana.	-	-	III. 615. a.
virginiana.	-	-	— — b
1135. TAXVS	baccata. Eibenbaum. if; yew-		
	tree. BLACKW. 572.	-	IV. 967. a.
1138. CISSAMPELOS	pareira. Grieswur;		
	gel. pareira brava. American wild wine.		
	L. m. m. 607. (pareira braua. Ph. PLV-		
	MIER. plant. del'Amerique. 78. t. 93.)	—	798. a.
	caapeba. (PISO Ind. hist. nat. p. 261.)	—	— b.
838. NAPAEA	(laevis) hermaphrodita.		
	Virginische Papel.	-	I. 83. b.

Ord. XV. SYNGENESIA.

1139. RVSCVS	aculeatus. Mäufedorn. houx		
	frelon; huis piquant. moufe- doorn. L.		
	m. m. 608. BLACKW. 155. (REGNAULT.)	IV.	875. b.
hypophyllum.	3äpfleinfraut. laurier Alexan-		
	drine à feuilles étroites. double tongue.		
	Hypophyllum LIN. est laurus alexan-		
	drina mas auctorum. Planta vero hoc no-		
	mine a WEINMANNO depicta 634. b. mi-		
	nime respondet. Ceterum mutila, flore		
	fructuque destituta est.	-	III. [633. c. g.
			634. a. b.
hypoglossum.	L. m. m. 510. BLACKW. 128.		
	(vuularia Ph. COLUMN. ecphr. t. 165. fig. 2.)	—	633. f.
racemosus.	-	IV.	875. a.



CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

Ordo I. MONOECIA.

Genus.

Tab. Tom Lit.

1141. MVSA paradisiaca. Paradiesäpfel.
 musa. plantain-tree. (Bananas ; Pisang) { I. { 227.
 baum. patria: insulae Maldivae, Madeira, } { 229. a.
 insulae oceani australis.) - - { III. 737. a.
 { IV. 785. b.
 sapientum? (Musa paradisiaca et sapientum
 auctore FORSTER vna eademque est species.) l. 228.
1144. VERATRUM album. Weiße Nies-
 wurzel mit blassen Blumen. ellebore blanc.
 white ellebore. L. m. m. 614. BLACK. 74. III. 568. d.
 nigrum. Weiße Nieswurzel mit rothen Blü-
 men. - - - - - e.
1145. ANDROPOGON schoenanthus. Warts-
 gras. jonc odorat. L. m. m. 612. - IV. 890. c.
 nardus. Grasnarde. POMET. f. 169. L. m. m.
 613. - - - - - 945. b.
1146. HOLCVS sorghum. Indischer Hirse;
 (Raffertorn.) grand millet noir ; millet
 d'Afrique. (Ab Hottentotis et Cafris in
 Sizicamma et Gonaquas, teste SPAR-
 MANN, agri feminantur holco sorgho.
 Parant etiam ex holco hoc, et radice ali-
 qua incognita et aqua, ope fermenta-
 tionis potum spirituosum.) - III. 729. b.
 bicolor. - - - - - b.2.
1151. VALANTIA muralis. Vaillantie. II. 439. d.
 cruciata. croifette velue. - - - - - e.

1152. PA-

Genus.

Tab. Tom. Lit.

- 1152. PARIETARIA** officinalis. *C. Peters*;
 kraut; Tag- und Nachtkraut; Glaskraut.
 parietaire. pellitory of the wall. *L. m. m.*
 615. *BLACKW.* 156. (*Fl. DAN.* 521.) IV. 798. c.
 iudaica. - - - - - e.
- 1153. ATRIPLEX** hortensis; alba. *Melben.*
 arroche; bonnes dames. white orache.
L. m. m. 616. *BLACKW.* 552. 99. I. 204. a.
 varietas: rubra. - - - - - b.
 halimus. Meerportulak. halimus. seapurslane. III. 563. b.
 portulacoides. - - - - - c.
 laciniata. - - - - - { — a.
 { I. 202. b.
 hastata. - - - - - — 200. c.
 littoralis. - - - - - — 202. a.
 patula. - - - - - — 200. b.
- 1155. ACER** pseudoplatanus. *Grosser Ahorn*;
 baum, l'erable blanc; sycomore. great
 maple; sycomore - tree. (du *HAMEL*
 arbr. T. I. t. 36. f. 1.) - - - 16. b.c.
 rubrum. - - - - - 17.
 platanoides. - - - - - 15. a.
 campestre. - - - - - 14. b.
 varietas: morbosa ex aphidibus. - - - 16. a.
- 1158. MIMOSA** inga. *Mimose.* - III. 605. d.
 nilotica. Arabisch Gummipflanze. *L. m. m.* 617.
BLACKW. 377. (gummi arabicum. acacia
 vera Ph. cf. *VESLING* pl. Aegypt. cap. 4.
 t. 50. *Lugd. Bat.* 1735. *HERNANDEZ*
 Mexic. p. 866. *HASSELQVIST* refa. p. 475.
ADANSON mem. de l'acad. d. sc. de Paris
 1773. p. 4. gommier rouge; nebneg Se-
 negalensium. Egyptische oder Nilsumpflanze;

Egyptische Acacie oder Schotendorn. In Africa australi et quidem in Houtniquas eam observavit SPARRMANN.)					I.	10.	c.
cornigera. (JACQVIN. sel. stirp. Americ. hist. 129. cf. SEBA thesaur. I. p. 113. t. 70. f. 13. PLVKN. Alm. III. t. 122. f. 1. COMMEL. H. Amst. I. p. 209. t. 107. crescit passim in silvis Carthagenae; Junio et Julio floret; maturescunt semina Septembris. Incolis vocatur: cuernezucla.)					I.	10.	c.
pudica. Brasilianische M. figura parum accurata. v. meliorem in COMMELIN. H. Amstel. I. 29.					—	12.	a.
casta.					III.	730.	d.
sensitiva? Fühlende M. sensitive.					—	—	f.
virgata.					—	—	e.
scandens.					—	—	g.
semen huius, cor S. Thomae.					IV.	808.	c.
farnesiana.					III.	731.	a.
fernambucana.					—	—	b.

Ord. II. DIOECIA.

1159. GLEDITSIA triacanthos. Dreidör-
nige Acacie. honay'-locust. I. 11. a.
1160. FRAXINVS excelsior. Esche. frêne.
common ash - tree. L. m. m. 620.
BLACKW. 328. II. 515. a.
ornus. L. m. m. 621. III. 709. a.
1161. DIOSPYROS lotus. Mespel, Lotus-
baum. guaiacane. date - plum. — 559. a.
varietas: angustifolia. — — c.
virginiana. (KALM Reise nach Nordamerika.) — — b.

1164. AN-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

1164. *ANTHOSPERMUM* aethiopicum.
 Amberbaum. amber-tree. Hort. *CLIFFORT.* t. 29. - - - I. 166. c.
1165. *ARCTOPVS* echinatus. *BURM.* Afr.
 t. 1. - - - II. 486. b.
1166. *PANAX* quinquefolium. *Krafftwurzel.*
 ginseng. ninseng. *L. m. m.* 622.
BLACKW. 513. (ginseng Ph. *LAFITEAU*,
 mem. concernant la precieuse plante de
 ginseng. à Paris. 1718. *BREYN.* prodr.
 plant. rar. II. p. 35. *TREW.* Ehret.
 Tab. 6, f. 1. du *HALDE* descript. de la
 Chine. T. II. p. 180. Habitat praeter
 Tatariam Sinensem etiam in Canada,
 teste *KALM*, *SARRASIN*, et *BAR-*
TRAM.) - - - II. 432. a.

Ord. III. TRIOECIA.

1167. *CERATONIA* filiqua. *C. Johann*
 Brodbaum caroubier. carob-tree. *L.*
m. m. 623. *BLACKW.* 209. (filiqua dul-
 cis Ph. du *HAMEL* traité des arbres, T. II.
 p. 262. tab. 69.) - - - IV. 922. a.
1168. *FICVS* carica. Feigenbaum. figuier.
 fig-tree. *L. m. m.* 624. *BLACKW.* 125. II. 508. d.
 bengalensis. - - - - - e.
 fycomorus. Egyptischer Feigenbaum. v. *RAV-*
WOLF. Reise. p. 57. reperitur etiam, illo
 teste in Cypria, cuius fructus a pauperibus
 comedebantur. *HASSELQVIST* Reise.
 495. *PLVKN.* t. 173. f. 3.) - - - IV. 956. a.

CLASSIS XXIV. (*)

CRYPTOGAMIA.

Ordo I. FILICES.

a. Fructificationes spicatae.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

1169. *EQVISETVM* aruense. *Rosßschwanz*.
 prêle; queue de cheval. horse - tail. *L.*
m. m. 625. BLACKW. 217. - II. 480. b.
filuaticum. - - - - - 479. f.
palustre. - - - - - 480. c.
fluuiatile. Schafstheu, petite queue de cheval.
marfh horse - tail. - - - - - a.d.
limosum. HALLER. enum. fl. nr. 4. - 479. d.
hiemale. CAMERAR. ep. 770. - - - e.
1170. *ONOCLEA* sensibilis. *Jüßlfarn. fou-*
gere sensitive. - - - - - 511. c.
1171. *OPHIOGLOSSVM* vulgatum. *Nas-*
terzünglein. langue de serpent. adders
tongue. BLACKW. 416. (Fl. DAN. 147.) III. 765. b.c.f.
varietas: bilingue, trilingue. - - - e.d.
1172. *OSMVNDA* struthiopteris. *flowe-*
ring - fern. - - - - - II. 509. a.
lunaria. Mondraute. lunaire. moonwort.
BLACKW. 420. (Fl. DAN. 18.) - III. 673. e.f.
 b. Fructificationes frondosae, in pagina inferiore.

(*) (Iac. DICKSON fasciculus plantarum cryptogamicarum Britanniae, Londini 1785. 4. editus, bene conferri meretur.)

Genus.

Tom. Tab. Lit.

- 1173. ACROSTICHUM** septentrionale.
vollblühender Hornfarn. (Fl. *DAN.* 65.) I. 26. e.
- 1174. PTERIS** aquilina. Großes Farnkraut.
fougere commune ou femelle. female
fern; common brakes. *BLACKW.* 325. II. 511. b.
cretica. - - - - III. 668, d.
- 1178. ASPLENIVM** scolopendrium.
Hirschjunge. langue de cerf. scolopend-
re. *L. m. m.* 627. *BLACKW.* 138. — 667. a.
varietas: a. crispum. - - — { — c.
668. a.
b. maximum, folio undulato. — 667. b.
c. folio multifido ramosum. — 668. b.
d. folio frondescente. - — — c.
- ceterach. Kleines Milzkraut. ceterac; vraie
scolopendre, spleen-wort. *L. m. m.* 628.
BLACKW. 216. - - - II. 1360. d.
- ruta muraria. Mauerrauhe. rüe de mur. white
maiden-hair. *L. m. m.* 630. *BLACKW.* 219.
(Fl. *DAN.* 190.) - - - I. 26. c.
- trichomanes ramosum. Frauenhaar. polytric.
black maiden-hair. *L. m. m.* 629.
BLACKW. 370. - - — — d.
- 1179. POLYPODIVM** vulgare. Engelsfuss.
polypode de chene. polypody of the { II. { 509. d.
duck. *L. m. m.* 631. *BLACKW.* 215. { IV. { 510. d.
825. h.
- filix mas. Farnkraut. fougere mâle. common
mâle fern. *L. m. m.* 632. - - II. 510. a.
- cristatum. - - - - III. 672. a.a.
- louchitis. (Fl. *DAN.* 497.) - - II. 510. c.
- thelypteris. - - - — — b.
- fragile. (Fl. *DAN.* 401.) - - — 511. a.d.

rhae-

Genus.

Tom. Tab. Lit.

rhaeticum. an varietas fragilis?	-	-	-	e.
dryopteris, et fontanum.	-	-	I.	26. a.a.

1180. ADIANTHVM capillus veneris. *Be-
nußhaar. capillaire de Montpellier; che-
veux de Venus. true maiden - hair. L.
m. m. 633. BLACKW. 367.* - - - b.
c Fructificationes radicales.

1182. MARSILEA quadrifolia. *Bierblättrig-
e Wasserlinse.* - - - III. 637. e.

Ord. II. M V S C I.

1185. LYCOPODIVM clauatum. *Bärkla-
pe; Gürtelfrant. pied de loup. club-moss.
L. m. m. 634. BLACKW. 535. (Fl.
DAN. 126.)* - - - 737. c.
alpinum. (Fl. DAN. 79.) - - - d.
1187. SPHAGNVM palustre. *Sumpfsmoos.
(Fl. DAN. 474.)* - - - 739. a.
1192. POLYTRICHVM commune. *Gul-
den Wiederton. perce - mousse. golden
maiden - hair. L. m. m. 636. BLACKW.
375.* - - - I. 27. a.
1193. MNIVM hygrometricum. *Sternmoos.* - 26. f.
annotinum. - - - - - g.
serpyllifolium: a. proliferum, roseum. III. 738. i.
b. undulatum. - 739. c.
1195. HYPNVN sericeum. *Astmoos.* - 738. f.
triquetrum. - - - - - g.

Ord.

--- --- Ord. III. ALGAE.

I. Terrestres.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

1198. MARCHANTIA polymorpha. Steins
 leberfraut. hepaticque. liver - wort. III. 648. c. d. e.
 conica. (Fl. DAN. 274.) - - - a b.

1202. LICHEN rangiferinus. Kennthiers
 moos. an fraxineus? - - - 739. e.
 fraxineus? - - - 738. e.
 deformis. - - - h.
 plicatus. Eichenmoos. mousse d'arbre; ulnée
 commune. hairy tree - moss. - 739. d.
 barbatus. - - - 738. b.
 pulmonarius. Lungenmoos. hepaticque des bois.
 treelungwort. L. m. m. 639. BLACKW. 335. - 739. g.
 prunastri. - - - f.
 caninus. Aschfärbiges Erdleberfraut. hepaticque
 terrestre cendrée. ground liverwort. { 648. e.
 L. m. m. 641. BLACKW. 336. - { 7. 8. f.
 cocciferus. - - - 738. a.
 pyxidatus. Flechmoos. mousse en forme de
 boete. cup - moss. - - - c.
 fimbriatus. - - - b.

2. Aquaticae.

1204. TREMELLA iuniperina. - II. 522. h.
1205. FUCVS ferratus. Meerlinsen. herbe
 flottante; fargasse. sea - lentils. - III. 670. b.
 foeniculaceus. (GMELIN. fuc. 86. t. 2. a. f. 2.) - - a. d.
 furcellatus. (Fl. DAN. 419. GMELIN. 103.
 t. 6. f. 2) - - - 669. g.
 cartilagineus. (GMELIN. 158. t. 17. f. 2.) - - h.
 ciliatus. (GMELIN. 173. t. 10. f. 2.) - - e f
 aculeatus. (Fl. DAN. 353. GMELIN. 130.
 t. 12.) - - - 670. c. f.
 1206.

1206. VLVA lactuca. Seeleberfraut. hepaticque de mer. oyster-green. - — — e.

Ord. IV. FVNGI.

a. Pileo donati,

1209. AGARICVS cantarellus. quoad nomen
figura accedit ad rubescentem *SCHAEFF-*
FERI. T. 73. - - - II. 522. b.
luteus. - - - — 524. e.e.
muscarius. *SCHAEFFER. T. 27. f. 1.* - — — i.
fuscus pustulatus *SCOPOLI 1461. SCHAEFF-*
FER. T. 90. - - - — 525. a.
piperatus. - - - — { 522. e.
524. f.
525. e.
rubens *SCOPOLI 1460.* - - — 522. d.
integer. *SCHAEFFER T. 92.* - — — c.
S. Georgii. - - - — 524. a.
violaceus. *SCOPOLI 1470.* . - - — 525. f.
campestris. Pilze. champignon. musk-room.
an boletus bouinus? - - — — b.
delitiosus. - - - — 524. g.
sericeus. *SCHAEFFER t. 24.* - - — — k.
qui fungus candidus. - - - — — l.
cinnamomeus. - - - II. 525. g.
caulescens albus, stipite fusco, pileo plano
H. *SVEC. 1197.* - - — 522. a.
lateralis. *SCHAEFFER t. 71.* - — 523. d.
conicus. *SCHAEFFER. 2.* - - — — b.
rufiula. *SCOPOLI 1502.* - - - — — e.g.
tener. *SCHAEFFER 62.* - - — — k.
dentatus. - - - — — f.

campa-

Genus.				Tom. Tab. Lit.	
campanulatus.	-	-	-	—	524. b.
procerus. <i>SCOPOLI</i> 1465. <i>SCHAEFF.</i> 23.				—	525. c.
1210. BOLETVS ; agaricus officinarum.					
Edcherpilz. agaric. agarick.	-	-	-	III.	627. a.
granulatus.	-	-	-	III.	522. g.
uberofus.	-	-	-	—	523. i.
1212. PHALLVS esculentus. Morchel;					
Schwamm. morille.	-	-	-	—	— h.
varietas: bifida.	-	-	-	—	524. a.
impudicus ; phalloides <i>DALE</i> pharm. p. 64.				—	525. c. ^a
b. Pileo destituti.					
1215. PEZIZA lentifera. Becherpilz. (Fl.					
<i>DAN.</i> 469.)	-	-	-	—	523. c.
cochleata.	-	-	-	—	522. f.
1216. CLAVARIA coralloides. Korallen;					
Schwamm ; ästiger Reulenpilz.	-	-	-	—	525. d.
1217. LYCOPERDON bouista. Bovist,					
Staubpilz. bovist ; vesse de loup. puffball.	—	—	—	523.	a.
ceruinum. Hirschbrunst.	-	-	-	—	524. d.
tuber. Trüffel, Tartuffel. truffe. trubs ; deers-					
ball.	-	-	-	—	c.

A P P E N D I X.

P A L M A E.

I. Flabellifoliae.

1219. CHAMAEROPS humilis. Zwergs					
palme.	-	-	-	IV.	784. a. b.
1220. BO-					

1220. BORASSVS flabelliformis. bdellium.

L. m. m. 658. Act. *MOGVNT.* 100. Cucio-
phora *THEOPHRASTI.* palma thebai-
ca *POKOKE* itiner. I. t. 72. 73. bdellifera
arbor *WEINMANN.* ex *POMET.* petita et
mutata p. 397. f. 204. prorsus ab hac di-
versam arborem ficus fructum referen-
tem exhibet. - - - I. 232. b.

1221. CORYPHA vmbraclifera. gummi

caranna fundens. Caranna *L. m. m.* 656.

POMET. p. 295. f. 293. - II. 304.

2. Pennatifoliae.

1224. COCOS nucifera. Rosusbaum. (*JAC-*

QVIN sel. fl. Americ. hist. p. 135. t. 253.

BROWN. Jamaic. I. p. 341. *PLVKN.* Alm.

275. calappa *RVMPH.* Amb. I. p. 1. t. 1.2.

tenga *REED* Malab. I. p. 1. t. 2. - 4. nu-

cleus cocos aqua est repletus *SONNE-*

RAT in: voyages a la nouvelle Guinée

iconem et descriptionem huius f. Salo-

monis f. Maldiuensis pulchram dedit. Dr.

G. *FORSTER* in commentat. botan. de

plantis esculentis insularum oceani au-

stralis. Berol. 1786. 8. narrat, quod Ta-

hiti ex nucibus cocos, radicibus diosco-

reae a'atae et musae paradisiacae fructu

gratum conficere solent pulmentum) IV. 780. c.

fructus cum pericarpio. - - - 781. b.

nux. - - - - - 782. a.

arbor. - - - - - 782.

Fructus feminudus et nuclei transuersim
fecti.

Genus.

Tom. Tab. Lit.

1224. PHOENIX dactylifera. Datelpalme.

L. m. m. 649. BLACKW. 202. — 783.

1225. ARECA catechu. Arefapalme. L. m. m.

ed. II. 548. BLACKW. 387. terra catechu officin. paratur ex minosa catechu L. suppl. 439. m. m. ed. III. 619. (Qui ex areca, terram catechu confici existimant plures sunt. cf. MURRAY apparatus medicam. Vol. II. Goettingae 1779. §. p. 415. sqq. eiusd. diss. respond. WERTMÜLLER de catechu. ibid. 1779. 4. India orientalis arecae catechu patria habetur, ubi vocatur: pinang. Oleracea vero, longe ab illa diversa, in America habitat, altissima quaeque palma inter Americanas. Incolae Caribaeorum apices truncorum virides amputant, exemptaque parte interna, eam in foro oleraceo sub nomine: choux palmiste s. brassica palmarum vendunt, quae cum pipere et sale vel cruda, vel cum butyro frixa, vel patinaria comeditur. Habet saporem cynarae. v. JACQUIN Americ. p. 135. sapidam arecam SOLANDER descripsit.) — — — II. 501. d.

1226. ELATE filuestris. Tannenpalme. II. 502.

3. Bipennatifoliae.

1228. CARYOTA vrens. Brennpalme. — 503.

PLAN.

PLANTAE BARBARAE

minus notae, quarum icones imperfectae.

Tom.Tab.Lib.

ARBOR THVRIFERA WEINMANNI. Fi-

gura ex *POMET.* 298. p. 399. mutilata
et magnitudine aucta. Thus f. oliba-
num refina officinalis ex iunipero lycia
colligitur. v. *L. m. m.* 606. gen. nr. 1134.
Act. MOGVNT. 93. praestantior forte ex
amyridis specie. - - I.

165. d.

ARBOR AFRICANA VESICARIA W. a

VOLCKAMERIO communicata, an apocyni
species ab infectis laesa? - - —

166. a.

ASTEROIDES AMERICANA NO-

DOSA W. ex *MVNTINGII* phyto-
graphia tab. 119. Chrysanthemum Ame-
ricanum tuberosum, buglossi foliis. *KIG-*
GELAAR ap. *MVNTING.* p. 24. an ad
GORTERIAS referenda? - - I.

196. a.

BALSAMI PERVVIANI ARBVSCV-

LA. W. figura *POMETI* vitiosa, mu-
tilata, aucta, 302. p. 411. Peruifera *L.*
m. m. 654. Myrexylon Peruifera *L.*
suppl. 233. an Houmiri balsamifera *AV-*
BLET Guian. 564. t. 225? - - —

225. a.

BALSAMI TOLVTANI ARBVSCV-

LA. W. *POMET.* 304. p. 417. fig. im-
perfecta. *L. m. m.* 306. gen. 524. — — b.

BDEL-

BDELLIFERA ARBOR de qua gummibdellium. W. figura aliena *POMET.* 204.p. 397. *L. m. m.* 658. Act. *MOGVNT.*100. provenit ex palma thebaica; *POC-**KOKE* itiner. I. tab. 72. 73. quae Borassiusflabelliformis. *L. gen.* 1220. —

232. b.

BELLIS MYRTIFOLIA HVMILIS f.*Canna vera BVRMANNI* apud *W.* ex co-dice Hamptonienfi, apud *PLVCKNET*phytogr. 50. *MORISON.* III. p. 29. nr.

13. planta diuerfi generis in bellide. —

239. d.

BVLBVS CAPENSIS incolis *HARO* di-ctus. *BVRMANN* apud *W.* forte gla-

dioli cuiusdam Africani aut affinis plan-

tae ordinis ensatarum, vel coronariarum;

dulcis & grati saporis. — — —

273. c.

CALAMVS VERVS f. *amarus* W. iconprorsus aliena ex *POMET.* f. 93. p. 19.

acori veri radix officinarum colligitur

ex acoro calamo. *L. m. m.* 257. cuiusicon extat apud *WEINM.* I. tab. 25. II.

281. d.

CANCANVM, ex qua gummi kikekune-malo. W. ex *POMET.* 300. p. 403. v.*DALE* m. m. p. 381. *POMET* eandem ar-

borem esse putat cum ea, ex qua gum-

mi anime colligitur, quae ex *Hymenaea**courbaril.* *L. m. m.* 295. gen. 512. ap.*WEINM.* I. 137. c. d. — — —

295. c.

CARANNA W. fig. ex *POMET.* 293. p. 295.*L. m. m.* 656. icon *Corypham* refert ex

palmarum ordine. — — —

304.

- CVLILAVAN** f. coelit lauan. W. icon ex
VALENT. museo mus. app. Laurus cu-
 lilaban. *L. mantis.* 237. m. m. 237.
RUMPH. Amboin. II. p. 65. t. 14. — 447. a.
- ELEMIFERA** ex quagummi elemi fluit. W.
 Ex *POMET.* 290. p. 391. fig. aliena quae
 Elaeagnum refert. v. *L. m. m.* 270. Amy-
 ris elemifera. *JACQUIN* Americ. 107. I.
CATESBY Carol. II. t. 33. *L. gen.* 473. — 476. c.
- LAVRVS ALEXANDRINA MAS.** W.
 icon plantae alienae a Rusco hypoglossio
 prorsus diuersa, Euonymo affinis. III. 634. b.
- LACCIFERA ARBOR.** W. icon plantae
 alienae, quae potius Haematoxylum
 campechianum *L.* refert; sed spinae de-
 ficiunt. Lacca colligitur ex ramulis Cro-
 tonis lacciferi ab infectis laesi; v. *L. m.*
m. 577. Act. *MOGUNT.* 90. Plantae ico-
 nem dat *BURMANN* Zeylan. t. 91. — 613. c.d.
- LIGNVM ALOES** f. *Agallochum* W. fig.
 ex *POMET.* mutata, 125. p. 46. Agallo-
 chum. *L. m. m.* 662. *DALE* 380. Arbor
 nondum satis nota. v. *KAEMPFER* p. 903.
RUMPH. Amboin. II. 9. Excoecaria agal-
 locha. *L. gen.* 1102. *Pflanzenystem* II. p.
 422. — — — — — 649. a.
- LIGNVM ANISI.** W. *VALENTIN* Am-
 boin. III. secundum *POMET* p. 151. ea-
 dem est arbor, quae anisum molucca-
 num f. stellatum fert. Illicium anisatum
L. g. 611. m. m. 510. — — — — — b.

Genus.

Tom.Tab.Lit.

LVNARIA CHYMISTARVM. W. ex

MVNTING. t. 208: qui iconem ex codice Oelingeriano habuit. v. *SCHMIEDEL* praefat. ad C. *GESNERI* opera botanica: p. 54. Icon ficta videtur instar *Aconiti paradalianches MATTHIOLI*, oper. ex edit. *BAVHIN.* p. 762. *Doronicum L.* gen. 959. - - - - - 673. g.

MACER ARBOR. W. Ex *MVNTING.* t. 13.

an planta ficta, saltem nondum satis nota. v. C. *BAVHIN.* pin. 408. - - - 691. a.

MYRRHA. W. fig. mutata ex *POMET.* 282.

f. 381. Myrrha, *DALE* m. m. 355. *L.* m. m. 657. an species *Mimosae*, *BRUCE.* Act. *MOGVNT.* 100. an *Amyris* species *FORSKAEL* Fl. *AEGYPT. ARAB.* p. 80? - 743. a.

PALMA GVINEENSIS vinifera. W. Fi-

gura accedit ad *Musam paradisiacam, L.* gener. 1141. - - - IV. 784.

Plurimae aliae plantae dubiae huius operis *WEINMANNIANI* secundum genera, quibus adscriptae sunt, in indice systematico supra illustratae sunt. —



Accedunt ex REGNO ANIMALI
LITHOPHYTA et **ZOOPHYTA**
 CORALLIORVM nomine VEGETABILIBVS
 adscripta.

LITHOPHYTA.

Syst. Natur.

R. Animal.

ed. XII.

VERMES.

Genera.

336. **TVBIPORA** musica. L. 1. Meerorgel.
 (das Orgelwerk.) orgue de mer. the
 red organ coral. (Alb. *SEBA* thesaur.
 T. III. tab. 110. fig. 9. 10. p. 204. alcyo-
 nium veterum. *EDW.* av. t. 93. f. 3.
RVMPH. Amboin. VI. t. 85. f. 2. Fre-
 quens ad oras maritimas Indiae orienta-
 lis occurrit) - - - IV. 982. a.
337. **MADREPORA** oculata. L. 36. m. m.
 66. Weiße Korall. corail blanc. white
 coral. *BLACKW.* 342. 2. (*SEBA* III. t.
 116. f. 1. 2. p. 211. *GUALTIERI* T. II.
 p. 88. in mare mediterraneo.) - II. 426. g.
- virginea. L. 37. (*PALLAS* Zooph. 180. *MAR-*
SIL. mar. t. 30. f. 140. in mare atlantico
 et mediterraneo.) - - - c.
- muricata. L. 33. (*SEBA* III. t. 108. f. 6.
 p. 199. ex Curassao. t. 114. f. 1. p. 209. ex
 oceano vtriusque Indiae. t. 116. f. 5. p. 212.
SLOANE Jamaic. I. t. 18. f. 3. t. 17. f. 4.

RVMPH.

Genus.

Tom. Tab. Li.

- RVMP* ? Anboin VI. t. 86. f. 1. 2. *GVALTIERI* t. 25. *PALLAS* 194.) - - - 428. b
- damicornis : ramus. L. 32. (*PALLAS* 197. *RVMPH.* VI. p. 240. t. 86. f. 3. *GVALT.* 104.) - - - - - 426. i.
- porites. L. 31. (*SEBA* III. t. 109. f. 11. p. 202. ex Curassac. *PALLAS* 192. *GVALTIERI.* 20.) - - - - - b.
- ste. aris. *PALLAS* 191. p. 323. (ad litora Gotlandiae.) - - - - - a.
338. *MILLEPORA* alcicornis. L. 40. cum vestigiis ifidis nobilis s. corallio rubro. *BLACKW.* 343. (*PALLAS* 161. *RVMPH.* VI. p. 243. *SLOANE* I. t. 17. f. 1. India vtraque) - - - - - 426. b.

ZOOPHYTA.

340. *ISIS* nobilis. L. 6. m. m. 67. Nothe Rosalle. corail rouge. red coral. *BLACKW.* 341. 2. b. (*PALLAS* 142. mare mediterraneum.)
- a. corallum rubicundissimum. - II. 426. e.
- b. idem pallide rubens. *BLACKW.* 341. II. - - - - - f.
- c. idem milleporae alcic. innatum. - - - - - d.
341. *GORGONIA* antipathes. L. 9. Schwarze Keraile. corallium nigrum. Ph. corail noir. swarte coral. *BLACKW.* 344. (*SEBA* III. t. 104. f. 2. p. 193. acaarbaar nigrum in India orientali vocatur ; et ad ornamenta atque armillas adhibetur.

- Reperitur in primis circa infulas Amboi-
nenses et Moluccas. *RUMPH.* VI. p. 196.
t. 77. *PALLAS.* 124.) - - - 426. d.
ceratophyta. L. 6. cortice denudato, murici
faxatili adnata. (*SEBA* III. t. 107. f. 3. p. 197.
ex promontorio Africano bonae spei. *PAL-*
LAS 117. *CATESBY* Carolin. II. t. 13. mare
Atlanticum et Americanum.) - - - 427. a.
pinnata. L. 11. (*SEBA* III. t. 114. f. 3. p. 193.
PALLAS 106. Hort. *CLIFFORT.* 489.) - 519. b.
lepadifera. L. 1. (*PALLAS* 131. gorgonia re-
feda. *CLVSII* exot. 122. t. 123. Norue-
giae ora.) - - - - - a.
ventalina. L. 15. (*PALLAS* 101. *RUMPH.* VI.
p. 205. t. 79. f. 1. H. *CLIFFORT.* 840. India
orientalis.) - - - - - 427. e.
flabellum. L. 16. (*PALLAS* 104. *ELLIS* co-
rall. 61. t. 26. f. k. *CLVSIVS* 120. oceanus.) - - b.
345. *TVBVLARIA* acetabulum. L. 6. *Fes-*
derbusch Polyp. Corallina androsace, *PAL-*
LAS 430. (*BROWN.* 74. tab. 40. f. A. mare
mediterraneum et Americanum.) IV. 1019. b.
346. *CORALLINA* officinalis. L. 2. m. m.
68. *Korallenmoos.* mouffe marine; co-
ralline. seacoralline; white worm seed.
(*SEBA* III. t. 100. f. 13. - 15. p. 189.
maritimus C. *BAVH.* fucus capillaceus
DELECHAMP. *PALLAS.* 422. mare me-
diterraneum et anglicum.) - - - II. 427. d.d.
347. *SERTVLARIA* abietina. L. 5. *Meers-*
moos. mouffe de mer. sea-moss. (*PAL-*
LAS 81. *PLVKN.* Amb. 119. t. 48. f. 5.
Oceanus.) - - - - - c.

TESTACEA.

325. *MVREX saxatilis* L. 525. Brandhorn.
 (SEBA III. t. 77. f. 4. - 6. f. 172. *RVMPH.*
 t. 26. f. (. 2.) - - - - 428. a.

INSECTA.

LEPIDOPTERA.

231. *PAPILIO polychloros*. L. 166. (der
 grosse Fuchß. *ROESEL* insect. I. app. I.
 t. 2. *AMMIRAL*. t. 15. *MERIAN*. 2. t. 2.
 in pyro: cerafo; salice, odorem moscha-
 tum exspirat.) - - - I. 127.
urticae. L. 167. (der kleine Fuchß; Nesselbo-
 gel. *ROESEL* I. pap. 1. t. 4. *MERIAN*. I. t. 44.) - 141.
podalirius. L. 36. (Egelsvogel. *ROESEL*. p. 2.
 t. 2. *MERIAN*. 163. f. 44. in brassica.) - 152.
 232. *SPHINX conuoluuli*. L. 6. (*ROESEL*.
 inf. I. phal. 1. t. 7. *MERIAN*. 39. t. 75.
 f. 2. t. 25.) - - - 205.

NEVROPTERA.

234. *LIBELLULA virgo*. β . L. 20. (Was-
 serjungfer. *RAI*. inf. 50. nr. 10. *REAV-*
MVR. inf. VI. t. 35. f. 7.) - - 185.

- γ. (*ROESEL* aqu. 2. t. 9. f. 5. *RAI.* 50. nr. 9.
et p. 140. nr. 2. ad fluuia Europae.) — 133.

HYMENOPTERA.

248. *APIS* terrestris. L. 41. (*Hummel.* *RAI.*
247. nr. 5. *FRISCH.* inf. 9. t. 13. f. 1.
SCHAEFFER elem. t. 20. f. 6. Europa.) — 168.

DIPTERA.

252. *TIPVLA* crocata. L. 4. (*SCOPOLI*
Carn. 845. *RAI.* 72. nr. 4. *REAVMVR.* 5.
t. 1. f. 14. - 16. Europa.) — 150.

APTERA.

267. *PHALANGIVM* opilio. L. 2. (*Hesl.*
spinne; *Schuster*; *Weberknecht.* *SCOPO-*
LI 1122. *RAI.* 39. nr. 35. Europa.
America. Noctu circumuagatur.) — 142.



Index et tabularum pictarum et paginarum libelli systematici,

Genus.	Pag.	Tabula.
Abrus.	122.	819.
Acanthus.	107.	13.
Acer.	165.	14. - 17.
Achillea.	143.	7. 496. 729. 730. 837.
Achyranthes.	34.	98.
Aconium.	94.	21. - 24.
Acorus.	58.	25. 281.
Acrostichum.	169.	26.
Actaea.	91.	380.
Acyntha.	54.	75.
Adiantum.	170.	20.
Adonis.	97.	27. 28.
Adoxa.	63.	737.
Aegopodium.	44.	131.
Aesculus.	60.	342.
Aethusa.	42.	384. 729.
Agaricus.	172.	522. - 525.
Agave.	57.	42. 63. 65. 66.
Agrimonia.	76.	29.
Agrostemma.	74.	677. 678. 685. 686.
Agrostis.	11.	554.
Ajuga.	100.	407.
Aizoon.	80.	616.
Alcea.	119.	693. - 695.
Alchemilla.	19.	36. 37.
Aletris.	55.	45. 62. 74.
Alisma.	60.	855.
Allium.	49.	38. 39. 349. 734. 828.
Aloe.	55.	42 44 46. - 51 54. 56. - 60. 63. 65. 66. 68. - 73.
Alpinia.	2.	527.
Alfina.	46.	106.
Althaea.	118.	35. 79.

Alyf-

Genus.	Pag.	Tabula.
Alyssum.	113.	973. 974.
Amaranthus.	154.	88 - 91. 93. 94. 95. 99. 252.
Amaryllis.	49.	652. 653. 747.
Amomum.	1.	101. 305. 306. 1025.
Amorpha.	123.	547.
Amygdalus.	80.	101. 102.
Amyris.	61.	223. 476.
Anacardium.	61.	104. 105.
Anagallis.	25.	106. 107.
Anagyris.	66.	618.
Anastatica.	111.	974.
Anchusa.	21.	271. 272.
Andropogon.	164.	890. 945.
Anemone.	95.	118 - 128. 570. 838. 839. 856.
Anethum.	43.	129. 513.
Angelica.	41.	130. 132. 136.
Anthemis.	143.	239. 363. 364. 378. 840.
Anthericum.	53.	45. 184. 807.
Antirrhinum.	109.	143. - 145. 169. 476. 664. - 666.
Antholyza.	9.	546. 925.
Anthospermum.	167.	166.
Anthoxanthum.	7.	556.
Anthyllis.	123.	142. 230. 533. 980.
Aphanes.	20.	36. 890.
Apium.	44.	138. 150. 806.
Apocynum.	36.	153. 154. 166. 492.
Aquilegia.	94.	160. - 164.
Arabis.	114.	470. 918.
Arachis.	123.	759.
Aralia.	46.	137.
Arbutus.	69.	166.
Arctium.	135.	231. 232.
Arctopus.	167.	486.
Arctotis.	146.	594.
Areca.	175.	501.
Arenaria.	73.	77. 78.
Aristolochia.	150.	167. 168. 817. 916.
Arnica.	141.	469.
Artemisia.	138.	4. 7. - 9. 170. 171. 368. 471.

Arum

Genus.	Pag.	Tabula.
Arum.	150.	172. 177. 472. 670.
Arundo.	12.	179. 226. 554.
Afarum.	75.	181.
Asclepias.	36.	151. - 153. 1011.
Aspalathus.	122.	532. 533.
Alparagus.	53.	181. - 183.
A'perugo.	22.	148.
A'perula.	18.	714. 872. 873.
A phodelus.	53.	184. 185.
Asplenium.	169.	26. 360. 667. 668.
Aster.	140.	187. 191. 193. - 196.
Altragalus.	128.	197. 199. 977.
Athamanta.	40.	458. 647.
Athanasia.	137.	598.
Atractylis.	137.	594.
Atriplex.	165.	200. 202. 204. 563.
Atropa.	28.	235. 708.
Auena.	12.	205.
Auicennia.	111.	104.
Baccharis.	139.	422.
Ball ta.	104.	711.
Bafella.	46.	936.
Bellis.	142.	236. 237.
Berberis.	48.	240. 687.
Beta.	38.	241. 242.
Betonica.	103.	243.
Betula.	153.	40. 41. 244.
Bidens.	137.	375. 376.
Bignon'a.	110.	530.
Biscutella.	113.	644. 974.
Biserrula.	129.	198.
Bixa.	92.	772.
Blitum.	3.	945.
B letus.	173.	522. 523. 627.
Borassus.	174.	232.
Borago.	22.	253. 254.
Brasica.	114.	257. - 267. 470. 623. 746. 859. 862. 911.
Briza.	12.	554. - 556.
Bromelia.	48.	112. - 116. 478.
Bromus.	12.	552. 556.
Brunia.	31.	448.

Bryo

Genus.	Pag.	Tabula.
Bryonia.	159	269. 270.
Bubon.	42.	591.
Bulbocodium.	49.	404.
Bunium	40.	273.
Buphtalmum.	114.	192. 196. 377. 424.
Bupleurum.	39.	273. 801.
Butomus.	65.	614.
Buxus.	153.	275.
C		
Cacalia.	137.	276. 915.
Caesalpinia.	67.	883.
Cactus.	79.	354. - 358. 474. 507. 765. 766.
Calceolaria.	5.	883.
Calendula.	146.	282. - 285.
Calla.	151.	174. 175. 472.
Callitriche.	3.	949.
Caltha.	99.	285.
Cambogia.	91.	561.
Campanula.	32.	286. - 294.
Cancella.	75.	341.
Canna.	1.	296. - 298.
Cannabis.	160.	299.
Capparis.	90.	303.
Capficum.	29.	927. - 930.
Cardamine.	115.	752.
Carduus.	136.	14. 309. 311. 313. 315. - 317. 319.
Carex.	152.	552. 553. 555. 556.
Carica.	102.	797.
Carlina.	135.	308. 318.
Carpinus.	155.	319. 976.
Carthamus.	137.	308. 311. 320. 400.
Carum.	44.	321.
Caryophyllus.	91.	324. 325.
Caryota.	175.	504.
Castia.	66.	340. 341. 915.
Castine.	45.	350.
Catananche.	135.	917.
Caucalis.	39.	314. 345. 458.
Celastrus.	30.	491. 087.
Celofia.	34.	84. - 80. 96.

Genus.	Pag.	Tabula.
Centaurea.	145.	189. 309. 316 317. 347. 318. 449. - 452. 592. - 594.
Cerastium.	74.	76. 77.
Ceratonia.	167.	922.
Cerbera.	35.	577.
Cercis.	66.	922.
Cerinth.	22.	359. 360.
Chaerophyllum.	43.	273. 353. 743.
Chamaerops.	173.	784.
Cheiranthus.	114.	642. - 644. 646.
Chelidonium.	90.	366. 786. 787.
Chenopodium.	57.	200. 201. 203. 225. 250. 251. 253. 616.
Chlora.	61.	348.
Chrysanthemum.	142.	238. 239. 364. 377. - 379.
Chrysocoma.	137.	664.
Chrysosplenium.	70.	380.
Cicer.	126.	380. 437.
Cichorium.	135.	381. 477.
Cicuta.	42.	382. 383.
Cinchona.	32.	367.
Cineraria.	141.	589.
Circaea.	4.	389.
Cissampelos.	163.	798.
Cissus.	18.	814.
Cistus.	91.	390. - 392.
Citrus.	131.	700 - 703.
Clauaria.	173.	525.
Claytonia.	31.	828.
Clematis.	97.	393. 394. 398.
Cleome.	116.	924.
Cliffortia.	161.	533.
Clinopodium.	105.	399.
Cneorum.	10.	362.
Cnicus.	136.	347. 465.
Cochlearia.	112.	170. 401. 430. 641. 752.
Cocos.	174.	780 - 782.
Coffea.	33.	279.
Coix.	152.	618.
Colchicum.	58.	403. 404.
Colutea.	125.	406.

Comma

Genus.	Pag.	Tabula.
Comarum.	89.	847.
Commelina.	10.	477.
Conium.	40.	382.
Conuallaria.	53.	653. 920. 921.
Conuoluulus.	25.	413. - 421. 469. 715. 758. 999.
Conyza.	139.	423.
Copaifera.	70.	224.
Cordia.	30.	910.
Coriandrum.	42.	429.
Coris.	27.	429.
Cornus.	18.	429.
Coronilla.	129.	405. 430.
Corrigiola.	46.	825.
Corylus.	155.	431.
Corypha.	174.	304.
Costus.	2.	527.
Cotula.	143.	247. 362.
Cotyledon.	73.	433. 434. 914.
Craffula.	47.	61. 435.
Crataegus.	82.	727. 728.
Crepis.	135.	572. - 574.
Crescentia.	110.	561.
Crocus.	8.	438.
Crotalaria.	123.	419.
Croton.	157.	302. 566. 618.
Cucubalus.	72.	279. 678. 681. 682.
Cucumis.	158.	441. 721. - 723.
Cucurbita.	158.	271. 442. - 446.
Cuminum.	42.	447.
Cupressus.	157.	448.
Curcuma.	2.	448.
Cuscuta.	20.	449. 479.
Cyclamen.	24.	435.
Cynanchum.	36.	155. 493.
Cynara.	136.	387. 388.
Cynoglossum.	21.	253. 434.
Cyperus.	10.	455. 514.
Cypripedium.	149.	517.
Cytinus.	150.	391.
Cytisus.	126.	107. - 109. 456. 457.

Genus.	Pag.	Tabula.
Daphne.	62.	633. 975.
Datīca.	162.	676.
Datura.	27.	950. - 952.
Daucus.	39.	458. 459.
Delphinium.	93.	408. - 411. 949.
Dentaria.	113.	40.
Dianthus.	71.	316. = 339. 344.
Dictamnus.	68.	461.
Digitalis.	109.	463. 464.
Dillenia.	95.	468.
Diosma.	31.	31.
Diospyros.	166.	559.
Dipsacus.	15.	465. - 467.
Dolichos.	124.	808. - 809.
Doronicum.	141.	377. 469.
Dorstenia.	19.	916.
Draba.	113.	274.
Dracaena.	53.	785.
Dracocephalum.	106.	365. 464. 470. 591. 719. 720.
Dracontium.	151.	176.
Drosera.	47.	872.
Echinops.	146.	314. 315.
Echium.	23.	474. 475.
Elaeagnus.	19.	764.
Elate.	175.	502.
Epidendrum.	149.	479. 1002.
Epilobium.	61.	688. - 690.
Epimedium.	18.	479.
Equisetum.	168.	479. 480.
Erica.	62.	481.
Erigeron.	139.	422.
Eriphorum.	11.	552. 553.
Eruum.	126.	380. 484. 636. 637. 1008. 1009.
Eryngium.	38.	466. 484. - 486.
Erysimum.	113.	37. 290. 487. 645.
Erythrina.	122.	425.
Erythronium.	51.	460.
Eugenia.	79.	601.
Euonymus.	30.	494.
Eupatorium.	137.	495. 496.

Euphor-

Genus.	Pag.	Tabula.
Euphorbia.	76.	487. - 494. 497. 498. 561.
Euphrasia.	108.	499.
Fagus.	155.	343. 501.
Ferula.	40.	181. 504.
Festuca.	12.	554.
Ficus.	167.	508. 956.
Filago.	146.	291. 549. 550.
Fragaria.	87.	514.
Fraxinus.	166.	515. 709.
Fritillaria.	51.	515. - 517. 661. 662.
Fucus.	171.	669. 670.
Fumaria.	121.	519. - 521.
Galanthus.	48.	642.
Galega.	127.	528.
Galeopsis.	103.	299. - 301. 621. 622. 712.
Galium.	17.	146. 147. 530. 714. 872. 873.
Genipa.	34.	531.
Genista.	122.	532. 533.
Gentiana.	37.	348. 534. 535.
Geranium.	117.	535. - 545.
Geropogon.	132.	381.
Geum.	88.	322. 323.
Gladious.	9.	546. 925.
Glaux.	35.	547.
Gleco n.	102.	564.
Cledithia.	166.	11.
Clobularia.	15.	238.
Glycine.	127.	149.
Glycyrrhiza.	127.	547. 548.
Gnaphalium.	139.	476. 548. - 551.
Gomphrena.	38.	97.
Gordonia.	120.	1023.
Gossypium.	120.	551.
Gratiola.	5.	558.
Guaiacum.	68.	560.
Guilandina.	67.	240. 754. 964.
Gypsophila.	71.	679.

Genus.	Pag.	Tabula.
<i>Haemanthus.</i>	48.	562.
<i>Hedera.</i>	34.	563. 564.
<i>Hedysarum.</i>	129.	564. 565. 709. 1020.
<i>Helianthus.</i>	144.	191. 371. - 375.
<i>Heliotropium.</i>	20.	566.
<i>Helleborus.</i>	99.	569.
<i>Hemerocalis.</i>	57.	186. 651. 655.
<i>Heracleum.</i>	41.	943. 944.
<i>Herniaria.</i>	37.	570.
<i>Hesperis.</i>	114.	571. 572. 644.
<i>Hibiscus.</i>	120.	34. 36. 80. - 82. 617. 693.
<i>Hieracium.</i>	134.	206. 574- 576.
<i>Hippocrepis.</i>	129.	430. 504.
<i>Hippophae.</i>	160.	764.
<i>Hippuris.</i>	3.	408.
<i>Holcus.</i>	164.	729.
<i>Holosteum.</i>	13.	78.
<i>Hordeum.</i>	13.	577.
<i>Humulus.</i>	160.	675.
<i>Hyacinthus.</i>	54.	583. - 587.
<i>Hydrocharis.</i>	161.	761.
<i>Hydrophyllum.</i>	24.	588.
<i>Hymenaea.</i>	66.	137.
<i>Hyoscyamus.</i>	27.	588.
<i>Hyoseris.</i>	135.	573. 576.
<i>Hypocoun.</i>	19.	590.
<i>Hypericum.</i>	132.	589. - 591. 744.
<i>Hypnum.</i>	170.	738.
<i>Hyllopus.</i>	101.	591. 725.
<i>Iambolifera.</i>	61.	601.
<i>Iasminum.</i>	3.	602.
<i>Iatropha.</i>	157.	867. 1023.
<i>Iberis.</i>	112.	274. 973. 974.
<i>Ignatia.</i>	29.	500.
<i>Ilex.</i>	20.	158. 159.
<i>Illecebrum.</i>	35.	570. 824. 825.
<i>Illicium.</i>	95.	158. 649.
<i>Impatiens.</i>	148.	218. - 222. 603.
<i>Imperatoria.</i>	43.	604.

Genus.	Pag.	Tabula.
Indigofera.	126.	605.
Inula.	141.	188. 193. 376. 423. 565. 574.
Ipomoea.	26.	418. 419.
Iris.	9.	606. - 613.
Isatis.	116.	614.
Isnardia.	19.	798.
Iuglans.	155.	759.
Iuncus.	58.	555. 556. 614.
Iuniperus.	162.	346. 615. 876.
Iusticia.	5.	473.
Kaempferia.	2.	526.
Knautia.	16.	886.
Lactuca.	133.	618. 620.
Lagoecia.	34.	458.
Lagurus.	12.	552.
Lamium.	103.	529. 621. 622..
Lantana.	108.	1006. 1007.
Lapfana.	135.	938.
Lathyrus.	124.	628. - 631. 1008. 1009.
Lauatera.	119.	35. 80. 693. 697.
Lauandula.	101.	632. 950.
Laurus.	63.	165. 240. 385. 386. 447. 634. 635. 692.
Ledum.	69.	392.
Lemna.	151.	637.
Leontice.	48.	639.
Leontodon.	134.	573. 574. 576. 966.
Leonurus.	104.	307. 709.
Lepidium.	112.	641. 751. 752. 973.
Leucoium.	49.	641. 642.
Lichen.	171.	648. 738. 739.
Ligusticum.	41.	384. 647.
Ligustrum.	3.	650.
Lilium.	50.	651. 654. - 660.
Linum.	47.	348. 669.
Liquidambar.	155.	953.
Liliodendron.	95.	997. 998.
Lithospermum.	21.	272. 672.
Lobelia.	147.	512.

Lolium.

Genus.	Pag.	Tabula.
Lolium.	13.	556.
Lonicera.	33.	801. 802. 1022.
Lotus.	127.	469. 514. 672. 673. 980.
Lunaria.	113.	645.
Lupinus.	123.	674.
Lychnis.	74.	677. 679. 680. 682. 684. 685.
Lycium.	30.	864.
Lycoperdon.	173.	523. 524.
Lycopodium.	170.	937.
Lycopus.	6.	712.
Lycopliis.	22.	254.
Lyfimachia.	24.	195. 234. 246. - 249. 688. 738.
Lythrum.	76.	246. 824.
Malope.	119.	35.
Malua.	119.	33. 34. 83. 692. 696. 697.
Marantia.	2.	526.
Marchantia.	171.	648.
Marrubium.	104.	462. 709. 710.
Marfilea.	170.	637.
Matricaria.	143.	362. 713.
Medicago.	130.	401. 404. 457. 501. 513. 718.
Melampyrum.	108.	716. 717.
Melia.	69.	217.
Melianthus.	111.	717.
Melica.	12.	553.
Melissa.	106.	280. 281. 719.
Melittis.	106.	720.
Menispermum.	162.	400. 675.
Mentha.	102.	724. 725. 838.
Menyanthes.	24.	761. 979.
Mercurialis.	161.	726.
Mesembryanthemum.	85.	505. - 508.
Mespilus.	83.	10. 514. 728.
Micropus.	146.	550.
Mimosa.	165.	10. 12. 730. 731. 808.
Mirabilis.	31.	732. 733.
Mitella.	71.	430.

Genus.	Pag.	Tabula.
Mnium.	170.	26. 738. 739.
Molucella.	104.	720.
Momordica.	157.	440. 735.
Monarda.	6.	640.
Monotropa.	69.	774.
Moraea.	10.	925.
Morina.	7.	312.
Morus.	153.	736.
Musa.	164.	227. - 229. 737.
		785.
Myagrurn.	113.	862. 918.
Myofotis.	21.	566.
Myofurus.	47.	346.
Myristica.	90.	760.
Myroxylon.	67.	225.
Myrtus.	79.	325. 650. 744. 745.
Napaea.	163.	83.
Narcissus.	49.	746. 748. - 750. 848.
Nepeta.	101.	724.
Nerium.	35.	754. - 756.
Nicotiana.	28.	757. 831.
Nigella.	95.	757. 758.
Nymphaea.	92.	761.
Ocymum.	106.	762. 763.
Oenanthe.	42.	509.
Oenothera.	61.	688.
Olea.	4.	764.
Onoclea.	168.	511.
Ononis.	123.	139. - 141.
Onopordon.	137.	307. 308.
Onosma.	22.	117.
Ophioglossum.	168.	765.
Ophrys.	148.	767. 769. 771.
Orchis.	148.	767. - 771.
Origanum.	105.	462. 691. 772. 773.
Ornithogalum.	52.	185. 734. 773.
Ornithopus.	129.	303. 773. 968.
Orobanche.	107.	774.
Orobis.	124.	775.
Oryza.	58.	775.

Osmunda.

Genus.	Pag.	Tabula.
Osmunda.	168.	509. 673.
Osteospermum.	146.	369. 370.
Othonna.	146.	546. 597.
Oxalis.	74.	20. 21.
 Paeonia.	 93.	 776. - 779.
Panax.	167.	432.
Pandanus.	159.	140.
Panicum.	11.	552. 554. 555. 729. 786.
Papaver.	89.	787. - 796.
Parietaria.	165.	798.
Paris.	63.	799.
Parnassia.	46.	392.
Parthenium.	154.	713.
Passiflora.	149.	395. - 397. 412.
Pastinaca.	43.	786. - 799. 800.
Pedicularis.	108.	800.
Penaea.	17.	885.
Peplis.	58.	547.
Periploca.	36.	154.
Peucedanum.	40.	806. 918.
Peziza.	173.	523.
Phaca.	128.	199.
Phalaris.	11.	180. 552. 555.
Phallus.	173.	524. 525.
Phaseolus.	123.	800. - 808.
Phellandrium.	42.	383.
Philadelphus.	79.	602.
Phillyrea.	4.	809.
Phleum.	11.	554.
Phlomis.	104.	640. 711. 880. 947.
Phoenix.	175.	783.
Phormion.	54.	582.
Phylla.	30.	31.
Phyllanthus.	152.	740. - 742.
Phytalis.	28.	931.
Phyteuma.	32.	862.
Phytolacca.	32. 75.	936.
Picris.	133.	573. 576.
Pimpinella.	44.	138. 459. 811. 812.
Pinguicula.	5.	812.
Pinus.	156.	1 - 3. 346. 627. 813.

Genus.	Pag.	Tabula.
Piper.	7	814. 815. 440.
Pistacia.	160.	638. 816. 969.
Pisum.	124.	629. 817. - 819.
Plantago.	16.	820. - 822. 837.
Platanus.	155.	15.
Plumbago.	31.	460.
Poa.	12.	554. 556.
Poinciana.	67	11.
Polemonium.	26.	1001.
Polianthes.	54.	534.
Polygala.	121.	361. 823.
Polygonum.	62.	244. 245. 500. 803. - 805. 823. 824. 830.
Polypodium.	169.	26. 509. - 511. 672. 825.
Polytrichum.	170.	27.
Populus.	161.	8-6. 827.
Portulaca.	75.	828. 829.
Potamogeton.	20.	829. 830.
Potentilla.	88.	142. 801. 847. 848.
Poterium.	154.	810.
Primula.	23.	207. 216. 831. 834.
Prinos.	48.	32.
Protea.	14.	892. - 906.
Prunella.	107.	268.
Prunus.	81.	10. 351. 352. 636. 698. 835. 836.
Psidium.	79.	561.
Pforalea.	128.	533.
Pteris.	169.	511. 668.
Pulmonaria.	21.	272.
Punica.	80.	557.
Pyrola.	69.	841.
Pyrus.	83.	703. - 707. 842. - 844.
Quercus.	154.	603. 845. - 847. 954.
Rapunculus.	97.	126. 366. 806. 849. - 854. 856. - 858.
Raphanus.	115.	860. 861.

Refeda.

Genus.	Pag.	Tabula.
Refeda.	75.	676. 843.
Rhamnus.	30.	31. 40. 614 687. 780. 945. 960.
Rheum.	65.	863.
Rhinanthus.	107.	800.
Rhodiola.	106.	968.
Rhododendron.	69.	392. 756.
Rhus.	46.	424. 432. 955. 1013.
Ribes.	34.	558. 865.
Ricinus.	157.	806. 867.
Riuiua.	19.	87.
Robinia.	126.	11.
Rosa.	86.	868. - 871.
Rosmarinus.	6.	872.
Rubia.	17.	146.
Rubus.	87.	873. 874.
Rudbeckia.	145.	469.
Rumex.	59.	18. - 20. 623. - 626.
Ruscus.	163.	633. 634. 875.
Ruta.	68.	875.
Saccharum.	12.	178.
Sagina.	20.	77. 78.
Sagittaria.	154.	876.
Salix.	159.	877. 878.
Salifola.	38.	616. 914.
Saluia.	6.	578. - 582.
Sambuccus.	45.	473. 881. 882.
Sanguiforba.	17.	811.
Sanicula.	39.	885.
Santalum.	19.	883. 884.
Santalina.	137.	4. - 6.
Saponaria.	71.	684. 686.
Satureia.	101.	885.
Satyrium.	148.	771.
Saxifraga.	70.	886. 914.
Scabiofa.	15.	886. - 889.
Scandix.	42.	345. 353. 890.
Scilla.	52.	586. 587. 890.
Scirpus.	11.	553. 555. 614.
Scleranthus.	70.	617. 825.
Scolymus.	135.	906.
Scorpiurus.	129.	295.


Scor-


Genus.	Pag.	Tabula.
Scorzonera.	133.	907. 978.
Scrophularia.	109.	908. 909.
Scutellaria.	107.	499. 909.
Secale.	13.	910.
Sedum.	73.	912. 914. 967. 968.
Selinum.	40.	459.
Semecarpus.	45.	104.
Semperuium.	78.	912. 913.
Senecio.	140.	7. 29. 596. 597. 599. 600. 915. 1012.
Serapias.	149.	567. 568. 770.
Serratula.	135.	309. 917.
Sesamum.	110.	918.
Sida.	118.	82. 616.
Sideritis.	102.	880. 919.
Sideroxylon.	30.	687.
Silene.	72.	678. 679. 681. - 683. 686.
Sinapis.	116.	922. 923.
Sison.	42.	100. 101. 743.
Sisymbrium.	116.	447. 482. 483. 751. 752. 941.
Sisyrinchium.	149.	613.
Sium.	41.	99. 100. 133. - 135. 758. 924.
Smilax.	160.	367. 885.
Smyrniun.	43.	926.
Solanum.	28.	927. 930. 932. - 935. 937. 946.
Soldanella.	24.	420.
Solidago.	141.	1012. 1013.
Sonchus.	133.	938. - 940.
Sorbus.	83.	941.
Sparganium.	152.	942.
Spartium.	122.	352. 532. 533.
Spergula.	75.	77. 78.
Sphagnum.	170.	739.
Spilanthus.	144.	495.
Spinacia.	160.	946.
Spiraea.	86.	229. 509. 590. 947. 1018.
Stachys.	104.	919. 947. 948.
Stapelia.	36.	155 - 157.

Genus.	Pag.	Tabula.
Staphylaea.	46.	816.
Statice.	46.	552.
Stellaria.	73.	76. 553.
Stel'era.	62.	671.
Stipa.	12.	553.
Strychnos.	29.	926.
Styrax.	70.	953.
Symphytum.	22.	956. - 958.
Syringa.	4.	958. 959.
Tagetes.	142.	960. - 963.
Tamarindus.	10.	964.
Tamarix.	46.	965.
Tanacetum.	138.	965. 966.
Tarchonanthus.	137.	476.
Taxus.	163.	967.
Teucrium.	100.	361. 365. 399. 702. 822. 907. 969.
Thalictrum.	97.	854. 969. - 971.
Thapsia.	43.	972.
Thea.	92.	972.
Theobroma.	130.	277. 278.
Thesium.	34.	142.
Thlaspi.	112.	274. 974.
Thuya.	156.	166.
Thymus.	105.	399. 712. 916. 975. 978.
Tilia.	92.	976.
Toluiifera.	69.	225.
Tordylium.	39.	344. 345. 384. 977.
Tormentilla.	88.	977.
Tragopogon.	133.	978.
Trapa.	19.	979.
Tremella.	171.	522.
Trientalis.	60.	841.
Trifolium.	128.	548. 718. 979. 980.
Trigonella.	172.	513. 514. 672.
Triticum.	13.	556. 981.
Trollius.	99.	569.
Tropaeolum.	60.	753.
Tulipa.	51.	982. - 997.
Turritis.	116.	267.

Genus.	Pag.	Tabula.
Tuffilago.	140.	805. 999.
Typha.	152.	977.
V lmus.	38.	1018.
Vlex.	122.	532. 533.
Vlua.	172.	670.
Vrtica.	153.	1019. 1020.
Vtricularia.	5.	637.
Vuularia.	51.	921.
Vaccinium.	61.	744. 1000.
Valantia.	164.	439.
Valeriana.	8.	620. 945. 1000. - 1002.
Veratrum.	164.	518.
Verbascum.	27.	207. 245. 246. 1003.
Verbena.	5.	1004. 1006.
Verbesina.	144.	370.
Veronica.	4.	107. 233. 234. 1004. - 1006.
Viburnum.	44.	635. 882. 1008.
Vicia.	125.	198. 436. 437. 500. 1008. 1010.
Vinca.	35.	1010.
Viola.	147.	595. 606. 1011.
Vifum.	160.	1013.
Vitex.	111.	30.
Vitis.	31.	1014. - 1017.
Vachendorfia.	10.	478.
X anthium.	153.	1021.
Xeranthemum.	139.	148. 1021.
Y ucca.	55.	52. 53. 64. 1022. 1024.
Z ea.	152.	518.
Ziziphora.	6.	399.
Zostera.	151.	670.







Tax
W43,3

